



ADAMA

PENDIGAN® 40SC

Το γνωστό
ζιζανιοκτόνο
με νέα μορφή!

Αποτελεσματικός έλεγχος
των κυριότερων ζιζανίων
σε πολλές καλλιέργειες

Δοκιμασμένο κι
αναντικατάστατο!



ZIZANIOKTONO

ADAMA.COM

PENDIGAN® 40SC



pendimethalin 40%

A.A.Δ.Α: 70208/03.04.2017 | Η/Μ τροποποίησης: 27.11.2017

Χαρακτηριστικά

Το δοκιμασμένο ζιζανιοκτόνο που προσφέρει:

- Υψηλή αποτελεσματικότητα.
- Νέα βελτιωμένη μορφή-χωρίς σήμανση τοξικότητας για τον άνθρωπο.
- Ευρύ φάσμα δράσης.
- Εφαρμογή σε πολλές καλλιέργειες.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ

ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ/στρ.)

Εσπεριδοειδή, Ροδακινιά, Νεκταρινιά,
Βερικοκιά Δαμασκηνιά, Κερασιά, Μηλιά,
Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσουλιά, Αμπέλι
(επιπρατέζια & ινιοποιήσιμα), Σκόρδο,
Φράουλα, Βαμβάκι, Σιτάρι, Κριθάρι,
Ηλιανθος, Σόγια, Αραχιδά*, Καλαμπόκι,
Μπιζέλι, Φασόλι, Πατάτα, Πιπεριά,
Σπαράγγι*, Καρότο*, Καπνός (σαν
ζιζανιοκτόνο)

300-500

Αγκινάρα, Σέλινο, Λάχανο, Μπρόκολο,
Κουνουπίδι, Κρεμμύδι (από σπόρο &
μεταφυτευόμενο), Τομάτα, Μπάμια*,
Ραδίκι*, Μαϊντανός*, Αρωματικά φυτά*
(φύλλα: σέλινο, μάραθο, κόλιανδρο,
φινόκιο, άνηθος)

250-400

Φακή*, Φάβα*, Ρεβίθι*, Κουκιά*, Καπνός
(σαν αντιφύλλιζιακό των Αμερικανικών
καπνών Μπέρκλεϋ και Βιρτζίνια)

300

*Χρήση ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας (αραχίδα, καρότο, φακή, φάβα, ρεβύθι, κουκιά, μπάμια, σπαράγγι, ραδίκι, μαΐντανός, αρωματικά φυτά/φύλλα) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοδοκτότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

- Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη - μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Η δράση του σκευάσματος στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσαμάτωση - «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.
- Το σκεύασμα καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



ADAMA

Listen • Learn • Deliver

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα | Τηλ.: 211 120 5555, Fax: 211 120 5559

Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 343, ΤΚ 57008 Ιωνία | Τηλ.: 2310 784931-6, Fax: 2310 780453