

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.12.2020
Αριθ. πρωτ: 12464/324798

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	Nissan Chemical Europe S.A.S.
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		Parc d' Affaires de Crecy, 10A, rue de la Voie Lactée
TELEFAX:	210 92 12 090		69370 St-Didier au Mont d' Or, Γαλλία
Πληροφορίες:	Γ. Τσολομούτη		(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, της εταιρείας
Τηλέφωνο:	210 9287247		Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. "Agribiz"
e-mail:	gtsolomiti@minagric.gr	email:	a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70206 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ARREST 5 EC (δ.ο Quizalofop-P-ethyl 5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, την επισήμανση και ταξινόμηση του σκευάσματος, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 34 & 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
7. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
8. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).

10. Τη με αριθ. πρωτ. 9686/105532/12.12.2016 Υπ. Απόφασή, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70191 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TARGA 5 EC (quizalofop-p-ethyl 5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 12464/324798/20.11.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70206 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ARREST 5 EC (δ.ο Quizalofop-P-ethyl 5% β/ο) που χορηγήθηκε με την με αριθ. 1875/18316/13.03.2017 Υπ. Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, την επισήμανση και ταξινόμηση του σκευάσματος, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Τα σημεία 5, 6, 7, 10, 11, 12 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.	κ.εκ./στρ.		
ΛΑΧΑΝΙΚΑ Καρότο DAUCA	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	100-150	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του πρώτου φύλλου της καλλιέργειας ως την έναρξη της ανάπτυξης του εδώδιμου μέρους (BBCH 11-40)	1
Τομάτα LYPES				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την ανάπτυξη της πλάγιας βλάστησης (BBCH 11-29)	
Φασόλι με λοβό PHSVX Μπιζέλι χωρίς λοβό PIBSX				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 11-49)	
ΟΣΠΡΙΑ Φακή LENCU Ρεβίθια CIEAR	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	150-300	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης (BBCH 12-29)	

Κουκιά VICFX				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 11-49)	
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας ως την έναρξη της κάλυψης των σειρών (BBCH 12-31)	
Βαμβάκι GOSHI				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του πρώτου φύλλου της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης (BBCH 10-39)	
Σόγια GLXMA				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της ανάπτυξης των φύλλων της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης/ κάλυψη των σειρών (BBCH 10-39)	
ΠΑΤΑΤΑ SOLTU				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της ανάπτυξης των φύλλων της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης/ κάλυψη των σειρών (BBCH 10-39)	
Ηλίανθος HELAN	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	100-150	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της ανάπτυξης των φύλλων της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης (BBCH 10-39)	
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	150		
Ελαιοκράμβη BRSNN	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	100-150	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 11)	
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	150		
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ Ζαχαρότευτλα BEAVA	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	100-150	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του πρώτου φύλλου της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης/ κάλυψη των σειρών (BBCH 10-39)	
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	150-300		
Μηδική MEDSA	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	20-40	100-150	Σε νεοσπαρθείσα μηδική είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη (BBCH 11-49)	1

Παρατηρήσεις:**1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:****Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Ετήσια ζιζάνια: *Alopecurus myosuroides* **ALOMY** (Αλεπονουρά), *Avena sp.* **AVESS** (Αγριοβρώμη), *Bromus sp.* **BROSS** (Βρόμος), *Digitaria sanguinalis* **DIGSA** (Αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* **ECHCG**, *Echinochloa phyllorogon* **ECHOR** (Μουχρίτσα), *Hordeum vulgare* **HORVX** (Κριθάρια), *Lolium sp.* **LOLSS** (Ηρες), *Oryza rufipogon* **ORYRU**, *Phalaris sp.* **PHASS** (Φαλαρίδες), *Sorghum halepense* **SORHA** (Βέλιουρας από σπόρο), *Triticum aestivum* **TRZAX** (Σιτάρια)

Πολυετή ζιζάνια: *Agropyron repens* **AGRRE** (Αγρόπυρο), *Sorghum halepense* **SORHA** (Βέλιουρας από ρίζωμα).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Ετήσια ζιζάνια: *Setaria sp.* **SETSS** (Σετάριες), *Poa annua* **POAAN** (ετήσια Πόα).

Πολυετή ζιζάνια: *Cynodon dactylon* **CYNDA** (Αγριάδα).

Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα

2. Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια.
3. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο.
4. Για ετήσια ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο 3-4 φύλλων στη χαμηλότερη δόση ή αργότερα με τη μεγαλύτερη δόση.
5. Για πολυετή ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους ως και στο φύλλο σημαίας.
6. Το *Sorghum halepense* καταπολεμείται καλύτερα με σπαστή εφαρμογή, με δόση 100 κ.εκ. / στρέμμα όταν έχει μήκος βλαστού 20 – 30 εκατοστά και 125 κ.εκ. / στρέμμα για τις αναβλαστήσεις.
7. Η *Poa annua* καταπολεμείται καλύτερα σε μικρό στάδιο και σε δόση 300 κ.εκ. / στρέμμα.
8. Μην ψεκάζετε τον Ηλιάνθο μετά το στάδιο των 6 πραγματικών φύλλων.
9. Μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.
10. Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ξηρός αέρας και παρουσία δρόσου στα φύλλα.
11. Κατά την εφαρμογή του **Arrest 5 EC** σε καλλιέργειες φασολιών, μπιζελιών και ηλιάνθου, να μην αναμιγνύεται με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν και λίπασμα.

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **quizalofop-p-ethyl**, η οποία ανήκει στην ομάδα **1** κατά **HRAC**.

Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης και εφαρμογή κατάλληλων αγρονομικών πρακτικών (π.χ. αμειψισπορά) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

- Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλο γεωργικό φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του Arrest 5 EC.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H317: Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (CAS: 64742-94-5)

Calcium dodecylbenzenesulphonate (CAS 26264-06-2) / 2-

Ethylhexanol (CAS: 104-76-7).

Dodecan-1-ol, ethoxylated (CAS: 9002-92-0)

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φόρτωση και γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή.

Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής, λίγο μετά τον ψεκασμό.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μία απψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P302+P352+P333+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.

P304+P340+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Γενικά: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς.

Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα: Κανένα σύμπτωμα δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε αρχικά συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία (απομόλυνση – παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών). Εφόσον καταποθεί ποσότητα μεγαλύτερη από μια γουλιά, χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καρότο, Τομάτα, Φασόλι με λοβό Μπιζέλι χωρίς λοβό	21
Ζαχαρότευτλα	60
Φακή, Κουκιά, Ρεβίθια, Ηλίανθος, Πατάτα, Βαμβάκι, Μηδική	45
Ελαιοκράμβη, Σόγια	90

- II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 1875/18316/13.03.2017 Υπ. Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ