



Εγκεκριμένο Φάσμα Δράσης

Florasulam 0,175%+Fluroxypyr-metpyl 7,5%+Pinoxaden 3%
Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: Cloquintocet-mexyl 0,75%

Α.Α.Δ.Α: 70489/13.06.2023

Φάσμα δράσης

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ (Κ.ΕΚ./ΣΤΡ.)	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χειμερινό σιτάρι σκληρό	Ετήσια και Πολυετή	150		Ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτρωτικά,
Χειμερινό σιτάρι μαλακό, Κριθάρι, Σίκαλη	Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια*	150-200	5-30	από το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης (3 φύλλα) έως το στάδιο της εμφάνισης του φύλλου σημαία

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στο Χειμερινό Σιτάρι (μαλακό και σκληρό) περιλαμβάνει και το Χειμερινό σπέλτ και το Χειμερινό Τριτικάλε.
2. Να εφαρμόζετε την μεγάλη δόση των 200 κ. εκ./στρ. όταν επικρατεί υψηλή πίεση ζιζανίων ή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ανεπτυγμένο στάδιο.

*ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:

Στη δόση των 150 κ.εκ./στρ.		Στη δόση των 200 κ.εκ./στρ.	
α) Ευαίσθητα	β) Μετρίως ευαίσθητα	α) Ευαίσθητα	β) Μετρίως ευαίσθητα
Αγριοβράμη, Αγριοσινάπι, Αλεπονουρά, Αναγαλλίδα, Ανεμόχορτο, Ανθεμίδα, Βίκος ήμερος, Ήρα, Κολλητσιίδα μεγ/πη, Παπαρούνα, Στελλάρια, Φάλαρη	Πολυκόμπι, Φάλαρη κοντή, Κενταύριο	Αγριοβράμη, Αγριοσινάπι, Αλεπονουρά, Αναγαλλίδα, Ανεμόχορτο, Ανθεμίδα, Βίκος ήμερος, Ήρα, Κολλητσιίδα, μεγ/πη, Παπαρούνα, Πολυκόμπι, Στελλάρια, Φάλαρη	Κενταύριο



Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει pinoxaden και cloquintocet-mexyl. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υπόπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



ADAMA

Listen • Learn • Deliver

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Monumental Plaza 7ος όροφος Κηφισίας 44, 151 25
Μαρούσι-Αθήνα | Τηλ.: 211 120 5555, Fax: 211 120 5559
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 343, ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310 784931-6, Fax: 2310 780453

Το παρόν τυπώθηκε Αύγουστο 2023

TIMELINE® FX II

Δεν μπορείς να σταματήσεις το χρόνο.
Αλλά μπορείς να τον ελέγξεις.

Η ευελιξία που θέλετε
Ο έλεγχος που χρειάζεστε
Το Timeline FX II σας τα προσφέρει

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση
των κυριότερων ζιζανίων σε
σιτάρι, κριθάρι και σίκαλη



ZIZANIOKTONO

ADAMA.COM

Timeline® FX II

Το Timeline® FX II σου δίνει ένα εκτεταμένο διάστημα εφαρμογής για να έχεις την ευελιξία να ψεκάσεις στο σωστό χρόνο.

Διαθέτει 3 δραστικές ουσίες με διαφορετικούς τρόπους δράσης που αλληλοσυμπληρώνονται, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πλατύφυλλων κι αγρωστωδών ζιζανίων.

Συnergισμός 3 δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης

HRAC: 1 **Pinoxaden**

Παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου Acetyl-Co-A Carboxylase (ACCase)

HRAC: 2 **Florasulam**

Αναστέλλει τη δράση του ενζύμου οξεικογαλακτική συνθετάση (acetolactate synthase-ALS)

HRAC: 4 **Fluroxypyr**

Δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης - συνθετική αυξίνη

Προηγμένος έλεγχος ζιζανίων

Το Timeline® FX II είναι διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με μεγάλη υπολειμματική διάρκεια. Απορροφάται γρήγορα από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται στα αναπτυσσόμενα μέρη του ζιζανίου. Ο αποχρωματισμός, η χλώρωση και ο τελικός θάνατος των φυτών συμβαίνουν 2 έως 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.


Επιλέξτε το Timeline® FX II για αποδεδειγμένα αποτελέσματα

Δοκιμάσαμε το Timeline® FX II σε αγρούς σε όλη την Ευρώπη και τα δεδομένα απαντούν σε πολλές ανησυχίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές των σιτηρών. Σε σύγκριση με το ζιζανιοκτόνο αναφοράς (μείγμα ALS) το Timeline® FX II προσφέρει βελτιωμένο έλεγχο των πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΖΙΖΑΝΙΑ:



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

