



# DOBLE 1,8 EC



## ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΕC-  
Γαλακτωματοποιήσυμο  
υγρό

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής.

### Εγγυημένη Σύνθεση

● Abamectin ..... 1,8% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 97,96% β/β

### Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες

### Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  
Α.Α.Δ.Α.: 14434/15.05.2013

Κάτοχος της άδειας: Syngenta Hellas  
Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ Λ. Ανθούσας, 15349  
Ανθούσα, Αττική, Τηλ: 2106666612-13, Φαξ: 2106665777

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231  
Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559  
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:  
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

### Σάρωση για χρήση



1  
ΛΙΤΡΟ

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάσποσης.  
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.  
Μπορεί να προκαλέσει όπλαβες στα όγρανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Περιέχει αβαμεκτίν και Cyclohexanol.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Μην αναπνέετε σταγονίδια.

Πλένετε το δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τη μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε άλσοςμη προστατευτική ενδυμασία, μπότες και γάντια κατά την ανάδηξη/φόρτωση και τον ψεκασμό.

Φοράτε άλσοςμη φόρμα εργασίας κατά την επανείσodo στην καλλιέργεια πριν στεγνώσετε τη ψεκαστικό υγρό.

Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φίλαξε, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό έπιπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστράφουν προηγουμένως με τρύπανα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποθίενται σε σημεία ουλλογής, για ανακύλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για να προστατεύετε τους υδρόβιους οργανισμούς και τους οργανισμούς μη στόχους, να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

● Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων. ● Για τις εφαρμογές σε αμπέλου, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 3 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού. ● Για τις εφαρμογές στα επειροδειδή, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού. ● Για τις εφαρμογές στις λοιπές καλλιέργειες, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού.

Για να προστατεύετε τα αρδόρποδα μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν έχουν σφάλμα φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέστε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήντε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξείου.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

**ΦΥΤΟΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Στην αχλαδιά να αποφεύγεται ο συνδυασμός Doble 1,8 EC με λάδι, 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μικροτοκτόνου Captan.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

## ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

● Για τις εφαρμογές σε επειροδειδή, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη 15 μέτρων. ● Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις.

Πιθανώς επικινδυνό για τις μέλισσες.

Για να προστατεύετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

Μην χρησιμοποιούνται το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για την προστασία των μελισσών, θα πρέπει οι μέλισσοι κομού της περιοχής για να ενημερωθούν, ώστε τα μελισσά να απομακρυνθούν από την περιοχή για τουλάχιστον: α) 39 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες επειροδειδών, β) 43 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες τουλάχιστον υπαίθρου, γ) 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκρητίου για εξαπλώση βομβίνων/μελισσών στα θερμοκήπια.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντιδότο:

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την επικέττα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, συμπούλευση/επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν έχουν σφάλμα φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμπούλευση/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάσποσης, μην προκαλέστε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την επικέττα. Να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερού και να προκληθεί εμετός μόνον εάν ο παθόν έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φαρύγγα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέστε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήντε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξείου.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

**ΦΥΤΟΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Στην αχλαδιά να αποφεύγεται ο συνδυασμός Doble 1,8 EC με λάδι, 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μικροτοκτόνου Captan.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Ανοίξτε εδώ ➔



## DOBLE 1,8 EC

**ΝΤΟΜΠΛΕ:** Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντομα, με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευασμάτων και, όπου συνιστάται, λαδιού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευασμάτων. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ.σκ. 100 λίτρα ψεκ. υγρό)-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

**ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Φυτά-Βολβοί & Βολβόδη ανθικά φυτά-Δένδρα-Θάμνοι & Φυτώρια δασικών δένδρων):** Τετράνυχος, Λυριόμυζα, Θρίπας, *Eryophyes spp.*, Ψύλλα. Δόση: 75-100 (100 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών. **ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ:** Ψύλλα, *Eriphimerus pyri*, Φυλλορύκτες, Θρίπας, Τετράνυχος, Πανόνυχος, *Aculus schlechtendali*, *Aculus sp.*, *Eryophyes spp.*. Δόση: 75 (112,5 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αργών, σε μείγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολητικό. Οι μεγάλες δόσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμάτων πριν την ανθοφορία [<BBCH60] ή μετά την ανθοφορία [>BBCH70]). **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ:** Ψύλλα, *Eriphimerus pyri*, Θρίπας, Τετράνυχος, Πανόνυχος, *Aculus schlechtendali*, *Aculus sp.*, *Eryophyes spp.*. Δόση: 75-100 (100 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αργών, σε μείγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολητικό. Οι μεγάλες δόσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμάτων (BBCH 69-89). **ΕΣΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά-Λεμόνια-Μανταρινιά):** Φυλλοκνίστης. Δόση: 40 (60 κ.εκ./στρ.). Πανόνυχος, Τετράνυχος. Δόση: 75 (112,5 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Οι μεγάλες δόσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμάτων (BBCH 13-79 (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία). **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ (Α+Θ):** Τετράνυχος, Λυριόμυζα, Θρίπας. Δόση: 80-100 (120 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. BBCH 12-89 (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό). **ΑΓΓΟΥΡΙ-ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Θ):** Τετράνυχος, Λυριόμυζα, Θρίπας. Δόση: 80-100 (120 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμάτων (BBCH 10-89). **ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Α):** Τετράνυχος. Δόση: 80-100 (120 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμάτων (BBCH 10-89). **ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Θ):** Τετράνυχος, Λυριόμυζα, Θρίπας. Δόση: 80-100 (120 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 12-55). **ΜΑΡΟΥΛΙ-ΑΝΗΘΟΣ (Θ):** Θρίπας. Δόση: 75-100 (50 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 12-55).

**ακάρεων.** Οι μεγάλες δόσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 12-55). **ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ:** Τετράνυχος, Πανόνυχος, *Aculus schlechtendali*, *Aculus sp.*, *Eryophyes spp.*. Δόση: 75-100 (100 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αργών, σε μείγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολητικό. Οι μεγάλες δόσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 69-75). **ΚΑΡΥΔΙΑ(3):** Τετράνυχος, Πανόνυχος, *Aculus schlechtendali*, *Aculus sp.*, *Eryophyes spp.*. Δόση: 75 (75 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (πριν την ανθοφορία [<BBCH 60] ή μετά την ανθοφορία [>BBCH 70]).

**Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):**

Καλλωπιστικά (Θ)-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά-Καρυδιά (100), Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδώνια-Πορτοκαλιά-Λεμόνια-Μανταρινιά (100-150), Αμπέλι (50-100), Τομάτα (Α+Θ)-Μελιτζάνα-(Α+Θ)-Πιπεριά (Α+Θ)-Αγγούρι (Θ)-Κολοκύθι (Θ)-Πεπόνι (Α+Θ)-Καρπούζι (Α+Θ) (50-120), Μαρούλι (Θ)-Μαϊντανός (Θ)-Ανηθος (Θ) (50).

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών:**

Καλλωπιστικά (Θ)-Τομάτα (Α+Θ)- Μελιτζάνα (Θ)-Πιπεριά (Θ)-Αγγούρι (Θ)-Κολοκύθι (Θ)-Μαρούλι (Θ)-Μαϊντανός (Θ)-Ανηθος (Θ): μέχρι 4 / 7 ημέρες. Μηλιά- Αχλαδιά-Κυδώνια: μέχρι 2 / 7 ημέρες. Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά: μέχρι 2 / 14 ημέρες. Εσπεριδοειδή: μέχρι 3 / 10 ημέρες. Αμπέλι: μέχρι 2 / 14-21 ημέρες. Μελιτζάνα (Α)-Πιπεριά (Α)-Πεπόνι (Α+Θ)-Καρπούζι (Α+Θ): μέχρι 3 / 7 ημέρες. Δαμασκηνιά-Καρυδιά: 1 εφαρμογή.

**Παρατήρησης:**

1) Χρήση ήσσονος σημασίας.

2) Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος για την χρήση ήσσονος σημασίας (αντιμετώπιση του Τετρανύχου σε μαϊντανό θερμοκηπίου), είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

3) Ενήρωση στην καλλιέργεια της καρυδιάς ισχύει από τις 09-06-2016, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2075/2015.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο). Εξαιρούνται οι καλλιέργειες της Τομάτας και της Μελιτζάνας.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:**

Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. abamectin, που ανήκει στην ομάδα 6 κατά IRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ οποια εχει εφαρμοστει το σκευασμα:** Όταν έχει στεγνωθει το ψεκαστικού υγρό τελείως πάνω στα φυτά.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Καρύδια: 60 ημέρες.

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδώνια, Αμπέλι, Δαμάσκηνη: 28 ημέρες.

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Μαρούλι (Θ), Μαϊντανός (Θ), Ανηθος (Θ): 14 ημέρες.

Πορτοκαλιά, Λεμόνια, Μανταρινιά (Θ): 10 ημέρες.

Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ): 3 ημέρες.

Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (φυτά, βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά, δένδρα, θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων): Δεν ορίζεται.