

ΚΟΥΠΡΟΦΙΕ ΟΥΛΤΡΑ: Ανόργανο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζετε τα 2/3 του δοχείου του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ-Λεμονιά-Μανταρινιά-Πορτοκαλιά-Κιτριά-Νεραντζιά-Φράπα): Φυτόφθορα καρπών, Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών. Δόση: **190 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 380-475 γρ./στρ.** Συνιστώνται δύο (2) ψεκασμοί σε μηνιαία διαστήματα ξεκινώντας από το τέλος Οκτωβρίου. **ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Βακτηριώσεις. Δόση: **250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές κατά την πτώση των φύλλων και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. **ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά- Καρυδιά-Φουντουκιά-Φιστικιά):** Σεπτορίωση, Εξώασκος, Ποθυστίγγωση, Σκωρίαση, Ανθράκωση. Δόση: **200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200-300 γρ./στρ.** Ψεκασμοί φθινοπώρου-χειμώνα, την περίοδο του ηλιθάργου. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Αχλαδιά):** Φουζικιλιάδιο, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη, Βακτηριώσεις. Δόση: **260 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 260-470 γρ./στρ.** Χειμερινοί ψεκασμοί μέχρι και το στάδιο της πράσινης κορυφής. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά-Κερασιά-Ροδακινιά- Δαμασκηνιά):** Φαιά σήψη. Δόση: **210 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 210-250 γρ./στρ.** Ψεκασμοί φθινοπώρου-χειμώνα, μέχρι να φουσκώσουν τα μάτια. **ΑΜΠΕΛΙ:** Περονόσπορος, Ανθράκωση, Βακτηριώσεις. Δόση: **260 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία και συχνές βροχοπτώσεις την άνοιξη συνιστώνται δύο ψεκασμοί: α) λίγο πριν την άνθηση (στάδιο μούρου) και β) λίγο μετά τη γοιμοποίηση. **ΕΛΙΑ:** Κυκλοκόνιο, Γλοιοσπόριο, Καρκίνωση. Δόση: **325 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ένας ψεκασμός στις αρχές φθινοπώρου, πριν αρχίσουν οι βροχές και ένας δεύτερος, στις αρχές της άνοιξης. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Παντζάρια-Κρεμμύδια-Τομάτα (Y+Θ)-Πιπεριά (Y+Θ)-Μελιτζάνα (Y+Θ)-Αγγούρι (Y+Θ)-Κοθοκύθι (Y+Θ)-Πεπόνι (Y+Θ)-Καρπούζι (Y+Θ)-Μπρόκολο-Κουνουπίδι-Λάχανο-Σπανάκι):** Περονόσπορος, Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Σεπτορίωση, Βακτηριώσεις. Δόση: **190 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 95-190 γρ./στρ.** Οι ψεκασμοί να αρχίζουν μετά το ύψος των 15 εκ. των φυτών και να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ανά 15νήμερο. **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος, Ανθράκωση. Δόση: **95-275 γρ./στρ.** Οι ψεκασμοί να αρχίζουν μετά το ύψος των 15 εκ. των φυτών και να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ανά 15νήμερο. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** Κερκοσπορίωση. Δόση: **130 γρ./στρ.** Προληπτικοί ψεκασμοί ανά 10 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού/καλλιέργεια (λίτρα/στρέμμα):

Γκρέιπ φρουτ-Λεμονιά-Μανταρινιά-Πορτοκαλιά-Κιτριά-Νεραντζιά-Φράπα (200-250), Ακτινίδια (χρήση ήσσονος σημασίας) (80), Αμυγδαλιά-Καρυδιά-Φουντουκιά-Φιστικιά (100-150), Αχλαδιά (100-180), Βερικοκιά-Κερασιά-Ροδακινιά-Δαμασκηνιά (100-120), Αμπέλι (50-150), Ελιά (150), Παντζάρια-Κρεμμύδια-Τομάτα (Y+Θ)-Πιπεριά (Y+Θ)-Μελιτζάνα (Y+Θ)-Αγγούρι (Y+Θ)-Κοθοκύθι (Y+Θ)-Πεπόνι (Y+Θ)-Καρπούζι (Y+Θ)-Μπρόκολο-Κουνουπίδι-Λάχανο-Σπανάκι-Πατάτα (50-100), Ζαχαρότευτλα (40).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Γκρέιπ φρουτ-Λεμονιά-Μανταρινιά-Πορτοκαλιά-Κιτριά-Νεραντζιά-Φράπα-Αμυγδαλιά-Καρυδιά-Φουντουκιά-Φιστικιά-Αχλαδιά-Βερικοκιά-Κερασιά-Ροδακινιά-Δαμασκηνιά-Αμπέλι-Ελιά (2), Παντζάρια-Κρεμμύδια-Τομάτα (Y+Θ)-Πιπεριά (Y+Θ)-Μελιτζάνα (Y+Θ)-Αγγούρι (Y+Θ)-Κοθοκύθι (Y+Θ)-Πεπόνι (Y+Θ)-Καρπούζι (Y+Θ)-Μπρόκολο-Κουνουπίδι-Λάχανο-Σπανάκι-Πατάτα- Ζαχαρότευτλα (3), Ακτινίδια (χρήση ήσσονος σημασίας) (μέχρι 4 εφαρμογές).

Παρατηρήσεις:

- 1)** Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
- 2)** Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
- 3)** Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση των ασθενειών.
- 4)** Στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπεριδοειδή, αχλαδιά, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

- 5)** Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τη χρήση ήσσονος σημασίας (Ακτινιδιάς), είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
- 6)** Η συνοδική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Φιστικιά): **28 ημέρες.**

Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα σταφύλια), Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: **21 ημέρες.**

Τομάτα (Y), Μελιτζάνα (Y): **10 ημέρες.**

Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Παντζάρια, Κρεμμύδια, Πιπεριά (Y+Θ), Αγγούρι (Y+Θ), Κοθοκύθι (Y+Θ), Πεπόνι (Y+Θ), Καρπούζι (Y+Θ), Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Σπανάκι: **7 ημέρες.**

Ακτινιδιά: **Μη εφαρμόσιμο λόγω του χρόνου εφαρμογής.**
Αχλαδιά, Πυρηνόκαρπα: **Μη Εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή).**

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση. Στο αμπέλι να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες Delaware, Rosette, Niagara και Concord και στην αχλαδιά στις ποικιλίες D'Anjou, Comice και Sechel.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν συνδυάζεται με ποητούς όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής του ηλιθάργου των δένδρων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



Μεταλλικός Χαλκός (Cu) 40%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Ανόργανο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Μεταλλικός Χαλκός (Cu).....40% β/β
(σε μορφή τριβασικού θειϊκού χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες25,6% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αρ. Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

A.A.Δ.A.: 60803/24.12.2018

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ



Κάτοχος της Άδειας:
UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan, 144A - Block A
4818 CP Breda, Ολλανδία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαϊθάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Ποιύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακκούλες, σάκκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για ήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση
Αντίδοτο: Πενικιλιαμίνη.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



02/2022-5