

## ΚΑΤΑΝΓΚΑ ΕΞΠΡΕΣ:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπληρωματική και αποπληστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων, αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

## ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

## ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

**ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ-Λεμονιές-Μανταρινιές ΙΚήμηεντινές)-Πορτοκαλιές- Φράπα-Κίτρο-Περγαμόντο-Νεραντζιά):** Φυτόφθορα. Δόση: **250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, δεύτερος ψεκασμός τον Ιούλιο και τρίτος τον Οκτώβρη-Νοέμβρη (BBCH 39-91). **ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ:** Φυτόφθορα λαιμού και ριζών. Δόση: **250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ο πρώτος ψεκασμός τον Απρίλιο, ο δεύτερος τον Ιούλιο και ο τρίτος τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη (BBCH 39-91). **ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμο & επιτραπέζιο):** Περονόσπορος. Δόση: **250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας (BBCH 57-85). **ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ+Θ):** Φυτόφθορα λαιμού και ριζών. Δόση: **250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές: α) Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση (BBCH 12-59). β) Εμβάπτιση ριζώματος πριν την φύτευση. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ):** Περονόσπορος. Δόση: **200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). **ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ)-ΚΟΛΟΚΥΘΙ/ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Υ+Θ)-ΠΕΠΟΝΙ (Υ+Θ)-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ+Θ)-ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υ+Θ):** Περονόσπορος. Δόση: **200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89). **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ+Θ):** Περονόσπορος. Δόση: **200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-45). **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ<sup>2</sup> (Υ+Θ):** Φυτόφθορα. Δόση: α) **250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. β) **5-10 γρ./τ.μ.** Ριζοπότισμα.

## Όγκος ψεκαστικού υγρού/καλλιέργεια (λίτρα/στρέμμα):

Εσπεριδοειδή (100-150), Μηλιά-Αχλαδιά (80-120), Αμπέλι (30-110), Φράουλα (Υ+Θ)/προληπτικοί ψεκασμοί-Τομάτα (Υ+Θ) (100), Φράουλα (Υ+Θ)/εμβάπτιση ριζώματος (10), Αγγούρι (Υ+Θ)-Κολλοκύθι/Κολλοκυθάκι (Υ+Θ)-Πεπόνι (Υ+Θ)-Καρπούζι (Υ+Θ)-Κολλοκύθα (Υ+Θ) (80-100), Μαρούλι (Υ+Θ) (50-100), Καλλιπωστικά (Υ+Θ)/προληπτικοί ψεκασμοί (250-300).

## Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Εσπεριδοειδή-Μηλιά-Αχλαδιά (3), Αμπέλι (4 /10-14 ημέρες), Φράουλα (Υ+Θ)/προληπτικοί ψεκασμοί-Τομάτα (Υ+Θ)-Αγγούρι (Υ+Θ)-Κολλοκύθι/Κολλοκυθάκι (Υ+Θ) (1-3 / 8-10 ημέρες), Φράουλα (Υ+Θ)/εμβάπτιση ριζώματος (1), Πεπόνι (Υ+Θ)-Καρπούζι (Υ+Θ)-Κολλοκύθα (Υ+Θ) (1-2 / 8-10 ημέρες), Μαρούλι (Υ+Θ)

+Θ) (1-3 / 10-14 ημέρες), Καλλιπωστικά (Υ+Θ)/προληπτικοί ψεκασμοί (1-3 / 30 ημέρες), Καλλιπωστικά (Υ+Θ)/ριζοπότισμα (1-2 / 30 ημέρες).

**Παρατηρήσεις:** 1) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 2) Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

## ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμο & επιτραπέζιο): **28 ημέρες.**

Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιές, Μανταρινιές (Κήμηεντινές), Πορτοκαλιές, Φράπα, Κίτρο, Περγαμόντο, Νεραντζιά, Μαρούλι (Υ+Θ): **15 ημέρες.**

Φράουλα (Υ+Θ)/ψεκασμός φυλλώματος: **14 ημέρες.**

Τομάτα (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Κολλοκύθι/Κολλοκυθάκι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Κολλοκύθα (Υ+Θ): **3 ημέρες.**

Φράουλα (Υ+Θ)/εμβάπτιση ριζώματος, Καλλιπωστικά: **Δεν εφαρμόζεται.**

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δε συνιστάται η ανάμειξη του **Katanga Express® 80WG** με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δε συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου.

## ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

# Katanga Express® 80WG

Fosetyl-AI (Φοσετύλ-Αλ) 80%  
Εναιωρηματοποιησιμο κόκκοι

## Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

### ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Fosetyl-AI .....80% β/β

Βοηθητικές ουσίες .....16,7% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αρ. Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

A.A.Δ.A.: 60.328/04.07.2012

## ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ



Κάτοχος της Άδειας:  
**PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL**  
C/ Valle del Roncal 12, 28232 – Las Rozas,  
Μαδρίτη, Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
**ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559



E-E202/EO

Επιβραβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

### ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή (3) ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

### Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

