

ΜΙΚΡΟΒΕΙΟΛ ΣΠΕΣΙΑΛ: Μικητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δυο-τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό. Επειδή το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Άκαρι (*Eriophyes* sp.). Δόση: **200-500 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ:** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενιών. α) Ψίδιο. Δόση: **400-500 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογή πριν την άνθηση, στα στάδια πράσινη και ρόδινη κορυφή. β) Φουζικλάδιο. Δόση: **200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογή μετά την άνθηση, στην πτώση των πετάλων. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ:** Ψίδιο. Δόση: **300-400 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, στα στάδια πτώσης πετάλων, απόσπασης του κάλυκα και στο στάδιο καρπιδίου. **ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ:** Δόση: **200-500 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψίδιο. Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Ακάρεα (*Eriophyes* sp., *Phytoptus avelanae*). Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ:** Ψίδιο. Δόση: **200-500 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΕΛΙΑ (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής):** Ακάρεα της οικογένειας *Eriophyidae*. Δόση: **320 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή κατά το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών (Απρίλιο) και κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας). **ΛΩΤΟΣ-ΑΒΟΚΑΝΤΟ-ΠΑΠΑΓΙΑ- ΜΑΝΓΚΟ:** Ψίδιο. Δόση: **200-500 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΑΜΠΕΛΙ (οιονοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες):** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενιών. Ψίδιο. α) Δόση: **200-400 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογή όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. β) Δόση: **100-200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογή κατά την άνθηση, μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 ημέρες, μέχρι το στάδιο του 'γυαλίσματος' των ραγών, ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής. Ερίνωση. Δόση: **1000 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογή λίγο πριν τη διάγκωση των οφθαλμών. **ΦΡΑΟΥΛΙΑ (Υ+Θ):** Ψίδιο. Δόση: **500 γρ./στρ.** Άκαρι (*Eriophyes* sp., *Aculops lycopersici*). Δόση: **500-750 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής. **ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ-ΣΜΕΟΥΡΑ-ΜΥΡΤΙΛΛΑ:** Ψίδιο. Δόση: **500 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΚΑΡΟΤΑ (Υ+Θ)-ΠΑΝΤΖΑΡΙ-ΡΑΠΑΝΙΑ-ΛΑΓΟΧΟΡΤΟ-ΠΑΣΤΙΝΑΚΙ:** Ψίδιο. Δόση: **300-400 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΣΚΟΡΔΟ-ΚΡΕΜΜΥΔΙ:** Ψίδιο. Δόση: **300- 400 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ):** Ψίδιο, Ακάρεα (Τετράνυχος, *Eriophyes* sp., Παραμορφωτικό άκαρι). Δόση: **300 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι-Αγγουράκι-Κοθοκυθάκι-Κοθοκύθα-Πεπόνι-Καρπούζι) (Υ+Θ):** Ψίδιο. Δόση: **300 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενιών. **ΛΑΧΑΝΟ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΛΑΧΑΝΑΚΙ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (Υ+Θ):** Ψίδιο, Τετράνυχος. Δόση: **300 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής. **ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΑΛΑΤΙΚΑ-ΣΠΑΝΑΚΙ-ΛΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ-ΣΚΑΡΟΛΑ-ΚΙΧΩΡΙΟ-ΑΝΤΙΔΙ ΚΑΤΣΑΡΟ-ΡΑΔΙΚΙ:** Ψίδιο, Τετράνυχος. Δόση: **400 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής. **ΦΑΣΟΛΙΑ-ΜΠΙΖΕΛΙΑ (Αρακάς) (Φρέσκα με ροβό και χωρίς ροβό) (Υ+Θ):** Ψίδιο. Δόση: **300-400 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Ψίδιο, Τετράνυχος. Δόση: **500 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής. **ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΗΡΑ-ΜΠΙΖΕΛΙΑ ΞΗΡΑ (Αρακάς-Ρεβίθι) (Όσπρια):** Ψίδιο. Δόση: **300-400 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΠΑΤΑΤΑ:** Ψίδιο. Δόση: **500 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΗΛΙΑΝΘΟΣ-ΣΟΓΙΑ:** Ψίδιο. Δόση: **500 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** Ψίδιο. Δόση: **750-1000 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Τετράνυχος. Δόση: **240-480 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη αυτής. **ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ-ΒΡΩΜΗ-ΣΙΚΑΛΗ:** Ψίδιο. Δόση: **750-1000 γρ./στρ.** Συνήθως μία εφαρμογή όταν εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής του θελευταίου φύλλου, απαιτείται μία δεύτερη εφαρμογή στην αρχή του ξεσταχυάσματος. **ΛΥΚΙΣΚΟΣ:** Ψίδιο, Τετράνυχος. Δόση: **750-1200 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής. **ΚΑΙΠΝΟΣ:** Ψίδιο. Δόση: **400 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **ΚΑΛΩΣΠΙΣΤΙΚΑ-ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ):** Ψίδιο, Άκαρι (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*). Δόση: **200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογή μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής. **ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ-ΛΕΥΚΑ (Φυτώριο):** Ψίδιο. Δόση: **500 γρ./στρ.** Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ):

Εσπεριδοειδή (50-300), Μηλιά-Αχλαδιά (100-150), Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Κερασιά-Δαμασκηνιά-Λωτός-Αβοκάντο-Παπάγια-Μάνγκο- Αμπέλι (50-150), Φουντουκιά-Αμυγδαλιά-Φράουλα-Βατόμουρα-Σμέουρα-Μύρτιλη-Καρότα-Παντζάρι-Ραπάνια-Λαγόχορτο-Παστινάκι-Κρεμμύδι- Σκόρδο-Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά-Αγγούρι-Αγγουράκι-Κοθοκυθάκι-Κοθοκύθα-Πεπόνι-Καρπούζι-Λάχανο-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Λαχανάκι Βρυξελλών-Μαρούλι και λοιπά σαλατικά-Σπανάκι-Λυκοτριβόλο-Σκαρόλα-Κιχώριο-Αντίδι κατσαρό-Ραδικί-Φασόλια φρέσκα-Μπιζέλια φρέσκα (Αρακάς)-Αγκινάρα-Φασόλια Ξηρά (Όσπρια)-Μπιζέλια Ξηρά (αρακάς-ρεβίθι (όσπρια))-Πατάτα-Ηλίανθος-Καννός-Καλλιωπιστικά-Ανθοκομικά (Τριανταφυλλιά)-Δασικά δένδρα-Λεύκα (φυτώριο) (50-100), Ελιά (100-120), Σόγια (60-100), Ζαχαρότευτλα (Ψίδιο)-Σιτάρι-Κριθάρι-Βρώμη-Σικάλη (20-60), Λυκίσκος (100-200), Ζαχαρότευτλα (Τετράνυχος) (40-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καθημερινική περίοδο-Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Εσπεριδοειδή-Μηλιά-Αχλαδιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Κερασιά-Δαμασκηνιά-Φουντουκιά (Ψίδιο)-Αμυγδαλιά-Λωτός-Αβοκάντο-Παπάγια-Μάνγκο-Πατάτα-Λυκίσκος-Καννός-Καλλιωπιστικά-Ανθοκομικά (Τριανταφυλλιά) (8 / 7 ημέρες), Φουντουκιά (Ακάρεα) (2 / 7 ημέρες), Ελιά (2 / 30 ημέρες), Αμπέλι (8 / 10 ημέρες), Φράουλα (8 / 10-14 ημέρες), Βατόμουρα-Σμέουρα-Μύρτιλη (6 / 14 ημέρες), Καρότα (Υ+Θ)-Παντζάρι-Ραπάνια-Λαγόχορτο-Παστινάκι-Κρεμμύδι-Σκόρδο-Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά (Υ+Θ)-Αγγούρι-Αγγουράκι-Κοθοκυθάκι-Κοθοκύθα-Πεπόνι-Καρπούζι-Μαρούλι και λοιπά σαλατικά-Σπανάκι-Λυκοτριβόλο-Σκαρόλα-Κιχώριο-Αντίδι κατσαρό-Ραδικί-Φασόλια φρέσκα-Μπιζέλια φρέσκα (Αρακάς)-Αγκινάρα- Φασόλια Ξηρά (όσπρια)-Μπιζέλια Ξηρά (όσπρια)- αρακάς, ρεβίθι) (8 / 7- 10 ημέρες), Λάχανο-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Λαχανάκι Βρυξελλών (8 / 7- 15 ημέρες), Ηλίανθος (2 / 7 ημέρες), Σόγια-Ζαχαρότευτλα (Ψίδιο)-Σιτάρι-Κριθάρι-Βρώμη-Σικάλη (2 / 14 ημέρες), Ζαχαρότευτλα (τετράνυχος) (3), Δασικά δένδρα-Λεύκα (φυ-

τώριο) (3 / 7 ημέρες).

Παρατηρήσεις:

1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.

2) Η δόση/100λίτρο να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη επιτρεπτή δόση ανά στρέμμα.

3) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενιών.

4) Στις καλλιέργειες και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

5) Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειών.

6) Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.

7) Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.

8) Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των Ζαχαροτεύτλων.

9) Στα καλλιωπιστικά, λίην τριανταφυλλιάς, να διενεργείται δοκιμή μικρής έκτασης (σε 1-2 φυτά) πριν από τη γενικευμένη χρήση, για την αποφυγή φαινομένων φυτοτοξικότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ:

Στην καλλιέργεια του αμπελιού να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή, καθώς αφήνει σημάδια πάνω στους καρπούς.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Ελιά: **90** ημέρες.

Ζαχαρότευτλα: **Μη εφαρμοσίμοι.**

Λοιπές καλλιέργειες: -.



ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή ποτίου γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολλοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (όπως Starking, Delicious, κ.ά.), αχλαδιάς (όπως Δ'Anjou κ.ά.) και βερικοκιάς κάτω από συνθήκες υψηλής ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δε συνδυάζεται με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Microthiol® Special_{wc}

Sulphur (θειάφι) 80%
Βρέξιμοι κόκκοι

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Sulphur80% β/β

Βοηθητικές ουσίες19,2% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

χρήστες.

A.A.Δ.A.: 60496/07.01.2016

Αρ. Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **1** ΚΙΛΟ



ADAMA



Κάτοχος της ΄Αδειας:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Claudius Prinsenlaan, 144A - Block A, 4818 CP Breda, Ολλανδία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην ελληνική αγορά:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Να διατηρείται μόνον στον αρχικό περιέκτη.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση.

Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά την εφαρμογή.

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στον αγρό μετά την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακκίδια, σάκκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατεύσετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη ασφαλείας από ακαλλιέργητη γη:

-**5 μέτρων** σε αμπέλια, τροπικά δένδρα, ελιές, λυκίσκο, καλλιωπιστικά, όταν η εφαρμογή γίνεται με συμβατικά ακροφύσια.

-**10 μέτρων** σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες και σε δασικά δένδρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή γίνεται με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50% ή 5 μέτρων** με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75% ή 3 μέτρων** με την χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς κατά **90%.**

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε/επικοφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777.