



NIMROD 25 EW



ADAMA



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

EW - Γαλάκτωμα,
λάδι σε νερό

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση κατά του ωιδίου.



Εγγυημένη Σύνθεση

- **Bupirimate** 25% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 74,8% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Α.Α.Δ.Α.: 60897/07.10.2019

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** Εθν. Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211205570, Φαξ: 211205572

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



1
ΛΙΤΡΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.

Περιέχει Ethyl hexyl lactate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.

Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φπ και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, μπιτόνια) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για



ΟΜΑΔΑ 8 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλέστε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

L60077IPFR_01

Ανοίξτε εδώ

NIMROD 25 EW

NIMPONT 25 EW: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση κατά του ωιδίου. Απορροφάται από τα φύλλα και έχει διελασματική και διασυστηματική δράση καθώς και με ατμούς. Η μετακίνηση του προϊόντος στους αναπτυσσόμενους βλαστούς συμβάλλει στην προστασία των νέων φύλλων. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καλλιέργειες υπαίθρου και θερμοκηπίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο-τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ: Ωίδιο. Δόση: **60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 100-150 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Εφαρμογές από πριν την άνθηση έως την ωρίμανση (BBCH 51-85). **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ:** Ωίδιο. Δόση: **75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 100-150 λίτρα ψεκ. υγρό/ στρ. Εφαρμογές από το στάδιο της πλήρους άνθησης έως την ωρίμανση (BBCH 65-91). **ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες):** Ωίδιο. Δόση: **100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 80-150 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως την ωρίμανση (BBCH 15-85) **ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ+Θ):** Ωίδιο. Δόση: **100 κ.εκ./στρ.** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Εφαρμογές από το στάδιο του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την ωρίμανση (BBCH 11-85). **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ)-ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ)-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ):** Ωίδιο. Δόση: **100-200 κ.εκ./στρ.** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Εφαρμογές από το στάδιο των δύο (2) φύλλων έως την ωρίμανση (BBCH 12-89). **ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ)-ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Υ+Θ)-ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Υ+Θ):** Ωίδιο. Δόση: **100 κ.εκ./στρ.** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Εφαρμογές από το στάδιο του τρίτου (3^{ου}) φύλλου έως την ωρίμανση (BBCH 13-89). **ΠΕΠΟΝΙ (Υ+Θ)-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ+Θ)-ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υ+Θ):** Ωίδιο. Δόση: **100 κ.εκ./στρ.** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Εφαρμογές από το στάδιο των δύο (2) φύλλων έως την ωρίμανση (BBCH 12-89). **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Υ+Θ)-ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟ (Υ+Θ):** Ωίδιο. Δόση: **150-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Προληπτική εφαρμογή από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων (BBCH 10-97). **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ (Χρήση ήσσονος σημασίας)*:** Ωίδιο. Δόση: α) **60-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 100-150 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ., β) **100-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Ψεκασμός Άνοιξη έως Φθινόπωρο.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος-Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Μηλιά-Βερυκοκία Ροδακινιά- Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες)-Φράουλα (Υ+Θ) (1-4 εφαρμογές/10 ημέρες), Τομάτα (Υ+Θ)-Πιπεριά (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ) (1-4 εφαρμογές/10-12 ημέρες), Αγγούρι (Υ+Θ)-Αγγουράκι (Υ+Θ)-Κολοκυθάκι (Υ+Θ) (1-3 εφαρμογές/10 ημέρες). Πεπόνι (Υ)-Καρπούζι (Υ)-Κολοκύθα (Υ)-Καλλωπιστικά δένδρα (4 εφαρμογές/10 ημέρες), Πεπόνι (Θ)-Καρπούζι (Θ)-Κολοκύθα (Θ) (3 εφαρμογές /10 ημέρες), Τριανταφυλλιά (Υ+Θ)-Δαφνοκέραςο (Υ+Θ) (1-2 εφαρμογές/7-10 ημέρες).

Παρατηρήσεις:

1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. Χρησιμοποιείτε την υψηλότερη δοσολογία σε περίπτωση υψηλής έντασης της ασθένειας. 2) Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας. 3) Στις περιοχές που εφαρμόζονται να ακολουθούνται οι οδηγίες των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων. ***Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκνηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή την φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Για την αποφυγή εμφάνισης φαινομένων ανθεκτικότητας συνιστάται το Nimrod 25EW να χρησιμοποιείται σε προγράμματα εναλλαγής με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε άλλες ομάδες, με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), Μηλιά: **14 ημέρες.**

Βερικοκία, Ροδακινιά: **7 ημέρες.**

Φράουλα (Υ+Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ): **3 ημέρες.**

Αγγουράκι (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ), Κολοκυθάκι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ): **1 ημέρα.**

Δαφνοκέραςο (Υ+Θ), Τριανταφυλλιά (Υ+Θ): Δεν ορίζεται.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.