

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ



Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια.

Όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή, να αφérντε ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από αυτή.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία

Carimbo® SL

Glyphosate (Γκλυφοζέιτ) 18%
MCPA (Εμ Σι Πι Έι) 18%
Πυκνό διάλυμα (SL)

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA).

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Glyphosate18% β/ο
(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης24,29% β/ο)
MCPA18% β/ο
(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης23,3% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες56,4% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

UFI: XV00-Y061-100D-ETW9

A.A.D.A.: 70387/01.04.2020

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Αριθμός Παρτίδας: | ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία παραγωγής: | |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



ADAMA

lainco

Κάτοχος της Άδειας: LAINCO S.A.
Poligono Can Jordi, Av. Bizet, 8-12
08191, Rubi (Barcelona), Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα:

- 20 μέτρων σε μηλοειδή και πυρηνόκαρπα.
- 10 μέτρων σε ελιιά.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας:

- 10 μέτρων από μη γεωργική γη ή
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50 % ή
- 1 μέτρο σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακοηουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα ηρωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΚΑΡΙΜΠΟ:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και ηλιτύφυλλων) ζιζανίων. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA). Το glyphosate απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το MCPA απορροφάται από τα φύλλα και τις ριζές των ηλιτύφυλλων ζιζανίων και μετακινείται διά μέσου συμπλήστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-4 ημέρες μετά τον ψεκάσμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Κατευθυνόμενος ψεκάσμος του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-50 λίτρα νερό στο στρέμμα, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή των δραστικών υπολειμμάτων στους καρπούς. Χρησιμοποιείτε ακροφύσια τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξηλώσετε το βυτίο και όλη τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ-Λεμονιά-Μανταρινιά-Πορτοκαλιά-Φράπα-Κιτροπέμονα-Περγαμόντα-Κουμκουάτ-Νεραντζιά) (άνω των 3 ετών)-**ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Αχλαδόμηλα-Μουσομουλιά) (άνω των 3 ετών): Ετήσια αγρωστώδη^(α) και ηλιτύφυλλα^(β) ζιζάνια. Δόση: 400-600 κ.εκ./στρ. Ποησιετή^(γ) ζιζάνια. Δόση: 600 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκάσμος όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι). **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά-Βερκοκιά-Δαμασκηνιά-Κερασιά-Βυσσινιά) (άνω των 3 ετών): Ετήσια αγρωστώδη^(α) και ηλιτύφυλλα^(β) ζιζάνια. Δόση: 400-600 κ.εκ./στρ. Ποησιετή^(γ) ζιζάνια. Δόση: 600 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκάσμος όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι ή Άνοιξη-Φθινόπωρο). **ΕΛΙΑ** (ελαιοποιήσιμη & επιτραπέζια) (άνω των 3 ετών): Ετήσια αγρωστώδη^(α) και ηλιτύφυλλα^(β) ζιζάνια. Δόση: 400-600 κ.εκ./στρ. Ποησιετή^(γ) ζιζάνια. Δόση: 600 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκάσμος την Άνοιξη και το Φθινόπωρο. Εξάλειψη των παραφυάδων. Δόση: 600 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκάσμος στην βάση του κορμού, σε παραφυάδες μικρότερες από 25 εκ. την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Εσπεριδοειδή-Ελιά/Ετήσια αγρωστώδη και ηλιτύφυλλα ζιζάνια & Ποησιετή ζιζάνια (20-50), Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα (30- 50), Ελιά/Εξάλειψη των παραφυάδων (20).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Εσπεριδοειδή-Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα-Ελιά/Ετήσια αγρωστώδη και ηλιτύφυλλα ζιζάνια & Ποησιετή ζιζάνια (1-2 / 90 ημέρες), Ελιά/Εξάλειψη των παραφυάδων (1 εφαρμογή).

Παρατηρήσεις:

1) Εφαρμόζεται σε ήδη φυτρωμένα ζιζάνια. Τα αποτελέσματα της επέμβασης μπορούν να παρατηρηθούν σε 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή (ή μία εβδομάδα σε περιπτώση χαμηλών θερμοκρασιών). **2)** Για να επιτευχθεί μακρόχρονη δράση να αποφεύγονται οργάνωματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή. **3) Καταπολεμούμενα ζιζάνια:** α) Ετήσια Αγρωστώδη: Βρόμοι, Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, *Lolium spp.*, *Poa annua*, Σετάριας. β) Ετήσια Ηλιτύφυλλα: Βλήττα, Καφέβληττα, Καρδαμίνια, Κόνυζα, Περικοκλήδα, Αγρία ρόκα, *Erigeron sp.*, Μοιόχα, Μηδική, Ρανούγκουλιος, Μαρτιάκος, Ήμερο σινάπι, Ζωχοί, Στελλήρια, Βερνόνικα. γ) Ποησιετή ζιζάνια: Αγριάδα, Αηγοουρά, Μέντα, Οξαλίδα, Πεντάνευρο, Ταραξάκος, Αγριοτρίφυλλο. δ) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Ζωχοί, Αγριοτρίφυλλο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

• Ο ψεκάσμος των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλημένες πηλγές κηδέματος. • Ο ψεκάσμος επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπάρωνες από το 3ο έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. • Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητική μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. • Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες: glyphosate, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 9 (Ι) κατά HRAC και MCPA, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 4 (ΙΙ) κατά HRAC.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Ελιά: 60 ημέρες.

Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Δεν ορίζεται.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συστασόμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Το προϊόν μπορεί να βλάψει ευαίσθητες καλλιεργείες όπως αμπέλι, άλλα οπωροφόρα δένδρα, κηπευτικά, μηδική κ.α., γι' αυτό αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τις καλλιεργείες αυτές ακόμη και με τη μορφή αερομεταφερόμενων σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος. Στην περίπτωση γεινιάσης με καλλιεργείες μηδικής, πραγματοποιήστε την εφαρμογή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη σορά της καλλιεργείας αυτής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.