



RACER 25 EC



ADAMA



ZIZANIOKTONO

EC - Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων



Εγγυημένη Σύνθεση

- Flurochloridone 25% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 73,9 % β/β



Πεδίο εφαρμογής

Πατάτα, Καρότο, Παστινάκη, Ρίζα Μαϊντανού, Ηλιάνθος, Σελινόριζα, Βαμβάκι



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Α.Α.Δ.Α.: 70261/12.12.2017

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σάρωση για χρήση



1 ΛΙΤΡΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/ φλόγες/ θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.

Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέτρα προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την εφαρμογή. Η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ κλειστής καμπίνας

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την επανείσοδο στον αγρό. Διάθεση του περιεκτώ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.



ΟΜΑΔΑ 12 ZIZANIOKTONO

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης στις καλλιέργειες πατάτας, ηλιάνθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας μαϊντανού και σελινόριζας.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες πατάτας, ηλιάνθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας μαϊντανού και σελινόριζας και 10 μέτρων στην καλλιέργεια του βαμβακιού.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους: α) Στις καλλιέργειες πατάτας, ηλιάνθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας μαϊντανού και σελινόριζας: ● να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη ή ● να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, ή ● να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%, β) Στην καλλιέργεια του βαμβακιού: ● να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή ● να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Ανοιξτε εδώ

L60049IPFR_01

RACER 25 EC

ΡΕΪΣΕΡ: Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τις ρίζες, το στέλεχος και τα κολεόπυλα. Δρα εμποδίζοντας τη σύνθεση των πρωτεϊνολιπιδίων που εμποδίζει τη φωτοσύνθεση της χλωροφύλλης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Στόχος: Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων Π*Π.

ΠΑΤΑΤΑ: Δόση: 150-200 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων. **ΚΑΡΟΤΟ-ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ-ΡΙΖΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ-ΗΛΙΑΝΘΟΣ:** Δόση: 150-300 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων. **ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ:** Δόση: 150 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Δόση: 100-150 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμογή προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):

Πατάτα-Βαμβάκι-Ηλιάνθος (20-40), Καρότο-Παστινάκη-Ρίζα μαϊντανού-Σελινόριζα (20-30).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

1) Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αυξάνεται με την εδαφική υγρασία. 2) Σε ξηρικές εδαφικές συνθήκες συνιστάται ελαφριά ενσωμάτωση του σκευάσματος με πότισμα. 3) Σε περίπτωση που βρέξει δυνατά μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου είναι πιθανόν να παρατηρηθεί σε μικρό βαθμό κίτρινισμα ή λεύκανση των φύλλων της καλλιέργειας. Το φαινόμενο αυτό είναι παροδικό και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις. 4) **Καταπολεμούμενα Ζιζάνια:** Ευαίσθητα. α) Δόση 100 κ.εκ/στρ.: Τάτουλας, Ζωχός, Λουβουδιά, Δωδεκάνθι, Αντράκλα. β) Δόση 150 κ.εκ/στρ. (επιπλέον των προαναφερθέντων): Αναγαλλίδα, Αγριοπιπεριά, Μαρτιάκος, Σετάρια, *Solanum physalifolium*.

γ) Δόση 200 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων): Τραχύ Βλήτο, Σκαρολάχο, Αγριοπανσές, Αγριοντοματιά. δ) Δόση 300 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων): Πολυκόμπι, Μουχρίτσα, Στριγγλόχορτο, *Kickxia spuria*, Χαμομήλι. Μετρίως Ευαίσθητα. α) Δόση 100 κ.εκ/στρ.: Τραχύ Βλήτο, *Solanum physalifolium*, Σετάρια. β) Δόση 150 κ.εκ/στρ.: Τραχύ Βλήτο, Αναρριχώμενο πολύγωνο, Πολυκόμπι, Αγριομελιτζάνα. γ) Δόση 200 κ.εκ/στρ.: Μουχρίτσα, Αναρριχώμενο πολύγωνο, Ηλιοτρόπιο, Πολυκόμπι, Αγριομελιτζάνα. δ) Δόση 300 κ.εκ/στρ.: Αναρριχώμενο πολύγωνο, Αγριοπιπεριά,

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Δεν απαιτείται.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

●Θα πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του σκευάσματος και της σποράς ή της φύτευσης της επόμενης καλλιέργειας ή της καλλιέργειας αντικατάστασης και αφού προηγηθεί όργωμα του εδάφους. ●Στην περίπτωση των σιτηρών, συστήνεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. ●Σε πρόγραμμα αμειψισποράς μπορεί να ακολουθούν οι εξής καλλιέργειες: Σόγυ, αραβόσιτος και σόργο μπορούν να φυτευτούν μετά την καλλιέργεια του ηλιάνθου ή της πατάτας. ●Τα μπιζέλια, η εαρινή ελαιοκράμβη, τα ζαχαρότευτλα, οι κράμβες και κτηνοτροφικά τεύτλα δεν πρέπει να σπαρούν ως επόμενες καλλιέργειες ή ως καλλιέργειες αντικατάστασης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Πατάτα, Καρότο, Παστινάκη, Ρίζα Μαϊντανού, Σελινόριζα, Βαμβάκι, Ηλιάνθος: **Δεν εφαρμόζεται.**

Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Το σκεύασμα διατηρείται στην αρχική του απαρβίαση συσκευασία σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και προστατευμένο από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.



RACER 25 EC



ADAMA



ZIZANIOKTONO

EC -
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό



Εγγυημένη Σύνθεση

● **Flurochloridone** 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 73,9 % β/β



Πεδίο εφαρμογής

Πατάτα, Καρότο, Παστινάκη, Ρίζα Μαϊντανού, Ηλιανθος, Σελινόριζα, Βαμβάκι



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Α.Α.Δ.Α.: 70261/12.12.2017

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559,
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: **ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**



Σάρωση για χρήση



1
ΛΙΤΡΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβryo.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/ φλόγες/ θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.

Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέτρα προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση. Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την εφαρμογή. Η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ κλειστής καμπίνας.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την επανείσοδο στον αγρό. Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος απο-



ΟΜΑΔΑ 12 ZIZANIOKTONO

χέυσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης στις καλλιέργειες πατάτας, ηλιανθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας μαϊντανού και σελινόριζας.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες πατάτας, ηλιανθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας μαϊντανού και σελινόριζας και 10 μέτρων στην καλλιέργεια του βαμβακιού.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους: α) Στις καλλιέργειες πατάτας, ηλιανθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας μαϊντανού και σελινόριζας: ●να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη ή ●να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, ή ●να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%. β) Στην καλλιέργεια του βαμβακιού: ●να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή ●να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

L60049IPFR_0J