

PENDIGAN 400 CS

ΠΕΝΤΙΓΚΑΝ 400: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων κατά το φύτευμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλοξικό καπνού. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προοπτρικά με ενσωμάτωση, προφυτρωτικά επιφανειακά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Επίσης εφαρμόζεται ως αντιφυλλοξικό καπνού ψεκάζοντας τα κορυφολογημένα καπνόφυτα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση ψεκαστικού μικρότερη από 3

–4 ατμόσφαιρες (45–60 PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει Pendimethalin και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, αμπέλι, φράουλα, πατάτα, κράμβες, καρότο, σκόρδο, ασκαλώνιο, κρεμμύδι, τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, πεπόνι, μαρούλι, σκαρόδα, πράσο, αγκινάρα, σόγια, ηλιανθο, αραβόσιτο και γλυκό αραβόσιτο, ψυχάνθη, όστρια, καπνό και φυτώρια.

- Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 10 μέτρων με φυτική κάλυψη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% σε εσπεριδοειδή, δημητριακά,

βαμβάκι, χλοοτάπητα και καλλωπιστικά.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην μολύνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής, απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

L60045TPBR_01



PENDIGAN 400 CS

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή από το στάδιο του ληθάργου έως οι καρποί να λάβουν το 50% του τελικού τους μεγέθους.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσμουλιά) - ΠΥΡΗΝΟ-ΚΑΡΠΑ(Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηλιά-Κερασιά): Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή από το τέλος της ωρίμανσης έως οι καρποί να λάβουν το 50% του τελικού τους μεγέθους.
ΑΚΡΟΔΡΥΑ(Αμυγδαλιά-Φουντουκιά-Καστανιά-Κυδωνιά-Φιστικιά): Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή από το τέλος της ωρίμανσης έως το τέλος της άνθησης.
ΑΜΠΕΛΙ(επιτραπέζια & οινοποίησης): Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή (ξεκινώντας μετά τη συγκομιδή) από όταν το 50% των φύλλων έχουν πέσει έως την πλήρη έκπτυξη των ταξιανθιών.
ΦΡΑΓΟΥΛΑ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση, με ενσωμάτωση.
ΚΑΡΟΤΟ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προσπαρτικά ή προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά στο στάδιο των 3-4 φύλλων.
ΠΑΤΑΤΑ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προφυτρωτικά.
ΣΚΟΡΔΟ-ΑΣΚΑΛΟΝΙΟ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προφυτρωτικά ή χωρίς μεταφυτρωτικά έως το στάδιο των 3 φύλλων.
ΚΡΕΜΜΥΔΙ (από σπόρο): Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά στο στάδιο των 2-5 φύλλων.
ΚΡΕΜΜΥΔΙ (μεταφυτεύσιμο): Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή πριν την μεταφύτευση με ενσωμάτωση ή μετά την μεταφύτευση.
ΠΙΠΕΡΙΑ(Υ-ΤΟΜΑΤΑ(Υ)-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ(Υ)-ΠΕΠΟΝΙ-ΠΡΑΣΟ): Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή πριν την μεταφύτευση με ενσωμάτωση.
ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΛΑΧΑΝΟ-ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΩΝ-ΜΑΡΟΥΛΙ-ΣΚΑΡΟΛΑ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προφυτρωτικά με ενσωμάτωση.
ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προφυτρωτικά με ενσωμάτωση ή σε εγκατεστημένη φυτεία κατά τη διάρκεια του ληθάργου.
ΨΥΧΑΝΘΗ(Φασόλι-Μπιζέλι-Κουκιά)-ΟΣΠΡΙΑ(Φασόλι-Μπιζέλι-Κουκιά-Ρεβύθι-Φακή)- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ-ΒΙΚΟΣ-ΛΟΥΠΙΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΟΥΚΙΑ-ΒΑΜΒΑΚΙ-ΗΛΙΑΝΘΟΣ-ΣΟΓΙΑ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας.
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ-ΓΛΥΚΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-400**

κ.εκ./στρ. Εφαρμογή προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά στο στάδιο των 1-3 φύλλων.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (Σπάρη [μυλακό & σκληρό] -Κριθάρι-Βρώμη-Σίκαλη-Τριτάλη): Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προφυτρωτικά, ως την εμφάνιση των πρώτων κοτυληδόνων ή μεταφυτρωτικά ως την αρχή του αδελφώματος.
ΚΑΠΝΟΣ (σαν ζιζανιοκτόνο): Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση.
ΚΑΠΝΟΣ (σαν αντιφυλλίζακο των Αμερικανικών καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια): Παρεμπόδιση έκπτυξης μασχαλαίων οφθαλμών (φυλλίζων). Δόση: **1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογή στις αρχές της άνθησης αφού κορυφολογηθούν τα καπνά αρκετά χαμηλά με 20 κ.εκ. ψεκ.υγρού/φυτό. (από την εμφάνιση των ταξιανθιών μέχρι την εμφάνιση της 1ης κλειστής στεφάνης).
ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή στο στάδιο του ληθάργου.
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή μεταφυτρωτικά.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Εσπεριδοειδή-Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα-Ακρόδρυα-Αμπέλι-Φράουλα-Καρότο-Πατάτα-Σκόρδο-Ασκαλώνιο-Κρεμμύδι (από σπόρο και μεταφυτεύσιμο)-Πιπεριά (Υ)-Τομάτα(Υ)-Μελιτζάνα (Υ)-Πεπόνι-Μπρόκολο-Λάχανο-Λαχανάκια Βρυξελλών-Μαρούλι-Σκαρόλα-Αγκινάρα-Πράσο-Ψυχανθή-Όσπρια-Κτηνοτροφικό μπιζέλι-Βίκος-Λούπινο-Κτηνοτροφικά κουκιά-Βαμβάκι-Ηλιανθος-Σόγια-Αραβόσιτος-Γλυκός Αραβόσιτος-Δημητριακά-Καπνός (σαν ζιζανιοκτόνο)-Καλλωπιστικά Δένδρα-Φυτάκια (10-50), Καπνός (σαν αντιφυλλίζακο των Αμερικανικών καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια) (40), Χλοοτάπητας (20-50).

Μείγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

1) Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Pendigan 400CS.
2) Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια: α) Ευαίσθητα ζιζάνια: Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Πάνικο, Ήρα, Πόα. β) Μετρίως ευαίσθητα: Αλμπέκουρος, Σετάρια, Βέλιουρας. **3) Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια:** α) Ευαίσθητα ζιζάνια: Αναγallis, Βλήτο, Γεράνιο, Αγριο σιτάφι, Λάμιο, Ανθεμίδα, Λουβουδιά, Καλέντουλα, Λάμιο πορφυρό, Παπαρούνα, Αντράκιο, Αγριοντοματιά, Στελλάρια, Βερόνικα, Ζωχός. β) Μετρίως ευαίσθητα: Αγριομαματιά, Καφέλλα, Κίρσιο, Λουβουδιά, Περικοκλάδα, Άγρια ρόκα, Καπνόχορτο, Κολλητοσίδα, Χαμομήλι, Πολύγονο, Μαρτιάκος, Τσουκνίδα, Βερόνικα, Γαϊδουράγκαθο, Τριβόλι. **4) Προσομοιάστε καλά το έδαφος πριν την σπορά ή την μεταφύτευση ώστε να είναι επίπεδο, ψιλοχματισμένο και αρκετά συμπαγές.**
5) Σπείρετε τις καλλιέργειες σε ομοιόμορφο βάθος σποράς έτσι ώστε να μην ξεσκαπίζονται ή να μένουν σπόροι στην επιφάνεια.
6) Στις

μεταφυτρτικές εφαρμογές, τα ζιζάνια θα πρέπει να είναι σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτυληδόνας). **7)** Η δράση του **Pendigan 400CS** στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση-«ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. **8)** Η εφαρμογή σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα και Εσπεριδοειδή στα στάδια της ανθοφορίας και μετά τον σχηματισμό των καρπών να γίνεται με μπεκ που φέρουν καλύπτρες. **9)** Στο βαμβάκι μετά την προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή μετασπαρτικά, προφυτρωτικά της καλλιέργειας με ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία fluometuron στη δόση 250 κ.εκ/στρ. (σκευάσμα 50% περιεκτικότητας σε δρων συστατικό) ή 125 γρ. δραστική ουσία/στρ. για την καλύτερη αντιμετώπιση του στύφνου (*solanum nigrum*). **10)** Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περικοκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη - μέσης έως υψηλής περικοκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών. **11)** Το **Pendigan 400CS** καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτυληδόνας). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. **12)** Προτεινόμενα είδη καλλωπιστικών φυτών: Τούγια, είδη *Prunus* sp., Κουπρεσοκύπαρις, Βιβόρνο, Κράταιγος, Ήμερο πουρνάρι, Πασχαλιά, Μανόλια, Δρυς, Φοίνικας, Πεύκο, Λεύκα, Πλάτanos, Ιτιά κλαίοσα, Ροδόδεντρο, Πιεύς, Κυδωνιάστρο, Κυπαρίσσι, Πυράκανθα, Φορούθια, Άρκευθος, Αγγελική, Μურτά, Χαμαίροπα, Φωτίνια, Λιγούστρο, Γιούκα, Μυόπορο, Γλυτσίνια. **13)** Το **Pendigan 400CS** είναι ασφαλές κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη καλλωπιστικών (φυτά, θάμνοι, δέντρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητα του σε όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, μπορεί να προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επομένως, συστήνεται, πριν τη γενικευμένη χρήση, η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών και η εξέτασή τους 1-2 μήνες μετά για πιθανή φυτοτοξικότητα. **14)** Μην κάνετε καθολικούς ψεκασμούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς μεταφύτευση. Μην εφαρμόζετε το **Pendigan 400CS** σε καλλωπιστικά φυτά που έχουν εμβολιαστεί ή είναι σε έντονη βλαστητική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία. Μην εφαρμόζετε το **Pendigan 400CS** σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη βλαστητική ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω

στο φύλλωμα, τους οφθαλμούς ή τα άνθη. Φροντίστε ώστε το έδαφος να μην έχει σκασίματα ή ρωγμές που ενδεχόμενα θα επιτρέψουν την επαφή του **Pendigan 400CS** με το ριζικό σύστημα των καλλωπιστικών φυτών. Όταν το ριζικό σύστημα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε την εφαρμογή του **Pendigan 400CS** πριν τον εμβολιασμό ή την άνθηση των φυτών. Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλωπιστικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, μην τα φυτέψετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί **Pendigan 400CS** κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Για φυτά που μεταφυτεύονται γυμνόριζα, μην εφαρμόζετε το **Pendigan 400CS** πριν περάσουν 2-4 εβδομάδες από τη μεταφύτευσή στην οριστική τους θέση. **15)** Μην εφαρμόζετε το **Pendigan 400CS** σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές. **16)** Στον κλοσάπητα, το προϊόν να εφαρμόζεται μετά τον 2ο χρόνο από την εγκατάσταση αγρωστωδών ειδών *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca* spp. και *Agrostis stolonifera* (κουρεμένο σε ύψος μεγαλύτερο από 1,5 εκ.)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

- Διαχείριση ανθεκτικότητας: α) εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) ώστε να μειωθούν οι αριθμοί των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες, β) εφαρμογή σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, συνιστάται βαθειά άροση πριν τη σπορά.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από τις συνιστώμενες στον ίδιο αγρό την ίδια καλλιεργητική περίοδο, πριν περάσουν έξι μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου και αφού προηγηθεί βαθιά άροση. Ζαχαρότευτλα μπορούν να σπαρθούν 10 μήνες μετά την εφαρμογή του **Pendigan 400 CS** και αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Όλες οι καλλιέργειες: Μη εφαρμόσιμο λόγω χρόνου εφαρμογής.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική απορραβαστή συσκευασία του, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.