



FOLIMAR YIELD



ADAMA



ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Υγρό οργανο-μεταλλικό λίπασμα
3,5 % Κ

Υγρο οργανο-μεταλλικό λίπασμα με Κάλιο και εκχύλισμα *Ascorhyllum nodosum*



Εγγυημένη Σύνθεση

- Ολικό Υδατοδιαλυτό Κ2Ο 3,5 %
 - Υδατοδιαλυτό Βόριο (B) 0,5 %
 - Υδατοδιαλυτός χηλικός Ψευδάργυρος (Zn) 1,5 %
- Οργανικός άνθρακας (Corg): 10 %
Οργανικό άζωτο (Norg)
φυτικής προέλευσης > 1.5 %



Συστατικά

Vinasse EC no. 932-215-9 (ΚΣΥ 6: Υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων) Χηλικός Zn EC no. 237-865-0 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών)
Εκχύλισμα *Ascorhyllum nodosum* EC no. 283-907-6 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών)
Boron ethanolamine EC no. 701-024-0 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών)



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Παρασκευαστής: ADAMA ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Λ.
Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 2111205555,
Φαξ: 2111205559
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



1
ΛΙΤΡΟ

FOLIMAR YIELD

Μακριά από παιδιά.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
2107793777

ΦΟΛΙΜΑΡ ΓΙΑΝΤ

Το Folimar Yield είναι ένα υγρό οργανο-μεταλλικό λίπασμα το οποίο αυξάνει την παραγωγή ενισχύοντας την μεταβολική δραστηριότητα των φυτών την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Ο συνδυασμός των ανόργανων στοιχείων (βόριο + ψευδάργυρος) μεταεκχυλίσματα φυκιών αυξάνει τον αριθμό των άνθων, επιδρά θετικά στη γονιμοποίησή τους και κατ' επέκταση αυξάνει την τελική παραγωγή. Το Folimar Yield βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, αυξάνει την αντοχή στο αβιοτικό στρες, έχει παρόμοια δράση με τις ορμόνες, βελτιώνει την ποιότητα της άνθησης, βελτιώνει τη ανάπτυξη των καρπών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρακάτω δόσεις προτείνονται από τον παρασκευαστή. Μην τις υπερβείτε.

Συμβουλευθείτε τον γεωπονικό σύμβουλό σας για πιο ακριβείς προτάσεις, βασισμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας, προς αποφυγή υπερλίπανσης. Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ADAMA ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Λύσεις για τη Γεωργία. **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Δόση εφαρμογής: 100-200 κ.εκ. / στρ. Εφαρμογή ψεκασμού φυλλώματος. Από την άνθηση έως την πτώση των πετάλων, 2 ή περισσότερες εφαρμογές, ανάλογα με τον εκάστοτε καλλιεργητικό κύκλο.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Δόση εφαρμογής: 150-200 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογή ψεκασμού φυλλώματος. Από την άνθηση έως την πτώση των πετάλων, 2 ή περισσότερες εφαρμογές, ανάλογα με τον εκάστοτε καλλιεργητικό κύκλο.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
- ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρήστε το σε θερμοκρασία > 0 ° C και <35 ° C.

1600821PFR_01