



ZIZANIOKTONO

OD - Ελαιώδες
εναιώρημα

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο μίγμα δύο δραστικών (Mesosulfuron + Pinoxaden), για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά.



Εγγυημένη Σύνθεση

- Mesosulfuron-methyl 1,2% β/ο
 - Pinoxaden 6% β/ο
 - Αντιφυτοτοξική
Ουσία: Mefenpyr-diethyl ... 3,5% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 88,67 % β/β



Πεδίο εφαρμογής

Σιτηρά Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



Σημαντικές Πληροφορίες

Α.Α.Δ.Α.: 70554/12.09.2024
Κάτοχος της άδειας: **ADAMA ΕΛΛΑΣ**
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 151 25
Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 211205570
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία
παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για Χρήση



1
ΛΙΤΡΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει **riπoxaden**. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά το ψεκασμό, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συνιστήνεται η χρήση γαντιών.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο)



ΠΡΟΣΟΧΗ

και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη

ΟΜΑΔΑ B | 1 ZIZANIOKTONO

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα στα χειμερινά σιτηρά.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα καλά με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

L12400IPFR_01

Product name	Edaptis OD	
Country	GR	
Package size	1 ΛΙΤΡΟ	
Label code	L12400IPFR_01	
Label dimensions (w x h)	273mm x 148mm	
Label date	17-03-29 16.09.24	Name
Smallest font on page	6.86 pt	Status
		Template Round_ILT_Llang_NA_EL.indt

EDAPTIS OD

ΕΝΤΑΠΤΙΣ: Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο μίγμα δύο δραστικών (Mesosulfuron + Pinoxaden), για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά.

Το mesosulfuron είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονουριών. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξυγαλακτικού, σταματώντας τη βιοσύνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξή τους.

Το pinoxaden δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου ACCase, απαραίτητο ένζυμο για τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός με 8-40 λίτρα νερό/στρ. υπό συνεχή ανάδευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινείτε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Εφαρμόστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ - ΣΙΚΑΛΗ: Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια*. Δόση: **75 κ.εκ./στρ.** Μεταφυτρωτική εφαρμογή από τα 3 φύλλα μέχρι λίγο πριν την έναρξη του αδελφώματος (BBCH 13-20). **ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ:** Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια*. Δόση: **100 κ.εκ./στρ.** Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την έναρξη του αδελφώματος μέχρι το φύλλο σημαία (BBCH 20-39). **ΣΙΤΑΡΙ ΕΑΡΙΝΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ:** Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια*. Δόση: **100 κ.εκ./στρ.** Μεταφυτρωτική εφαρμογή από τα 3 φύλλα μέχρι το φύλλο σημαία (BBCH 13-39).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 8-40 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: 1. Η χρήση στο Σιτάρι περιλαμβάνει τη χρήση στο Τριτικάλε (TTLRI) και τις χρήσεις στις καλλιέργειες Σπέλτα (TRZSP), Μονόκοκκο Σιτάρι (TRZMO), Δίκοκκο Σιτάρι (TRZDI) και Tritordeum (ITTOG). 2. Η χρήση στη Σίκαλη να αποφεύγεται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται σε συνθήκες καταπόνησης. *Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Στη δόση των 75 κ. εκ. / στρ. α) Ευαίσθητα: Αλεπονουρά, Μίλιο, Φάλαρη, Τραχειά Πόα, Κοινή Πόα, Ήμερο Σινάπι, Άγριο Σινάπι. β) Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, Ήρα, Αναγαλλίδα, Ridolfia segetum, Άγρια Ρόκα. Στη δόση των 100 κ. εκ.

/ στρ. α) Ευαίσθητα: Αλεπονουρά, Μίλιο, Φάλαρη, Τραχειά Πόα, Κοινή Πόα, Αγριοβρώμη, Ήμερο Σινάπι, Άγριο Σινάπι. β) Μετρίως ευαίσθητα: Ήρα, Ridolfia segetum, Άγρια Ρόκα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία mesosulfuron που ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC και τη δραστική ουσία pinoxaden που ανήκει στην ομάδα 1 κατά HRAC. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στον ίδιο αγρό μπορούν σπαρθούν εντός 30 ημερών: ● Για την εφαρμογή μέχρι την έναρξη του αδελφώματος (BBCH 13-19) σιτάρι και καλαμπόκι μετά από ελαφρύ όργωμα και σιτηρά, καλαμπόκι, σόργο, σόγια και ηλιάνθος μετά από βαθύ όργωμα. ● Για την εφαρμογή από την έναρξη του αδελφώματος (BBCH 20-39) σιτάρι, καλαμπόκι και σόγια μετά από ελαφρύ όργωμα και σιτηρά, ελαιοκράμβη, μπιζέλια, καλαμπόκι, σόργο και ηλιάνθος μετά από βαθύ όργωμα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Την επόμενη καλλιεργητική περίοδο μπορούν να σπαρθούν μετά από βαθύ όργωμα σιτηρά, ελαιοκράμβη, μπιζέλια για φθινοπωρινές καλλιέργειες και όλες οι καλλιέργειες την άνοιξη.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε προτού στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό επί της φυλλικής επιφάνειας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

[Σιτάρι, Τριτικάλε, Σπέλτα, Μονόκοκκο σιτάρι, Δίκοκκο σιτάρι, Tritordeum (0500090)], Σίκαλη (0500070): Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά και μικρής έντασης συμπτώματα φυτοτοξικότητας, τα οποία δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ : Στην αρχική απара-βίαση συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Product name	Edaptis OD	
Country	GR	
Package size	1 LITRO	
Label code		
Label dimensions (w x h)	255mm x 143mm	
Label date	17-03-29 16.09.24	Name
Smallest font on page	<SmallestFont>	Status
		Template Round_ILT_ILang_NA_EL.indt