



NEXTER 10 SC[®]

ENTOMOKTONO - ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

Listen ▶ Learn ▶ Deliver



ΠΡΟΣΟΧΗ. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

ADAMA Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. Λύσεις Για Τη Γεωργία
Monumental Plaza 7ος όροφος Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ.: 211 120 5555, Fax: 211 120 5559



Το παρόν τυπώθηκε Απρίλιο 2025



ENTOMOKTONO - ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

**Ακαριαία δράση,
μακρά προστασία!**

Listen ▶ Learn ▶ Deliver

ADAMA.COM

NEXTER 10 SC®



Το **NEXTER 10 SC®** είναι ένα εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο επαφής που ανήκει στην κατηγορία των πυριδαζινών. Χρησιμοποιείται κυρίως για την καταπολέμηση ακάρεων και του αλευρώδους σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών, λαχανικών (Θ) και καλλωπιστικών φυτών (Θ).

Το **Pyridaben** είναι αναστολέας της μεταφοράς ηλεκτρονίων στο Σύμπλοκο Ι της μιτοχονδριακής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων (Ομάδα IRAC 21Α). Η αναστολή αυτή διακόπτει τη ροή των ηλεκτρονίων, μειώνοντας την παραγωγή ATP και προκαλώντας ενεργειακή ανεπάρκεια στα ακάρεα και τα έντομα, οδηγώντας τελικά στον θάνατό τους.


+ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Ευρύ φάσμα δράσης:** Καταπολεμά διάφορα είδη ακάρεων και του αλευρώδη (π.χ. *Tetranychus spp.*, *Panonychus spp.*, *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum* κ.ά).
- **Ταχεία δράση:** Προκαλεί γρήγορη θανάτωση των ακάρεων, συνήθως μέσα σε λίγες ώρες.
- **Μη διασυστηματικό:** Δε μετακινείται μέσα στο φυτό, μειώνοντας την πιθανότητα φυτοτοξικότητας.
- **Μακρά υπολειμματική δράση:** Παρέχει προστασία για αρκετές ημέρες.
- **Χαμηλός κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας** όταν εφαρμόζεται σωστά και εναλλάσσεται με άλλες δραστικές ουσίες.

Αποτελεσματικότητα και knock-down δράση σε διάφορα είδη τετράνυχων




*HAA: Ώρες μετά την εφαρμογή



Pyridaben 10%

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 2200/08.11.2018

Αποτελεσματικότητα & διάρκεια δράσης σε αλευρώδεις



Το NEXTER 10 SC® έχει μεγαλύτερη υπολειμματική διάρκεια στους αλευρώδεις σε σχέση με τον Χημικό Μάρτυρα.

Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ (Κ.ΕΚ./ΣΤΡ.)	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡ.	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά Γκρέιπφρουτ Λεμονιά Μανταρινιά Φράπα Λιμμετία (Πράσινο λεμόνι) Κιτριά Νεραντζιά	Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus citri</i> Χρήση ήσσονος σημασίας: Μαύρος αλευρώδης* <i>Aleurocanthus spiniferus</i>	300	150-200	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση της προσβολής, από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο της ωρίμασης για συγκομιδή BBCH 69-83
Τομάτα (Θ) Πιπεριά (Θ) Μελιτζάνα (Θ) Αγγούρι (Θ) Αγγουράκι (Θ) για τουρσί Κολοκυθάκι (Θ)	Τετράνυχος <i>Tetranychus sp.</i> Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	200	100-140	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας /άνθους μέχρι την πλήρη ωρίμαση BBCH 51-89

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του μαύρου αλευρώδη στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».