



SONAVIO®

ZIZANIOKTONO

**Στοχευμένη δράση –
Αποτελεσματικός έλεγχος!**



ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



ADAMA Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. Λύσεις Για Τη Γεωργία
Monumental Plaza 7ος όροφος Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι-Αθήνα | Τηλ.: 211 120 5555

Το παρόν τυπώθηκε Μάρτιο 2025



SONAVIO®
Η σύγχρονη λύση
στην καταπολέμηση των
Πλατύφυλλων Ζιζανίων



ZIZANIOKTONO

Listen • Learn • Deliver

ADAMA.COM

Αποτελεσματικός Έλεγχος Πλατύφυλλων Ζιζανίων

Το Sonavio® προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο βασικών πλατύφυλλων ζιζανίων, όπως αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*), βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), λουβουδιά (*Chenopodium album*) και αντράκλα (*Portulaca oleracea*).

Τρόπος Δράσης

Η δραστική ουσία **bifenox** είναι ένα **ζιζανιοκτόνο επαφής**, που ανήκει στην ομάδα των **αναστολέων ΡΡΟ** (οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου, HRAC Group E). Το Sonavio® **σχηματίζει ένα ενεργό στρώμα** στην επιφάνεια του εδάφους, αποτρέποντας το **φύτρωμα των ζιζανίων**.

Πλεονεκτήματα

- Δρα αποτελεσματικά σε σημαντικά πλατύφυλλα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο.
- Εκλεκτικό ως προς τις καλλιέργειες
- Κατάλληλο για διαχείριση ανθεκτικότητας (χαμηλός κίνδυνος)
- Αναμειγνύεται εύκολα με άλλα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα

Πεδίο εφαρμογής

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΔΟΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τομάτα	80-100 κ.εκ. σκ. /στρ	5 ημέρες πριν τη μεταφύτευση BBCH 00 και μεταξύ των μηνών Απριλίου - Ιουλίου
Μαρούλι, Λυκοτρίβολο, Σκαρόλες, Πλατύφυλλα Αντίδια	80-100 κ.εκ. σκ. /στρ	5-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση BBCH 00 και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου
Καρότο	80-100 κ.εκ. σκ. /στρ	Μετά τη μεταφύτευση έως τα 3-4 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας BBCH 13-14 και μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου - Οκτωβρίου
Κρεμμύδι (από βολβούς), Σκόρδο, Ασκαλώνια	75-100 κ.εκ. σκ. /στρ	Μετά την σπορά των βολβών πριν το φύτεωμα των φυτών BBCH 00 και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου ή 2 εφαρμογές έως τα 3-4 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας BBCH 13-14 και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου
Αγκινάρα	80-100 κ.εκ. σκ. /στρ	Πριν τη μεταφύτευση BBCH 00 και μεταξύ των μηνών Αυγούστου - Ιανουαρίου ή κατά τη διάρκεια του ληθάργου BBCH 90-00 και μεταξύ των μηνών Αυγούστου - Ιανουαρίου
Μαϊντανός	80-100 κ.εκ. σκ. /στρ	5-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση BBCH 00 και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου

Προτεινόμενος Χρόνος Εφαρμογής

- Να μην εφαρμόζεται σε καταπονημένα φυτά.
- Να αποφεύγεται η εφαρμογή του προϊόντος όταν αναμένονται έντονες βροχές γιατί το πιτσίλισμα του ζιζανιοκτόνου στα νεαρά φυτά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φυτοτοξικότητας. Τα συμπτώματα είναι πιο εμφανή σε κρύα εδάφη. Ωστόσο τα συμπτώματα εξαφανίζονται μετά από λίγες εβδομάδες, χωρίς να επηρεάζουν την απόδοση ή τις ποιοτικές παραμέτρους της καλλιέργειας.

