

LAMDEX 10CS

with Zeon technology

ADAMA



ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

CS - Συμπυκνωμένο αιώρημα μικροκαψουλών

Ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.



Εγγυημένη Σύνθεση

- Lambda-cyhalothrin 10% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 89,5% β/β



Πεδίο Εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Α.Α.Δ.Α.: 14905/05.02.2025

Κάτοχος της Άδειας: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λεωφ. Ανθούσας, 15349 Ανθούσα Αττικής, Τηλ.: 2106666612-13
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 151 25 Μαρούσι

Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



UFI 41WR-UD49-VVDJ-M916



02/A/2025-11

1

ΛΙΤΡΟ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει lambda-cyhalothrin και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση μέσω της στοματικής και δερματικής οδού.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Υποδείξεις καλλιέργειας: ●Κατά την εφαρμογή με τράκτερ φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. ●Κατά την χρήση φυ-
σαστικού μηχανήματος με εκτόξευση υποβοηθούμενη από ρεύμα αέρος (τουρμπίνη), πρέπει να χρησιμοποιείται τράκτερ με κλειστή καμπίνα. ●Όταν η καλλιέργεια γεινιάζει με κατοικημέ-
νη περιοχή κατά την εφαρμογή με τράκτερ με φερόμενα ή ουρόμενα μέσα να χρησιμοποιείτε
ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 50% για την προστασία των κατοίκων. ●Κατά την χρήση με
ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) σε χαμηλό ύψους καλλιέργειες στον αγρό, φοράτε ολόσωμη
φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.
●Κατά την χρήση με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) σε ψηλές καλλιέργειες φοράτε γάντια,
μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή (τύπου FP2), αδιάβροχο φόρμα εργασίας και γάν-
τια, μέσα ατομικής προστασίας για το κεφάλι/μάτια και πρόσμο κατά την εφαρμογή. ●Δεν επι-
τρέπεται η χρήση επιπνωίου ψεκαστήρα στον αγρό. ●Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέρ-
γεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμιο, μακρύ παντελόνι και γάντια. ●Κατά
τον δοκιμαστικό ψεκασμό στην καλλιέργεια της ελιάς με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός):
►φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή
(τύπου FP2) κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια
κατά την εφαρμογή. ►Όταν η καλλιέργεια γεινιάζει με κατοικημένη περιοχή να χρη-
σιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 50% για την προστασία των κατοίκων. ●Δεν επι-
τρέπεται η χρήση επιπνωίου ψεκαστήρα.

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: ●Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες χαμηλής
ανάπτυξης με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) φοράτε αδιάβροχο παντελόνι, οσάκι από βαμ-
βίνα/πολυέστερα και γάντια. ●Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες υψηλής
ανάπτυξης με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) φοράτε αδιάβροχο ολόσωμο προστατευτικό εν-
δυσμια και γάντια. ●Σε περίπτωση επανεισόδου στο θερμοκήπιο μετά τον ψεκασμό φοράτε
μακρυμάνικο πουκάμιο, μακρύ παντελόνι και γάντια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του
ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προληπτικώς με
τρίπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύ-
κλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνει-
ες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς: ●Σε μηλιά, αγλαδία, ροδακινιά, καστανιά,
αμυγδαλιά, φυστικιά, καρδιά, κερασιά, δαμασκηνιά, λεμονιά, γκρέιφρουτ: Να αφήσετε μισό



ΠΡΟΣΟΧΗ

αφέακτη ζώνη προστασίας 25 μέτρων, εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι ζώνη φυτικής ανά-
σχεσης και με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά
90%. ●Στο αμπέλι και το μύρτιλλο – πρώιμη εφαρμογή: Να αφήσετε μίαν αφέακτη ζώνη προ-
στασίας 30 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα ζώνη φυτικής ανασχεσης ή μία ζώνη φυτικής ανά-
σχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υ-
γρού κατά 50%. ●Στο αμπέλι και το μύρτιλλο – όψιμη εφαρμογή: Να αφήσετε μία ζώνη φυτικής
ανασχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού
υγρού κατά 90%. ●Στην ελιά: Να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανασχεσης 20 μέτρων με ταύτο-
χρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%. ●Στα βαμβάκι:
Να αφήσετε μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων
μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75%. ●Σε λοιπές υπαίθριες καλλιέργειες (πατά-
τα, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, φακή, λάχανο, μπρόκολο, κολοκύθα, μπά-
να, κουνουπίδι): Να αφήσετε μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων 20 μέ-
τρα ζώνη φυτικής ανασχεσης ή να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανασχεσης 20 μέτρων με ταύτο-
χρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%. ●Σε καλλι-
έργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι) που γεινιάζουν με υ-
δάτινες επιφάνειες: Να αφήσετε μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας 40 μέτρων, εκ των οποίων 20
μέτρα ζώνη φυτικής ανασχεσης ή να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανασχεσης 20 μέτρων με ταύτο-
χρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς κατά 50%.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους: ●Σε δενδροειδείς καλλιέργειες: Να αφήσετε
μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης δια-
σποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%. ●Στο αμπέλι και το μύρτιλλο: Να αφήσετε μίαν αφέ-
ακτη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή να αφήσετε μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας 5 μέτρων με
ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 60% ή χρη-
σιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 90%. ●Στα βαμβάκι: Να αφήσετε μίαν αφέα-
κτη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκασ-
τικού υγρού κατά 70%. ●Σε λοιπές καλλιέργειες υπαίθρου (πατάτα, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα,
αγγούρι, κολοκυθάκι, φακή, λάχανο, μπρόκολο, κολοκύθα, μπάνα, κουνουπίδι): Να αφήσετε
μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς
του ψεκαστικού υγρού κατά 30%. ●Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα,
αγγούρι, κολοκύθα) με ύψος <50 εκ.: Να αφήσετε μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας 10 μέτρων
ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού 50%. ●Σε τις
καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκύθα) με ύψος >50 εκ.:
Να αφήσετε μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείω-
σης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ζιζάνια σε ανθοφωρία (α-
πομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους). Για να προστατέψετε τις
μέλισσες και άλλα έντομα επικονιαστές μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την ανθοφορία της
καλλιέργειας ή κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Πολύ τοξικό σε βομβινίδια και ω-
φέλεια έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται σε θερμοκήπια.

**Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε
τις οδηγίες χρήσης:**

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής,**
μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευ-
κολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** πλυθείτε με άφθονο νερό που οσπώνι. Βγάλτε
τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **Εάν παρατηρηθεί ερεθι-
σμός του δέρματος ή εμφανιστούν εξανθήματα,** συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περι-
πτωση κατάποσης,** καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΕΜΕΤΟ. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε προε-
κτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. **Συμπτώματα:** Η εισ-
πνοή μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα και πνευμονίτιδα. Η επαφή με το δέρμα μπορεί
να προκαλέσει συμπτώματα παρααισθησίας (φαγούρα, τσούξιμο, κάψιμο ή μούδιασμα του εκτε-
θειμένου δέρματος) τα οποία είναι παροδικά και διαρκούν έως 24 ώρες. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει
γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Μην προκαλέσετε εμετό: περιέχει
αποσταγμένα πετρελαιοί και/ή αρωματικούς διαλύτες.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777.

ανοίξτε εδώ

ΛΑΜΝΤΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΕΩΝ: Το σκεύασμα, είναι ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση μυζητικών και μαρσηλικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα διά επαφής και διά στομάχου επιδρώντας στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία συνεχή νευρομική μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός φυλλώματος διαφόρων καλλιεργειών και δολωματικών ψεκασμός στην ελιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζεται το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη. Αραιώνεται η απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνεται το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνεται με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύεται συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:

Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ: Φυλλορύκτες. *Χρήσεις ήσσονος σημασίας:* Σποντόπτερα*, Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89). **ΑΧΑΛΑΔΙΑ:** Φυλλορύκτες, Ψύλλα. *Χρήσεις ήσσονος σημασίας:* Σποντόπτερα*, Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-87). **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ:** Φυλλοδέστες. *Χρήσεις ήσσονος σημασίας:* Σποντόπτερα*, Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89). **ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια):** Ευδεμίδα, Κοχυλίδα. *Χρήσεις ήσσονος σημασίας:* Σποντόπτερα*, Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: **10-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των βλαστοφόρων οφθαλμών έως τη συγκομιδή (BBCH 09-89). **ΕΛΙΑ:** Πυρηνοτρήτης. *Χρήσεις ήσσονος σημασίας:* Σποντόπτερα*, Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών και την εκκόλαψη των ωών από το στάδιο όπου τα εξωτερικά μικρά φύλλα ανοίγουν και διασταυρώνονται κοντά στην κορυφή τους έως όσον ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους (ξεκινάει η σκλήρυνση του πυρήνα) (BBCH 09-75). **Δάκος:** Δόση: **125 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Δολωματικοί ψεκασμοί από το έδαφος σε συνδυασμό με ENTOMOMELA 50SL ή ENTOMOMELA 75SL ή DACUS BAIT 100 στις εγκεκριμένες δόσεις, σύμφωνα με τις συλλήψεις ακαμίας στις αποκατανήσεις. Να εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια κάθε 2ου δέντρου του ελαιώνα. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ)-ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ)-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ):** Αφίδες, Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος. *Χρήσεις ήσσονος σημασίας:* Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: α) Υ: **10-20 κ. εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** β) Θ: **6-6-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κυτταρίδων έως την συγκομιδή (BBCH 09-89). **ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ)-ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Υ+Θ):** Αφίδες, Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα. *Χρήσεις ήσσονος σημασίας:* Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: α) Υ: **10-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** β) Θ: **6-6-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κυτταρίδων έως την συγκομιδή (BBCH 09-89). **ΑΧΑΛΑΝΟ-ΜΠΡΟΚΟΛΙΟ:** Πιερίδα, Μαμόετρα. *Χρήση ήσσονος σημασίας:* Σποντόπτερα*. Δόση: **7,5-10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κυτταρίδων έως την συγκομιδή (BBCH 09-49). **ΦΑΚΗ:** Βρούχος. *Χρήση ήσσονος σημασίας:* Σποντόπτερα*. Δόση: **10 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κυτταρίδων έως την συγκομιδή (BBCH 09-89). **ΠΑΤΑΤΑ:** Δορυφόρος. *Χρήση ήσσονος σημασίας:* Σποντόπτερα*. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κυτταρίδων έως την συγκομιδή (BBCH 09-49). **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Δόση: **15 κ.εκ./στρ.** Πράσινο ακουλήκι, Ρόδινο ακουλήκι. Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης έως την έναρξη ανώριμησης των καρυδίων (BBCH 60-81). Αφίδες. *Χρήση ήσσονος σημασίας:* Σποντόπτερα*. Ψεκασμός φυλλώματος όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο πρόβληματος από το στάδιο της εμφάνισης του 1ου πρώτου αλθινού φύλλου έως την έναρξη ανοίγματος των καρυδίων (BBCH 11-81). **ΚΑΣΤΑΝΙΑ*** (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Καρπόκαψα, Σποντόπτερα. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση

των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89). **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ***-ΦΥΣΤΙΚΙΑ***-ΚΑΡΥΔΙΑ*** (Χρήσεις ήσσονος σημασίας):** Καρπόκαψα, Σποντόπτερα, Ευρύτομο, Ψύλλα της φωτιτιάς, Καφέ Βρωμίσσα, Δροσόφιλα, Ανατολική μύγα των καρπών, Μύγα των ροδάκινων. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89). **ΚΕΡΑΣΙΑ*** (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Αφίδες, Ραγολέτιδα, Μύγα της Μεσογείου, Ορίπας*, Ανάροια*, Καρπόκαψα*, Λιριόμια*, Φυλλορύκτης*, Σποντόπτερα*, Καφέ Βρωμίσσα*, Δροσόφιλα*, Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89). **ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ** (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Αφίδες, Μύγα της Μεσογείου, Ραγολέτιδα*, Ορίπας*, Ανάροια*, Καρπόκαψα*, Λιριόμια*, Φυλλορύκτης*, Σποντόπτερα*, Καφέ Βρωμίσσα*, Δροσόφιλα*, Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89). **ΛΕΜΟΝΙΑ***-ΓΚΡΕΪΦΦΟΥΤ*** (Χρήσεις ήσσονος σημασίας):** Κοκκοειδή, Πράσινη Βρωμίσσα, Προνύμφες Λεπιδόπτερων, Μετκάφα, Αφίδες, Μύγα της Μεσογείου, Καφέ Βρωμίσσα, Δροσόφιλα, Φυλλορύκτης, Σποντόπτερα, Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο εμφάνισης των πράσινων κορυφών των φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 09-89). **ΜΥΡΤΙΛΛΟ*** (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Ευδεμίδα, Δροσόφιλα, Κοχυλίδα*, Σποντόπτερα*, Καφέ Βρωμίσσα*, Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κυτταρίδων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 09-89). **ΚΟΚΚΟΥΘΑ (Υ)* (**Χρήση ήσσονος σημασίας):** Αφίδες, Προνύμφες Λεπιδόπτερων, Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα*, Δορυφόρος της πατάτας*, Αλευρώδης*, Ανατολική μύγα των καρπών*, Μύγα των ροδάκινων*. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κυτταρίδων έως τη συγκομιδή (BBCH 09-89). **ΜΠΑΜΙΑ (Υ)** (**Χρήση ήσσονος σημασίας):** Αφίδες, Πράσινο ακουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρος της πατάτας, Ανατολική μύγα των καρπών, Μύγα των ροδάκινων. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κυτταρίδων έως τη συγκομιδή (BBCH 09-89). **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΑ*** (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Πιερίδα, Μαμόετρα, Υπονομευτής των σταυρανθών*, Σποντόπτερα*, Κοφτοσκουλήκι*, Μυζητικά ήμιπτερα, Ετερόπτερα*, Αλευρώδης*, Αφίδες*, Δορυφόρος της πατάτας*, Ορίπας*. Δόση: **10 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κυτταρίδων έως και τη συγκομιδή (BBCH 09-89).

Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Ελιά/Δάκος (2 εφαρμογές / 14 ημέρες).
Μηλιά-Αχλαδιά, Ροδάκινια, Αμπέλι, Ελιά/Πυρηνοτρήτης, Σποντόπτερα, Ανατολική μύγα των καρπών, Μύγα των ροδάκινων Τομάτα (Υ+Θ), Πιπέρι (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκύθι (Υ+Θ), Λάχανο, Μπρόκολο, Φακή, Πατάτα, Βαμβάκι, Καστανιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Λεμονιά, Γκρέιφφουτ, Μύρτιλλο, Κολοκύθα (Υ), Μπάμια (Υ), Κουνουπίδι: Μία (1) εφαρμογή.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Μηλιά-Αχλαδιά-Ροδάκινια (100-150), Αμπέλι-Μύρτιλλο (40-100), Ελιά/Πυρηνοτρήτης, Σποντόπτερα, Ανατολική μύγα των καρπών, Μύγα των ροδάκινων (50-200), Ελιά/ Δάκος (3 / (Εφαρμογή 300 κ.εκ. ψεκαστικού υγρού/ δέντρο. Μείνιστος αριθμός ψεκασμένων δέντρων ανά στρέμμα: 10). Τομάτα (Υ)-Πιπέρι (Υ)-Μελιτζάνα (Υ)-Αγγούρι (Υ)-Κολοκύθι (Υ)-Λάχανο-Μπρόκολο-Κερασιά-Δαμασκηνιά-Κολοκύθα (Υ)-Μπάμια (Υ)-Κουνουπίδι (50-100), Τομάτα (Θ)-Πιπέρι (Θ)-Μελιτζάνα (Θ)-Αγγούρι (Θ)-Κολοκύθι (Θ) (50-150), Φακή (100), Πατάτα-Βαμβάκι (50-80), Καστανιά-Αμυγδαλιά-Φιστικιά-Καρυδιά-Λεμονιά-Γκρέιφφουτ (100-200).

Παρατηρήσεις:

1) Να ρυθμίζεται τη δόση στο εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβάνει την μέγιστη δόση σκευάσματος ανά στρέμμα. 2) Η χρήση στη ροδάκινια περιλαμβάνει και τη νεκτριανιά. *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητά της κατά: ●της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδάκινων, νεκτριανιάς, αμπελιού, ελιάς, τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, αγγουριού και κολοκυθίου, ●του Spodoptera frugiperda στους καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδάκινων, νεκτριανιάς, αμπελιού, ελιάς,

λάχανου, μπρόκολου, φακής, πατάτας και βαμβάκιου, ●του θρίπα, της ανάροιας, της καρπόκαψας, της λιριόμιας, του φυλλορύκτη, της σποντόπτερας, της καφέ βρωμίσσας, της δροσόφιας, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια της κερασιάς, ●της ραγολέτιδας, του θρίπα, της ανάροιας, της καρπόκαψας, της λιριόμιας, του φυλλορύκτη, της σποντόπτερας, της καφέ βρωμίσσας, της δροσόφιας, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια της δαμασκηνιάς, ●της κοχυλίδας, της σποντόπτερας, της καφέ βρωμίσσας, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια του μύρτιλλου, ●του πράσινου ακουλήκιου, της σποντόπτερας, του δορυφόρου της πατάτας, του αλευρώδη, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια της κολοκύθας, ●του υπονομευτή των σταυρανθών, της σποντόπτερας, των κοφτοσκουλήκων, των ετερόπτερων, του αλευρώδη, των αφίδων, του δορυφόρου της πατάτας και του θρίπα στην καλλιέργεια του κουνουπιού. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητά από τη χρήση του σκευάσματος. **Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κερασιάς, δαμασκηνιάς, μύρτιλλου, κολοκύθας και κουνουπιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. ***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητά και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καστανιάς, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, λεμονιάς, γκρέιφφουτ και υπαίτιας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητά ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΧΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

●Απογορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος με επινώπιους ψεκασμούς, σε αγρό και θερμοκήπιο. ●Όλη η εφαρμογή σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτόμαζας αφίδων στην περιοχή εφαρμογής. ●Εφαρμογή ανθεκτικότητας Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία lambda-cyhalothrin η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται: ●Η εναλλαγή με εντομοκτόμα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. ●Για τον έλεγχο εχθρών υψηλού κινδύνου, να εφαρμόζονται το σκεύασμα σε προγράμματα ελέγχου που περιλαμβάνουν χημικές και βιολογικές μεθόδους, ωφέλιμα έντομα, καλλιεργητικές πρακτικές, εντομοελεγκτικά κ.α. ●Χρήση καλλιεργητικών πρακτικών ή και πρακτικών βιολογικού ελέγχου. ●Χρήση ανθεκτικών ή πρώιμων ποικιλιών ώστε να περιοριστεί το πληθυσμιακό των εντόμων. ●Να ρυθμίζεται τον εξοπλισμό εφαρμογής και να χρησιμοποιείστε τις προτεινόμενες πιέσεις και δόσεις ψεκαστικού διαλύματος. ●Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνεται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΞΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη ζώνη πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια. Η επανείσοδος στον αμπελιώνα και την καλλιέργεια του μύρτιλλου επιτρέπεται μόνο αφού περάσουν 4 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος φρονώντας γάντια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Βαμβάκι, Φακή, Αμπέλι επιτραπέζια, Αμπέλι οινοποιήσιμα, Μύρτιλλο: 14 ημέρες.
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδάκινια, Νεκτριανιά, Πατάτα, Ελιά επιτραπέζια , Ελιά ελαιοποιήσιμη, Λάχανο, Μπρόκολο, Καστανιά, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Λεμονιά, Γκρέιφφουτ, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Κουνουπίδι: 7 ημέρες.
Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπέρι (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκύθι (Υ+Θ), Μπάμια (Υ), Κολοκύθα (Υ): 3 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΟΧΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό 2 (δύο) χρόνια στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασία μικρότερη των 40°C.