

ΤΖΙΜΠΑΛ:

Το γιββερέλλικο οξύ είναι μια φυσική ορμόνη των φυτών, που δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης, διεγερώντας τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων με αποτέλεσμα να οδηγεί σε αυξημένη καρπόδεση και καλλιεργητικές αποδόσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι του σημείου απορροής ή στοχευμένοι ψεκασιμοί.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαραίτητη ποσότητα αυτού του προϊόντος σε ήλιο νερό, σε ξεκαθιστό δοχείο και προσθέστε το διάλυμα στα δεξαμενή. Ξεπλύνετε το δοχείο στη δεξαμενή. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανόδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε το εξοπλισμό ψεκασιμού λεπτομερώς. Στραγγίστε το σύστημα στο σύνολό του και ξεπλύνετε τη δεξαμενή ψεκασιμού, τη βέργα και τα ακροφύσια δύο έως τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ (γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού)-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΧΛΙΑΔΙΑ: Για αύξηση της καρπόδεσης και διεύγερση της φυσιολογικής ανάπτυξης του καρπού. Δόση: **12 (1,2 δισκία)** σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Έναρση στο 20-30% της άνθησης έως τέλους άνθησης (BVCH 62-69). **ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια σταφύλια):** α) Για αύξηση του μήκους των τρυπιδίων. Δόση: **30-100 (3-10 δισκία)** σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν την άνθηση σε βλαστούς μήκους 4-8 εκ. (BVCH 53-57). β) Αρραμία. Δόση: **30-50 (3-5 δισκία)** σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στο 30-40% της άνθησης (BVCH 62-64). γ) Για αύξηση του μεγέθους της ράγας και μεγαλύτερη ομοιογένεια της παραγωγής. Δόση: **30-50 (3-5 δισκία)** σε 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Από την πλήρη άνθηση μέχρι διαμέτρου ράγας 3-4 χιλ. (BVCH 71-79). δ) Για αύξηση της καρπόδεσης και πρωίμωτη της συγκομιδής. Δόση: **30 (3 δισκία)** σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην πλήρη άνθηση (70% πτώση των πετάλων, BVCH 65) και 5-12 ημέρες αργότερα. **ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα σταφύλια):** Για αύξηση του μήκους των τρυπιδίων. Δόση: **5 (0,5 δισκία)** σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν την άνθηση σε βλαστούς μήκους 10-15 εκ. (BVCH 53-57). **ΑΜΠΕΛΙ (για παραγωγή σταφίδας):** α) Για αύξηση του μεγέθους της ράγας. Δόση: **10 (1 δισκίο)** σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Μέγεθος ράγας 3 χιλ. (BVCH 79). β) Για μείωση της πτώσης ανθέων και καρπών. Δόση: **5 (0,5 δισκία)** σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην πλήρη άνθηση (BVCH 65). **ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ:** Για βελτίωση της ποιότητας του φρούτου. Δόση: **20 (2 δισκία)** σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν τον χρωματισμό των καρπών (BVCH 79-81). **ΜΑΝΤΙΝΑΡΙΑ:** Για διεύγερση της καρπόδεσης. Δόση: **10 (1 δισκίο)** σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Από την πλήρη άνθηση έως στα 2/3 της πτώσης των πετάλων (BVCH 65-73). **ΛΕΜΟΝΙΑ:** Για κομβιστήριση της συγκομιδής, μείωση του αριθμού των μικρών καρπών και αύξηση του μεγέθους των καρπών. Δόση: **20 (2 δισκία)** σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν τον χρωματισμό των καρπών (BVCH 76-79). **ΑΓΚΙΝΑΡΙΑ:** Για πρωίμωτη της παραγωγής και καλύτερη ποιότητα. Δόση: **20-50 (2-5 δισκία)** σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασιμό πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Ο πρώτος ψεκασιμός κατά τον σχηματισμό του κεντρικού άνθους (BVCH 11-19).

Μείγματος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο-Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Αχλιάδια-Πορτοκαλιά-Λεμόνια-Αμπέλι/οινοποιήσιμα σταφύλια (1), Αμπέλι/επιτραπέζια σταφύλια. Για αύξηση του μήκους των τρυπιδίων & για αρραμία (1*), Αμπέλι/επιτρα-

πέζια σταφύλια: Για αύξηση του μεγέθους της ράγας και μεγαλύτερη ομοιογένεια της παραγωγής (2 / 8 ημέρες*), Αμπέλι/επιτραπέζια σταφύλια: Για αύξηση της καρπόδεσης και πρωίμωτη της συγκομιδής (2 / 5 ημέρες*), Αμπέλι/για παραγωγή σταφίδας: Για αύξηση του μεγέθους της ράγας (1*), Αμπέλι/για παραγωγή σταφίδας: Για μείωση της πτώσης ανθέων και καρπών (1*), Μαντινάρι (2 / 7 ημέρες), Αγκινάρα (3 / 15 ημέρες*).

Παρατηρήσεις:

*Ασπερμε ποικιλίες (Σουλιτανία, Thompson,...). Σουλιτανία θα πρέπει να δοθεί προσοχή για καλή κάλυψη των σταφυλιών. Ψεκασιμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. Ένα προοικητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασιμού. Σουλιτανία. Ψεκασιμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. Ένα προοικητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασιμού. Μούρα Κορινθιάκη. Ψεκασιμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. Ένα προοικητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασιμού. *Η αζωτούχος λίπανση και η άρδευση θα πρέπει να αυξηθεί. Ψεκασιμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Όλες οι καλλιεργίες: Δεν απαιτείται.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΣΗΣ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιρράσεις του φύλλων.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργίες και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΕΚΕ ΑΠΟΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΙΝΙΑ ΑΗΣΗΣ:

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε ήπιο, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Επίσης, παραμένει σταθερό μετά από οκτώ (8) εβδομάδες αποθήκευσης στους 40°C.

Gibbal[®] ST

Gibberellic acid (Γιββερέλλικό Οξύ) 10%
Υδατοδιαλυτά Δισκία (ST)

Φυσική ορμόνη των φυτών που δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης για αυξημένη καρπόδεση και καλλιεργητικές αποδόσεις.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Gibberellic acid10% β/β
Βοηθητικές ουσίες89,25% β/β

A.A. Δ.Α.: 8277/24.04.2018

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

100 ΓΡΑΜΜ. (10 x 10 ΓΡ.)



ADAMA

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμός Πρωτόκολλο	ΒΑΘΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

Κότοχος της Άδειας:
L.Gobbi srl
16121 Genova, Italy

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΦΥΤΟΓΡΑΚ ΑΒΕΕ
Περίβλεπ 6 και Χρυσόποδο, 145 64, Κηφισιά
Αττικής Τηλ: 2106252600

Διανομέας:

ΑΔΑΜΑ ΕΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρά οφθαλμικά ερεθίσματα.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΙΔΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε, ή καννίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Διάθεση του περιεχομένου/περιεχίτη σύμψυκτο με την εθνική νομοθεσία.
Οι εργασίες θα πρέπει να απορριφθούν μακριά από τα παιδιά και μακρυμάχιχο ποικύματα εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασιμό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν περιεχόμενα για την διασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων, εναποθέτουμε τα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα συσκευαστικά του.
Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά.
Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερόν από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν σκόκι επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε** Επισκευθείτε γιατρό. **Εισπνοή:** Σε περίπτωση εισπνοής των αναθυμώσεων, μετακινήστε το άτομο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε** τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το φάρμακο και ξεπλύνετε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός παραμένει. **Κατάποση:** Ξεπλύνετε το στόμα, πίνετε νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210793777**