

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΟΜΑΔΑ **3A** ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας, μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική κάλυψη 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις εξής καλλιέργειες: καπνός, σόγια, ελαιοκράμβη, καρότο, φυλλώδη και ριζωματοδή και καρποφόρα λαχανικά και 5 μέτρων για το βαμβάκι.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση έκθεσης ή αδιαθεσίας, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής, εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΛΕΜΠΡΟΝ:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους. Παρεμποδίζει τη λειτουργία των δι-αύλων ιόντων νατρίου (sodium channel modulator) προκαλώντας παρατεταμένο άνοιγμα αυτών, που οδηγεί σε υπερεαισθησία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά το θάνατο του εντόμου. Δρα δι' επαφής μέσω της απορρόφησής του από την επιδερμίδα, αλλά έχει και κάποια δράση διά του στομάχου. Δεν είναι διασυστηματικό αλλά έχει δράση με ατμούς. Έχει γρήγορη αρχική δράση (knockdown effect) και αρκετή υπολειμματική διάρκεια. Επιπλέον, λόγω των ατμών που δημιουργούνται στην εδαφική ζώνη, τα έντομα απομακρύνονται και δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραμμή εφαρμογής.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμόζεται με διανομέα κοκκωδών που προσαρμόζεται στην σπартική-φυτευτική μηχανή και ακολουθεί ενσωμάτωση (σε βάθος 3-5 εκ.). Μετά την εφαρμογή του πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κοκκών που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα, Ατομάρια, Άλτης, Σύμφυλα, Τιπουλίδα. Δόση: **1200-1500 γρ./στρέμμα.** Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση. **ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΣΟΡΓΟ:** Σιδηροσκούληκα, Αγροτίδα ή караφατμέ, Διαβρώτικα, Υλέμυια, Σύμφυλα, Τιπουλίδα. Δόση: **1200-1500 γρ./στρέμμα.** Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση. **ΗΛΙΑΝΘΟΣ-ΣΟΓΙΑ:** Σιδηροσκούληκα, Αγροτίδα ή караφατμέ, Υλέμυια, Άλτης. Δόση: **1200-1500 γρ./στρέμμα.** Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Σιδηροσκούληκα, Αγροτίδα ή караφατμέ, Υλέμυια, Άλτης. Δόση: **1000-1500 γρ./στρέμμα.** Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ) (Τομάτα-Μελιτζάνα-Πεπόνι-Καρπούζι-Λάχανο-Κουνουπίδι-Σέλινο-Μάραθος-Άλλα Σαλατικά υπαίθρου [Λυκοτίβολο-/Γαιοκάρδαμο-Κάρδαμο-Ρόκα-Κόκκινο Σινάπι]-Νεαρά φύλλα και μίσχοι των καλλιεργειών [συμπεριλαμβανομένης της κράμβης] που συγκομίζονται μέχρι το στάδιο του δουπραγματικού φύλλου-Γογγύλι-Γουλί-Φασόλι με λοβό-Μπιζέλι με λοβό):** Σιδηροσκούληκα, Αγροτίδα ή караφατμέ, Υλέμυια, Άλτης, Μηλολόνη, Τιπουλίδα, Σαρανταποδαρούσα, Καροτόμυγα. Δόση: **1500-2000 γρ./στρέμμα.** Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση. **ΚΑΠΝΟΣ:** Σιδηροσκούληκα, Αγροτίδα ή Караφατμέ, Τιπουλίδα. Δόση: **1200-1500 γρ./ στρέμμα.** Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση. **ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ:** Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Κευθόρρυγχος*, Άλτης*, Σκαθάρι της γύρης*. Δόση: **1200-1500 γρ./ στρέμμα.** Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Μία (1) εφαρμογή.



LEBRON 0,5GR



ADAMA



ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

GR – Κοκκώδες

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους.



Εγγυημένη Σύνθεση

● Tefluthrin 0,5% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,5% β/β



Πεδίο Εφαρμογής

Ζαχαρότευτλα, Καλαμπόκι, Γλυκό Καλαμπόκι, Σόργο, Ηλίανθος, Σόγια, Βαμβάκι, Καρότο (Υ), Λαχανικά (Υ), Καπνός, Ελαιοκράμβη.



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.A.: 14694/10.04.2019

Κάτοχος της Άδειας-

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι,

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



T-2202/T10



1 ΚΙΛΟ

Παρατηρήσεις:

Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού της περιοχής.

*Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Το σκεύασμα περιέχει tefluthrin, που ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή σκευασμάτων που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα. Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προνυμφών του εντόμου Diabrotica virgifera στον αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψιοπορίας ως ακολούθως: α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιεργείται ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβόσιτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά ή β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιεργείται ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβόσιτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα φυτά όπως της παραγράφου 2α). Στο πρόγραμμα αμειψιοπορίας να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην αμειψιοπορία αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωθετεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμαία).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Σε περίπτωση επανεισόδου, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Όλες οι καλλιέργειες του φάσματος δράσης: **Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του προϊόντος οδηγίες χρήσης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.