

Sari™ 40 SC

Pyrimethanil (Πυριμεθανίλ)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Pyrimethanil 40% β/ο (ομάδα ανιλνοπυριμιδίνες)

Βοηθητικές ουσίες 62.4% β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με διελασματική κίνηση για την καταπολέμηση του βοτρώτη του αμπελιού και των άλλων κηπευτικών καλλιεργειών, καθώς και του φουζικλαδίου της μηλιάς και της αχλαδιάς.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Άδειας: 60924/22-1-2020

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

™ Σήμα κατατεθέν BASF

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάμιξης, της φόρτωσης και της εφαρμογής να φοράτε κατάλληλα γάντια. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση προβλήματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα ή/και το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφεράτε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό, αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 – 77 93 777

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

[Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για το αμπέλι και 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για μηλιά, αχλαδιά, αμυγδαλιά, φιστικιά και καλλωπιστικά φυτά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά τη φιάλη που περιέχει το σκεύασμα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Όλος ο εξοπλισμός του ψεκασμού, καθώς και τα μολυσμένα ρούχα, θα πρέπει να πλένονται με νερό ή κάποιο αραιό απορρυπαντικό διάλυμα και να ξεπλένονται τρεις (3) φορές. Το ζέπλυμα του ψεκαστήρα θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή του Sari™ 40 SC για να αποφευχθεί η δημιουργία τοξοειμμάτων στα τοιχώματα του βυθίου, στα φίλτρα, τα ακροφύσια και τις σωληνώσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Συσκευασίες: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται τρεις (3) φορές και το νερό του ξεπλύματος να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Το πλύσιμο υπό πίεση της άδειας συσκευασίας δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να μην ξαναχρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και την καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.

Προϊόν: Καύση σε εγκριμένη για τον σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης: 1100°C για 2 sec.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Αρ. Παρτίδας: ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής: ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: ως άνω μέρος συσκευασίας



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο επαφής με διελασματική κίνηση. Περιέχει pyrimethanil, το οποίο ανήκει στην χημική ομάδα των ανιλοτυριμιδινών, με δράση κυρίως κατά του βοτρυτή του αμπέλιου και των άλλων κηπευτικών καλλιέργειών, καθώς και του φουζικλαδίου της μηλιάς και της αχλαδιάς. Η βιολογική δράση του Sari™ 40 SC στους ευαίσθητους παθογόνους μύκητες εντοπίζεται στην παρεμπόδιση της έκκρισης υδρολυτικών ενζύμων από τους μύκητες που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία προσβολής των φυτών. Χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό δράσης, το Sari™ 40 SC είναι αποτελεσματικό κατά στελεχών μυκήτων που δεν είναι επαρκώς ευαίσθητα σε άλλα βοτρυδοκτόνα. Όσον αφορά στο φουζικλάδιο, η δράση του είναι τόσο προληπτική όσο θεραπευτική (ακόμη και 2-3 ημέρες μετά την προσβολή).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: Για **Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*, *V. pyrina*)** συνιστάται **δόση** 75-100 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την πράσινη κορυφή. Η υψηλότερη δόση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης προσβολής και από το στάδιο πριν την άνθιση ως το στάδιο που οι καρποί έχουν διάμετρο 20 χιλιοστών (καρπίδιο). Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα μυκητοκτόνα κατά του φουζικλαδίου, η δόση του Sari™ 40 SC μπορεί να μειωθεί σε 50-60 κ.εκ. ανά εκατόλιτρο. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.

ΑΜΠΕΛΙ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ): Για **Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*)** και **δευτερογενείς προσβολές από *Aspergillus* spp. και *Penicillium* spp.** συνιστάται **δόση** 200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές κατά την τυπική περίοδο καταπολέμησης του βοτρυτή, δηλαδή στο τέλος της άνθισης, πριν το κλείσιμο των σταφυλιών, κατά την ωρίμανση ή 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Εξασφαλίστε μια καλή και ομοιόμορφη κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-125 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 για το οινοποιήσιμο αμπέλι και 3 εφαρμογές για το επιτραπέζιο αμπέλι με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.

ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου): Για **Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*)** συνιστάται **δόση** 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-125 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.

ΦΡΑΟΥΛΑ (Θερμοκηπίου): Για **Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*)** συνιστάται **δόση** 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.

ΜΑΡΟΥΛΙ, ΣΚΑΡΟΛΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Για **Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*)** συνιστάται **δόση** 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν κατά την κύρια βλαστική ανάπτυξη. Καλύψτε με το ψεκαστικό υγρό την περιοχή του λαιμού και τα εξωτερικά φύλλα που ακουμπούν στο έδαφος. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερμοκηπίου): Για **Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*)** συνιστάται **δόση** 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Θερμοκηπίου): Για **Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*)** συνιστάται **δόση** 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.

ΚΑΡΟΤΟ (Υπαίθρου): Για **Αλτερναρίωση (*Alternaria dauci*)** και **Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*)** συνιστάται **δόση** 200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 4 φύλλων. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Υπαίθρου): Για **Βοτρυτή (*Botrytis* spp.)** συνιστάται **δόση** 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 3-6 φύλλων. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΦΑΣΟΛΑΚΙ (Θερμοκηπίου): Για **Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*)** συνιστάται **δόση** 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.

ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Για **Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*)** συνιστάται **δόση** 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (χρήση ήσσονος σημασίας*): Για **Φαϊά σήψη (*Monilinia laxa*, *M. fructicola*)** συνιστάται δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την άνθιση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ (χρήση ήσσονος σημασίας*): Για **Καμαροσπόριο (*Botryosphaeria dothidea*)** συνιστάται δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την άνθιση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες του σκευάσματος που αφορούν την αποτελεσματικότητά ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται σε προστατευμένη καλλιέργεια (θερμοκήπιο) και με σχετική υγρασία άνω του 80%, απαιτείται αερισμός του χώρου για να αποφευχθεί πιθανή εκδήλωση συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία pyrimethanil, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα D1 κατά FRAC. Για την ορθή στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας, συνιστάται ο περιορισμός του μέγιστου αριθμού εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο με το σκεύασμα σε αυτούς που αναφέρονται στον πίνακα του φύσματος δράσης και η χρήση του σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού μηχανισμού δράσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά: 56 ημέρες. Αμυγδαλιά, Φιστικιά: 30 ημέρες. Αμπέλι: 21 ημέρες. Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι: 3 ημέρες. Μαρούλι, Σκαρόλα, Καρότο, Κρεμμύδι, Φασολάκι: 14 ημέρες. Κυκλάμινο: δεν εφαρμόζεται.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης ή σκευάσματα που περιέχουν αλουμίνιο (π.χ. μυκητοκτόνα με βάση το fosetyl-Al), ασβέστιο ή μαγνήσιο. Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα σκευάσματα, συστήνεται η χρήση αναθευτήρα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην περιοχή όπου έγινε η εφαρμογή πριν περάσουν 24 ώρες.

Sari™ 40 SC

Pyrimethanil (Πυριμεθανίλ)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Pyrimethanil 40% β/ο (ομάδα ανιλνοπυριμιδίνες)

Βοηθητικές ουσίες 62.4% β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με διελασματική κίνηση για την καταπολέμηση του βοτρώτη του αμπελιού και των άλλων κηπευτικών καλλιεργειών, καθώς και του φουζικλαδίου της μηλιάς και της αχλαδιάς.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.


Αρ. Άδειας: 60924/22-1-2020

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

™ Σήμα κατατεθέν BASF



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάμιξης, της φόρτωσης και της εφαρμογής να φοράτε κατάλληλα γάντια. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση προβλήματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα ή/και το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφεράτε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό, αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 – 77 93 777

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

[Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για το αμπέλι και 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για μηλιά, αχλαδιά, αμυγδαλιά, φιστικιά και καλλωπιστικά φυτά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά τη φιάλη που περιέχει το σκεύασμα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Όλος ο εξοπλισμός του ψεκασμού, καθώς και τα μολυσμένα ρούχα, θα πρέπει να πλένονται με νερό ή κάποιο αραίο απορρυπαντικό διάλυμα και να ξεπλένονται τρεις (3) φορές. Το ζέπλυμα του ψεκαστήρα θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή του Sari™ 40 SC για να αποφευχθεί η δημιουργία τοξοειμμάτων στα τοιχώματα του βυθίου, στα φίλτρα, τα ακροφύσια και τις σωληνώσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Συσκευασίες: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται τρεις (3) φορές και το νερό του ξεπλύματος να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Το πλύσιμο υπό πίεση της άδειας συσκευασίας δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να μην ξαναχρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και την καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.

Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης: 1100°C για 2 sec.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Αρ. Παρτίδας: ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής: ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: ως άνω μέρος συσκευασίας

