



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό  
Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.



### ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.



Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτική ενδυμασία / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία (μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια) και κατάλληλα γάντια, εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής

λίγο μετά τον ψεκασμό.  
Αποφύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.  
Μαζέψτε την χυμένη ποσότητα.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλ-



# Systhane® 20 EW

## Myclobutanil (Μυκλομπουτανίλ) 20%

### ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

**Εναιώρημα (λάδι σε νερό)**

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.**

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Myclobutanil .....20% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες .....79,03% β/β

A.A.D.A.: 60516/07.03.2016

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμός Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 Κ.ΕΚ.**



ADAMA

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**,  
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 2106889700

Διανομέας:  
**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.



λογής για ανακάλυψη ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 14 μέτρων για τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα καλλιπωπιστικά δένδρα, την καρυδιά και τη φουντουκιά (πρώιμες εφαρμογές).

*Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

### Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν φοράτε φακούς επαφής αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο και συνεχίστε το ξέπλυμα.

**Σε περίπτωση κατάποσης,** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Δώστε λίγο νερό στο άτομο εάν μπορεί να καταπιεί. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός εάν ήβετε τέτοια οδηγία από το κέντρο δηλητηριάσεων ή τον γιατρό. Μην δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** ξεπλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777.

03/A/2022-4



**ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ  
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

## **ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

**ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ:** Ωΐδιο. Δόση: **28 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 42 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της άνθησης. **ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμο-Επιτραπέζια):** Ωΐδιο. Δόση: **28 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 30 κ.εκ./στρ. (max). Μαύρη σήψη. Δόση: **15-28 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 30 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της άνθησης. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ:** Ωΐδιο. Δόση: **30 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 36 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο της άνθησης. Μονίλια. Δόση: **25-30 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 36 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της άνθησης. **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ):** Ωΐδιο. Δόση: **37,5 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 37,5 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της βλάστησης. **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ):** Ωΐδιο. Δόση: **37,5 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 37,5 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της βλάστησης. **ΠΕΠΟΝΙΑ-ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ (Υ):** Ωΐδιο. Δόση: **37,5 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 37,5 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της βλάστησης. **ΑΓΓΟΥΡΙΑ-ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Gherkin)-ΚΟΛΟΚΥΘΑ-ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Θ):** Ωΐδιο. Δόση: **37,5 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 37,5 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της βλάστησης. **ΦΡΑΟΥΛΕΣ (Υ+Θ):** Ωΐδιο. Δόση: **30 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 30 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της άνθησης. **ΚΑΡΥΔΙΑ-ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ<sup>(2)</sup>:** Ανθράκωση. Δόση: **25-75 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 37,5 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της άνθησης. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ-ΘΑΜΝΟΙ (σε φυτώρια):** Ωΐδιο, Σκωρίαση, *Drepanopeziza punctiformis*. Δόση: **37,5 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 37,5 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της άνθησης. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΗ (Χρυσάνθεμα-Γαρύφαλλα-Τριαντάφυλλα) (Υ+Θ):** Ωΐδιο, Σκωρίαση, *Diplocarpon rosae*. Δόση: **37,5 κ.εκ./100 λίτρα νερό** ή 37,5 κ.εκ./στρ. (max). Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της άνθησης.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** Μηλιά-Αχλαδιά (100-150), Αμπέλι επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο (50-110), Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά: Ωΐδιο (50-120)/Μονίλια (50-100), Τομάτα (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Πιπεριά (Θ) (80-100), Πεπονιά (Υ)-Καρπουζιά (Υ)-Αγγουριά (Θ)-Αγγουράκι (Gherkin) (Θ)-Κολλοκύθα (Θ)-Κολλοκυ-

θάκι (Θ)-Καλλιωπιστικά δένδρα, Θάμνοι (σε φυτώρια)-Χρυσάνθεμα (Υ+Θ)-Γαρύφαλλα (Υ+Θ)-Τριαντάφυλλα (Υ+Θ) (50-100), Φράουλες (Υ+Θ) (75-100), Καρυδιά-Φουντουκιά (50-150).

### **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογής:**

Μηλιά-Αχλαδιά (μέχρι 3 / 10-14 ημέρες, εφόσον απαιτείται), Αμπέλι επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο-Καλλιωπιστικά δένδρα, Θάμνοι (σε φυτώρια)-Χρυσάνθεμα (Υ+Θ)-Γαρύφαλλα (Υ+Θ)-Τριαντάφυλλα (Υ+Θ) (μέχρι 3 / 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται), Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά: Ωΐδιο (μέχρι 2 / 10-14 ημέρες, εφόσον απαιτείται) / Μονίλια (μέχρι 2 / 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται), Τομάτα (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Πιπεριά (Θ)-Πεπονιά (Υ)-Καρπουζιά (Υ)-Αγγουριά (Θ)-Αγγουράκι (Gherkin) (Θ)-Κολλοκύθα (Θ)-Κολλοκυθάκι (Θ)-Καρυδιά-Φουντουκιά (μέχρι 3 / 8 ημέρες, εφόσον απαιτείται), Φράουλες (Υ+Θ) (μέχρι 3/ 7 ημέρες, εφόσον απαιτείται).

### **Παρατηρήσεις:**

- 1)** Στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
- 2)** Ο όγκος νερού/στρέμμα στην φουντουκιά-καρυδιά πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα ώστε η δόση του σκευάσματος να μην ξεπερνάει τα 37,5 κ.εκ. ανά στρέμμα.

## ΣΥΣΤΕΪΝ 20:

Το myclobutanil είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση της ομάδας DMI's (υποομάδα τριαζολίων).

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των μπεκ δύο έως τρεις φορές έως ότου απομακρυνθεί ο αφρός και τα ορατά υπολείμματα.

## ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Καρυδιά, Φουντουκιά: **60 ημέρες.**

Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι: **14 ημέρες.**

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά: **7 ημέρες.**

Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγουριά (Θ), Αγγουράκι (Gherkin) (Θ), Κολλοκύθα (Θ), Κολλοκυθάκι (Θ), Φράουλες (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ), Καπούζι (Υ): **3 ημέρες.**

Καλλιωπιστικά δένδρα, θάμνοι (φυτώρια), Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Τριαντάφυλλα: **Μη εφαρμόσιμο.**

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών. • Εφαρμόστε το σκεύασμα σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης. • Να μην ψεκάσετε εάν αναμένεται βροχόπτωση εντός 6 ωρών

## ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Μετά την εφαρμογή του προϊόντος σε ετήσιες καλλιέργειες, συνιστάται οι καλλιέργειες που ακολουθούν να περιοριστούν σε: καρότα, λικοτρίβολλα (lamb's lettuce), τομάτες, πιπεριές, φράουλες και πεπόνια.

## ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Να μην επιτρέπεται η είσοδος στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.

## ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για τις καλλιέργειες της μελιτζάνας, της φουντουκιάς και των καλλιωπιστικών (εκτός από τριαντάφυλλα και χρυσάνθεμα) συνιστάται η δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση για έλεγχο φυτοτοξικότητας.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

## ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Το σκεύασμα διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές θερμότητας και προστατευμένο από παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

01/1/2016-4