



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 7 - 3 - 2016
Αριθ. πρωτ: 2456/28425**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr**

**Προς: Dow Agrosiences Export SAS
(δια της Άλφα Γεωργικά Εφοδια
ΑΕΒΕ)
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 - Χαλάνδρι
E-mail: technical@alfagro.gr**

**ΘΕΜΑ: «1.Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SYSTHANE 20 EW (δ.ο. myclobutanil)
2.Ανάκληση της με αριθ. 60051 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν του (μυκητοκτόνο) SYSTHANE 20 EW (δ.ο. myclobutanil)».**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 32 και 80 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία myclobutanil.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
8. Την από 2-9-2015 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.
9. Την υπ' αριθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015), με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων"
- 10..Τη με αριθ. πρωτ. 6051/65403/30-5-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SYSTHANE 20 EW** της εταιρείας **Dow Agrosciences Export SAS**, με τα ακόλουθα στοιχεία :

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60516
7-3-2016
31-5-2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

SYSTHANE 20 EW (GF 1317)

1.2.β Μορφή:

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσών κατά ISO	MYCLOBUTANIL
β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	92.5 % (β/β) min
γ) Χημική ομάδα	Τριαζόλες
δ) Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας	<p>Dow AgroSciences LLC 9330 Zionsville rd., Indianapolis, IN, 46268, USA Contact: Andrea T. Borucki (General Patent Counsel) Email: atborucki@dow.com</p> <p>Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη Dow AgroSciences Export-SAS Γαλλίας E-mail: ftsali@dow.com</p>
ε) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<p>Myclobytanil A) KemFine OY P.O.Box 566 FIN-67701 Kokkola , Finland Contact person :Mr. Kari Hellamaki Tel: +358 (0) 46 7100 530 Email: kari.hellamaki@kemfine.com</p> <p>B) DECCAN Fine Chemicals (India) Private Limited Plot No.74A, Road No 9, Jubilee Hills, Hyderabad 500 033, India. Tel: +91-40-2360 1035 Contact : Mr G S Raju Email: gsraju@deccanchemicals.com</p>
στ) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί με την αίτηση της παρασκευάστριας εταιρείας της δραστικής ουσίας και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας 371 Rue Ludwig Van Beethoven 06560 Valbonne France E-mail: ftsali@dow.com
--

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΑΜΕ :
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 - Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν ο κάτοχος δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΑΜΕ :
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 - Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville rd.,
Indianapolis, IN, 46268, USA
Contact: Andrea T. Borucki (General Patent Counsel)
Email: atborucki@dow.com
Τηλ.: +01 (317) 337-4846

Εκπρόσωπος στην Ευρώπη
Ο κάτοχος της άδειας

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1 Dow AgroSciences ITALIA SRL

S.S. 11, Km 190,2

24050 Mozzanica, Ιταλία

Τηλ.: +39-0363320524

Mr. C. Marano (site leader)

Email: cmarano@dow.com

Diachem SPA

S.S. 11 Padana Superiore Km 185

24043 Caravaggio (BG), Ιταλία

Τηλ.: +39 0363 52483

Mr. Pietro Casti

Email: Pietro.casti@diachemagro.com

Dow AgroSciences Limited,

Manufacturing site

Estuary Road,

King's Lynn,

Norfolk, PE30 2JD,UK

Τηλ.: + (44) 1553-692900

Mr. P Berns

Email: cpberns@dow.com

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση εργοστασίου:

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας

Ταχ. Δ/νση:

32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας

Τηλ.: 2262 - 30821-3

FAX: 2262 - 30820

E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

Dow AgroSciences ITALIA SRL

S.S. 11, Km 190,2

24050 Mozzanica, Ιταλία

Τηλ.: +39-0363320524

Mr. C. Marano (site leader)

Email: cmarano@dow.com

Diachem SPA

S.S. 11 Padana Superiore Km 185

24043 Caravaggio (BG), Ιταλία

Τηλ.: +39 0363 52483

Mr. Pietro Casti

Email: Pietro.casti@diachemagro.com

Dow AgroSciences Limited,

Manufacturing site

Estuary Road,

King's Lynn,

Norfolk, PE30 2JD,UK

Τηλ.: + (44) 1553-692900

Mr. P Berns

Email: cpberns@dow.com

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **Myclobutanil** 20% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες : 79,03 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2

Συσκευασία(ες)

2.1 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή δοχείο	75, 100, 150, 250, 300, 400, 500, 800 κ.εκ. και 1 λίτρου, 2 λίτρα, 3 λίτρα & 5 λίτρα	Πλαστικό τύπου PET

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των μπεκ δύο έως τρεις φορές έως ότου απομακρυνθεί ο αφρός και τα ορατά υπολείμματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **myclobutanil** είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση της ομάδας DMI's (υποομάδα τριαζολών).

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογής (ημέρες)
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα	κ.εκ/ 100 λίτρα νερό		
Μηλιά-Αχλαδιά	Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i>	42	100-150	28	Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της άνθισης	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>) Μαύρη σήψη (<i>Guignardia bidwellii</i>)	30	50-110	28 15-28	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της άνθισης	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) Μονιλια <i>Monilia sp</i>	36	50-120 50-100	30 25-30	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο της άνθισης Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της άνθισης	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10ημέρες εφόσον απαιτείται
Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά (Θ)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	37.5	80-100	37.5	Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της βλάστησης	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται

Τομάτα Μελιτζάνα (Υ)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	37.5	80-100	37.5	Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της βλάστησης	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πεπονιά, καρπουζιά (Υ)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuligenia</i>)	37.5	50-100	37.5	Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της βλάστησης	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αγγουριά, Αγγουράκι (Gherkin) Κολοκύθα- κολοκυθάκι (Θ)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuligenia</i>)	37.5	50-100	37.5	Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της βλάστησης	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
Φράουλες (Υ, Θ)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	30	75-100	30	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της άνθισης	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καρυδιά, Φουντουκιά	Ανθράκωση (<i>Gnomonia leptostyla</i>)	37,5	50-150 ³	25-75	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της άνθισης	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καλλωπιστικά δένδρα, θάμνοι, σε φυτώρια	Ωίδιο Σκωρίαση (<i>Erysiphae spp. Puccinia spp. Sphaerotheca spp, Drepanopeziza punctiformis.</i>)	37.5	50-100	37.5	Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της άνθισης	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καλλωπιστικά άνθη (Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Τριαντάφυλλ α) (Υ, Θ)	Ωίδιο Σκωρίαση (<i>Erysiphae spp. Puccinia spp. Sphaerotheca spp., Uromyces spp Diplocarpon rosae</i>)	37.5	50-100	37.5	Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της άνθισης	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται

Παρατηρήσεις:

- 1) Στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων
- 2) Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας
- 3) Ο όγκος νερού ανά στρέμμα στην φουντουκιά-καρυδιά πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα ώστε η δόση του σκευάσματος να μην ξεπερνάει τα 37,5 κ.εκ. ανά στρέμμα
- 4) Η χρήση στην πιπεριά υπαίθρου και στην αγκινάρα θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΠΠ όταν καθοριστούν αναθεωρημένα MRLs για το myclobutanil σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή. (Για την πιπεριά υπαίθρου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και τα απαιτούμενα πειράματα αποτελεσματικότητας).

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική ή περίοδο	ΡΗΙ (Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή)
		Κ.εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα			
Πιπεριά	<i>Ωίδιο Leveillula taurica</i>	37.5	80-100	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος	3	3
Αγκινάρα	<i>Ωίδιο Leveillula taurica</i>	37.5	50-100	Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος	3	3

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών
- Εφαρμόστε το σκεύασμα σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης.

Να μην ψεκάσετε εάν αναμένεται βροχόπτωση εντός 6 ωρών

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των

καλλιιεργειών που ακολουθούν

Μετά την εφαρμογή του προϊόντος σε ετήσιες καλλιέργειες, συνιστάται οι καλλιέργειες που ακολουθούν να περιοριστούν σε: καρότα, λυκοτριβόλα (lamb's lettuce), τομάτες, πιπεριές, φράουλες και πεπόνια.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην επιτρέπεται η είσοδος στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για τις καλλιέργειες της μελιτζάνας, της φουντουκιάς και των καλλωπιστικών (εκτός από τριαντάφυλλα και χρυσάνθεμα) συνιστάται η δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση για έλεγχο φυτοτοξικότητας.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:



GHS07 GHS08 GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H361d Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUΗ066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτική ενδυμασία μέσα ατομικής προστασία για τα μάτια/πρόσωπο
P261: Αποφύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
P391: Μαζέψτε την χυμένη ποσότητα.

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

«Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία (μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια) και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό»

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 14 μέτρων για τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα καλλωπιστικά δένδρα την καρυδιά και τη φουντουκιά (πρώιμες εφαρμογές).

EUH 401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

12 Πρώτες βοήθειες -

Αντίδοτο	<p>P314 Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P305/351/338 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν φοράτε φακούς επαφής αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο & συνεχίστε το ξέπλυμα.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Δώστε λίγο νερό στο άτομο εάν μπορεί να καταπιεί. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός εάν λάβετε τέτοια οδηγία από το κέντρο δηλητηριάσεων ή τον γιατρό. Μη δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο . Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777</p>
----------	---

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις καλλιέργειες της πιπεριάς υπαίθρου και της αγκινάρας , δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά , Αμπέλι,	14 ημέρες.
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά,	7 ημέρες
Τομάτα (Υ, Θ) , Μελιτζάνα (Υ, Θ), Πιπεριά (Θ) , Αγγουριά (Θ), Κολοκύθα-Κολοκυθιά, (Θ), Φράουλες (Υ, Θ), Πεπόνι (Υ) Καρπούζι (Υ)	3 ημέρες
Καρυδιά, Φουντουκιά	60 ημέρες

Καλλωπιστικά δένδρα, θάμνοι (φυτώρια) Καλλωπιστικά άνθη (Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Τριαντάφυλλα)	Μη εφαρμόσιμο
---	---------------

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές θερμότητας και προστατευμένο από παγετό.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

1. Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει **εντός 2 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας** να υποβάλει στην ΣΕΑ και το ΜΦΙ τα παρακάτω όπως αναφέρονται στην έκθεση αξιολόγησης:

1. Δύο Ελληνικά πειράματα φυτοτοξικότητας και οργανοληπτικών ιδιοτήτων σε επιτραπέζια σταφύλια (πχ. Σουλτανίνα) απαιτούνται για να δικαιολογήσουν την απουσία αρνητικών επιπτώσεων και να καλύψουν τις Εθνικές Απαιτήσεις (National Requirements).
2. Περαιτέρω δοκιμές αποτελεσματικότητας σε Σολανώδεις καλλιέργειες αγρού, (τομάτα-μελιτζάνα) για την καταπολέμηση της *Leveillula taurica*, σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΡΡΟ.
3. Περαιτέρω δοκιμές αποτελεσματικότητας, σε φράουλες Υπαίθρου, για την καταπολέμηση του Ωιδίου (*Sphaerotheca macularis*), σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΡΡΟ.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθ. 60051 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκηκτόνο) **SYSTHANE 20 EW** (δραστική ουσία:myclobutanil), η οποία χορηγήθηκε με τη με την με αριθ. 118018/8-5-2006 Απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ