

## ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

## ΦΟΛΙΜΑΡ ΣΟΛΙΝΤ:

Το Folimar Solid είναι ένα σύνθετο στερεό οργανο-μεταλλικό λίπασμα φυτικής προέλευσης που υποστηρίζει τη σωστή βλαστική ανάπτυξη. Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης ενεργών ουσιών ενισχύει την άνθηση, την καρπόδεση και την ομαλή ανάπτυξη των καρπών μέχρι τη συγκομιδή, κρατώντας παράλληλα το φυτό σε ισορροπία.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Οι παρακάτω δόσεις προτείνονται από τον παρασκευαστή. Μην τις υπερβείτε. Συμβουλευθείτε τον γεωπονικό σύμβουλό σας για πιο ακριβείς προτάσεις, βασισμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας, προς αποφυγή υπερλίπανσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ADAMA ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Λύσεις για τη Γεωργία.

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :**

**ΛΑΧΑΝΙΚΑ:** Δόση εφαρμογής: 50-100 γρ./στρέμμα. 2 με 3 εφαρμογές κάθε 7- 10 ημέρες, κατά την περίοδο της βλαστικής ανάπτυξης.



**ΛΙΠΑΣΜΑ CE**

Στερεό οργανο-μεταλλικό λίπασμα ΝΚ, 1,5-20

Στερεό οργανο-μεταλλικό λίπασμα με Άζωτο και Κάλιο και εκχύλισμα *Ascorphyllum nodosum*.

**Εγγυημένη Σύνθεση**

- Ολικό άζωτο (N): ..... 1,5%  
[Οργανικό Άζωτο (N) φυτικής προέλευσης ..... 1,0 %]
- Ολικό Υδατοδιαλυτό K<sub>2</sub>O: ..... 20,0%
- Οργανικός Άνθρακας (Corg): ..... 30,0%
- Ξηρή ουσία: ..... 95%

**Συστατικά**

Εκχύλισμα *Ascorphyllum nodosum* EC no. 283-907-6 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών)

**Σημαντικές Πληροφορίες**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  
Παρασκευαστής:  
**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559  
Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:  
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

**Σάρωση για χρήση**



01/2023-4

1  
ΚΙΛΟ

**ΦΡΟΥΤΑ:** Δόση εφαρμογής: 50-100 γρ./ στρέμμα. 2 με 3 εφαρμογές κάθε 7-10 ημέρες, από την πτώση πετάλων και μετά.

**ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:** Δόση εφαρμογής: 50-100 γρ./στρέμμα. 1 με 2 εφαρμογές κάθε 7-10 ημέρες, κατά την περίοδο της βλαστικής ανάπτυξης.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:**

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία. Τα ανοιγμένα σακιά θα πρέπει να σφραγίζονται καλά μεταξύ των εφαρμογών. Διατηρήστε το σε θερμοκρασία >0° C και <40° C.