



AGIL 10 EC



ADAMA



ZIZANIOKTONO

EC - Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο κατά ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων.



Εγγυημένη Σύμβαση

- Propraquizafor 10% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 89,5% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.A.: 70095/27.08.2014

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την

τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA

ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73,

15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ:

2111205559,

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



1
ΛΙΤΡΟ

AGIL 10 EC

Περιέχει Προπρακίζαφορ, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

Υποπίπτει για πρόκληση καρκίνου.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση και γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για να προστατεύσετε



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατεύσετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

16000041PFR_01

Ανοιξτε εδώ

AGIL 10 EC

ΑΤΖΙΑ: Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το groraquizafor απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα. Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1-2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10-20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-60 λίτρα νερό/στρέμμα. Χρησιμοποιήστε μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τα 3/4 με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ(Λεμονιά-Πορτοκαλιά-Μανταρινιά/Κλημεντίνες-Tangerine-Γκρέιπ φρουτ-Φράπες-Περγαμόντο-Νεραντζιά-Κιτριά-Κουμκουάτ)-**ΑΚΡΟΔΡΥΑ**(Αμυγδαλιά-Καστανιά-Φιστικιά-Καρυδιά-Φουντουκιά-Κουκουναριά)-**ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ-ΑΜΠΕΛΙ-ΣΚΟΡΔΟ-ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ-ΑΣΚΑΛΟΝΙΑ-ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΕΠΟΝΙ(Υ)-ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΛΑΧΑΝΟ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ(φρέσκα)-ΑΡΑΚ-ΑΣ(φρέσκος)-ΟΣΠΡΙΑ**(Αρακάς-Ρεβίθια-Φακές-Φασόλια-Λούπινα-Κουκιά)-**ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ-ΒΑΜΒΑΚΙ-ΛΙΝΑΡΙ-ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ-ΚΑΠΝΟΣ-ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ-ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ:**

Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*. Εφαρμογές μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Δόση: α) 75-120 κ.εκ./στρ. για Ετήσια ζιζάνια, από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων. β) 150-200 κ.εκ./στρ. για Πολυετή ζιζάνια, όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) 100-150 κ.εκ./στρ. για το Βέλιουρα (Sorghum halepense), όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ. **ΚΑΡΟΤΟ-ΡΙΖΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ-ΣΠΑΝΑΚΙ-ΠΑΤΑΤΑ-ΜΗΔΙΚΗ-ΤΡΙΦΥΛΛΙ-ΒΙΚΟΣ:** Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*. Εφαρμογές μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Δόση: α) 75-120 κ.εκ./στρ. για Ετήσια ζιζάνια, από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων. β) 150 κ.εκ./στρ. για Πολυετή ζιζάνια, όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) 100-150 κ.εκ./στρ. για το Βέλιουρα (Sorghum halepense), όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ. **ΠΑΝΤΖΑΡΙ** (Χρήση ήσσονος σημασίας): Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*. Δόση: 75-100 κ.εκ./στρ. Εφαρμογές μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. α) Ετήσια ζιζάνια, από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων. β) Πολυετή ζιζάνια, όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) Βέλιουρα (Sorghum halepense), όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ. **ΜΑΡΑΘΟΣ:** Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*. Εφαρμογές μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Δόση: α) 75-120 κ.εκ./στρ. για Ετήσια ζιζάνια, από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων. β) 125 κ.εκ./στρ. για Πολυετή ζιζάνια, όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) 100-125 κ.εκ./στρ. για το Βέλιουρα (Sorghum halepense), όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ. **ΣΠΑΡΑΓΓΙ:** Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*. Εφαρμογές μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Δόση: α) 75-120 κ.εκ./στρ. για Ετήσια ζιζάνια, από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων. β) 120 κ.εκ./στρ. για Πολυετή ζιζάνια, όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) 100-120 κ.εκ./στρ. για το Βέλιουρα (Sorghum

halepense), όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ. **ΗΛΙΑΝΘΟΣ-ΣΟΓΙΑ:** Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*. Δόση: 75-120 κ.εκ./στρ. Εφαρμογές μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. α) Ετήσια ζιζάνια, από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων. β) Πολυετή ζιζάνια, όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) Βέλιουρα (Sorghum halepense), όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ. **ΡΥΖΙ:** Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: 75-120 κ.εκ./στρ. Η εφαρμογή γίνεται πριν τη σπορά της καλλιέργειας και μεταφυτρωτικά των ζιζανίων (ως ανωτέρω) σε αποστραγγισμένο έδαφος.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-60 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Μία (1) εφαρμογή. Ειδικά για Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά και Κερασιά, πριν την άνθηση της καλλιέργειας.

Παρατηρήσεις: ● Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται πριν καλυφθούν τα ζιζάνια από την καλλιέργεια.

● Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. *Καταπολεμούμενα ζιζάνια: ●Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Αλεπονουρά, Αγριοβρώμη (μεγάλη και μικρή), Βρώμοι, Αιματόχορτο, Μουχρίτσα & Μικρή μουχρίτσα, Ελευσίνη, Αγριοκρίθαρο, Ήρες, Φαλαρίδες, Πάνικο, Σετάριας, Βέλιουρας από σπόρο, Σιτάρι. ●Πολυετή ζιζάνια: Αγρόπυρο/Ελυμος, Αγρωστής, Αγριάδα, Πάσταλο, Τραχεία λειβαδοπόα, Λεία λειβαδοπόα, Βέλιουρας από ριζώματα. ● Για την χρήση ήσσονος σημασίας παντζαριού δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για την χρήση αυτή, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

● Μην σπέρνετε σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη και αραβόσιτο πριν περάσουν 10 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

● Μην σπέρνετε βρώμη πριν περάσουν 16 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

● Μην σπέρνετε μπιζέλι, φασόλι, ελαιοκράμβη πριν περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Goltix 700SC, Ethosat 50SC, Ethofumesate ALFA 50SC, Pendigan 40WG και Belvedere Extra SE.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ:

Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά: **Δεν εφαρμόζεται (εφαρμογή πριν την άνθηση της καλλιέργειας).**

Ρύζι: **Δεν εφαρμόζεται.**

Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Ηλιανθος, Λινάρι, Σόγια: **90 ημέρες.**

Πεπόνι: **60 ημέρες.**

Όσπρια (Φακές, Αρακάς, Ρεβίθια, Φασόλια, Λούπινα, Κουκιά): **50 ημέρες.**

Παντζάρι, Ζαχαρότευτλα, Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος: **45 ημέρες.**

Φασολάκια (φρέσκα), Αρακάς (φρέσκος), Πατάτα, Καπνός: **40 ημέρες.**

Μηλοειδή, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αμπέλι, Καρότο, Ρίζα μαιντανού, Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλώνια, Τομάτα, Μελιτζάνα, Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Σπανάκι, Μάραθος, Σπαράγγι: **30 ημέρες.**



AGIL 10 EC



ADAMA



ZIZANIOKTONO

EC-
Γαλακτωματοποίηση
υγρό



Εγγυημένη Σύνθεση

- Propraquizafor 10% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 89,5% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.A.: 70095/27.08.2014

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την

τελική διάθεση στην αγορά: **ADAMA**

ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως

73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555,

Φαξ: 2111205559,

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία

παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



1
ΛΙΤΡΟ

AGIL 10 EC

Περιέχει Propraquizafor, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

Υπόπτο για πρόκληση καρκίνου.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής

ΟΜΑΔΑ A ZIZANIOKTONO

κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατεύσετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

L600004IPFR_01