



Listen • Learn • Deliver



Προσοχή. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Υποπτό για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. "59.5% του μείγματος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας από αναπνοής."



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Monumental Plaza 7ος όροφος Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι-Αθήνα | Τηλ.: 211 120 5555, Fax: 211 120 5559
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 343, ΤΚ 57008 Ιωνία | Τηλ.: 2310 784931-6, Fax: 2310 780453

Το παρόν τυπώθηκε Ιανουάριο 2024



ADAMA

ΚUGAR ONE®

Φύλακας στο... σιτάρι

Απλοποιεί την
ζιζανιοκτονία!

Αποτελεσματικότητα
στα κυριότερα ζιζάνια
με ENA πέρασμα




ADAMA.COM

Μια έξυπνη σύνθεση σε μια εξαιρετική φόρμουλα

+ Το Pinoxaden ανήκει στην ομάδα των 'DEN', παρεμποδίζει το ένζυμο ACCase και είναι μοναδικό στην κατηγορία του καθώς δρα σε δυο σημεία: στο ένζυμο του χλωροπλάστη αλλά και στο κυτόπλασμα. Απορροφάται από τα φύλλα και μετακινείται στους υπέργειους και υπόγειους μεριστωματικούς ιστούς των ζιζανίων.

+ Το Clodinafor-propargyl ανήκει στην ομάδα των 'FOP' και παρεμποδίζει το ένζυμο ACCase. Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος και μετακινείται διασυστηματικά στα σημεία ανάπτυξης φύλλων και βλαστών.

+ Το Florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών και παρεμποδίζει το ένζυμο ALS. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μετακινείται μέσω του ξυλώδους και ηθμώδους ιστού ανοδικά και καθοδικά.



Άγριο σινάπι



Ήρα



Μεγαλόκαρπη κολλιτσίδα

Ένα Μοναδικό Αποτέλεσμα

+ Απλοποίηση της ζιζανιοκτονίας: Ταυτόχρονη καταπολέμηση αγρωστώδων και πλατύφυλλων ζιζανίων με 1 πέρασμα.

+ Γρήγορη απορρόφηση - Αντοχή στην έκπλυση: Η γρήγορη απορρόφηση (30 λεπτά από τον ψεκασμό) μειώνει τον κίνδυνο της έκπλυσης από βροχή.

+ Ευελιξία στην εφαρμογή: Μεγάλο εύρος χρόνου εφαρμογής.

+ Σύνθεση που δεν απαιτεί την προσθήκη επιφανειοδραστικού.

+ Εκλεκτικότητα στην καλλιέργεια.



Φάλαρη



Αγριοβρώμη



Αλεπονουρά



Χαμομήλι



Εγκεκριμένο Φάσμα Δράσης

Pinoxaden 3% + Clodinafor-propargyl 3%
+ Florasulam 0,75%

A.A.Δ.A: 70007/03.10.2019
H/M Τροποπ. 24/2/2023

Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ	ΔΟΣΗ (κεκ/στρ)	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σιτάρι (μαλακό, σκληρό)	67-100	10-40	Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την έναρξη του αδελφώματος του σιταριού ως το σχηματισμό του 2ου κόμβου (BBCH 21-32)

Στόχοι

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

- Ευαίσθητα ζιζάνια**
- ✓ Αγρωστώδη: Αλεπονουρά, Αγριοβρώμη, Φάλαρη, Ήρα
- ✓ Πλατύφυλλα: Μεγαλόκαρπη κολλιτσίδα Χαμομήλι, Παπαρούνα, Άγριο σινάπι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- ✓ Για την μέγιστη αποτελεσματικότητα, να εφαρμόζετε το Kugar one® σε ζιζάνια που βρίσκονται σε φάση έντονης / ενεργής ανάπτυξης. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν είναι τα ζιζάνια σε κατάσταση στρες.
- ✓ Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων.

