



Fluazinam 50%

A.A.Δ.A: 60991/13.11.2020

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓ. ΑΡΙΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ. ΠΕΡΙΟΔΟ
		Κ. ΕΚ. / στρέμμα	Κ. ΕΚ. / 100 λίτρα νερού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Μηλιά Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis – Venturia pirina) Αλτερνάρια (Alternaria mali-Alternaria alternata)	100	70-100	100-150	Από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι τη δεύτερη καρπώπτωση BBCH 57-73	3 εφαρμογές με μεσο-διάστημα 14 ημερών
Αχλαδιά	Στεμφύλιο (Stemphylium vesicarium)					
Αμπέλι (μόνο οино ποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών)	Τεφρά σήψη (Botrytis cinereal)	100-150	100-150	20-100	Από την αρχή της άνθησης μέχρι την ωρίμαση των ραγών BBCH 60-85	1
Πατάτα	Περονόσπορος (Phytophthora infestans)	30-40	30-66	60-100	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων μέχρι την έναρξη του κιτρινίσματος τους BBCH 10-91	10 εφαρμογές με μεσο διάστημα 7-10 ημερών



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)	
Μηλιά, Αχλαδιά	60
Πατάτα	7
Αμπέλι (μόνο οиноποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών)	21



Listen • Learn • Deliver



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα | Τηλ.: 211 120 5555, Fax: 211 120 5559
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 343, ΤΚ 57008 Ιωνία | Τηλ.: 2310 784931-6, Fax: 2310 780453

0921Φ80



Η ΝΕΑ αξιόπιστη
επιλογή στη μάχη
με το Φουζικλάδιο

Ισχυρή προστατευτική και μεγάλης διάρκειας δράση.
Αντοχή στην έκπλυση.
Χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας.



MYKHOTOKONO

ADAMA.COM

Τρόπος δράσης

Το Banjo, είναι ένα πολυδύναμο μυκητοκτόνο επαφής. Η δραστική του ουσία fluazinam ανήκει στην ομάδα των φαινυλοπυριδιναμινών. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμβαίνει στην

λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης διακόπτοντας έτσι την παραγωγή ενέργειας στο κύτταρο του παθογόνου. Δρα δια της επαφής παρεμποδίζοντας:

1



την βλάστηση των σπορίων

2

την είσοδο του παθογόνου
εντός του φυτού

3

την παραγωγή σπορίων



Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήματα

- ✓ Ισχυρή προστατευτική δράση
- ✓ Μεγάλη διάρκεια δράσης
- ✓ Αντοχή στην έκπλυση.
- ✓ Χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας
- ✓ Ιδανικό για προγράμματα φυτοπροστασίας διαχείρισης ανθεκτικότητας
- ✓ Άριστος έλεγχος του φουζικλαδίου τόσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς
- ✓ Ευελιξία στην εφαρμογή



Fluazinam 50%


Η αξιόπιστη επιλογή
στη μάχη με το φουζικλάδιο

Αποτελεσματικότητα

Το Banjo έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα στον έλεγχο του φουζικλαδίου σε όλες τις πειραματικές εφαρμογές, τόσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς.



ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ – ΑΧΛΑΔΙΑ



Η πρόταση της ADAMA

Με την προσθήκη του Banjo η ADAMA διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου στις καλλιέργειες της μηλιάς και της αχλαδιάς.

Το Banjo μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα για την καταπολέμηση του Φουζικλαδίου είτε μόνο του είτε σε συνδυασμούς με διελασματικά /

διασυστηματικά μυκητοκτόνα.

Ο συνδυασμός του με το Embrelia SC*, ένα μυκητοκτόνο με ισχυρή προληπτική και μακράς διάρκειας δράση στους ψεκασμούς από την άνθηση και μετά παρέχει εξαιρετική προστασία, δίνοντας λύσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.



EMBRELIA SC

BANJO 500 SC

*Embrelia SC: isopyrazam 10%+difenoconazole 4%. ΑΑΔΑ: 60712/08.11.2018-Τροποπ.: 23.03.2020