

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υποπτο για πρόκληση καρκίνου. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / προστατευτικά γυαλιά κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατάλληλα γάντια / προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με ποσοστό άμμου άνω του 80%. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: ●30 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα με φυτική κάλυψη, για μηλοειδή, ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά και ακρόδρυα. ●30 μέτρων για την κερασιά.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:** Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΜΕΡΠΑΝ:** Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Με ψεκασμούς καλύψεως.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο-τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό.

**ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** **ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ-ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΙΑ:** Φουζικλάδιο, Καστανή κηλίδωση αχλαδιάς, Γλοιοσπόριο. Δόση: **150-160\* γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την έναρξη της βλάστησης. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ:** Φαιά σήψη, Κορύνεο, Εξώασκος, Φόμοψη. Δόση: α) **150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και της βλάστησης. β) **300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές από την πτώση των φύλλων μέχρι τη διόγκωση των οφθαλμών. **ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ:** Φαιά σήψη, Κορύνεο. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και της βλάστησης. **ΚΕΡΑΣΙΑ:** Φαιά σήψη, Κορύνεο. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και της βλάστησης. **ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Χρήσεις ήσσονος σημασίας):** **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ:** Φουζικοκκο ή φόμοψη, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση, Κορύνεο, Πολυστίγμωση. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-65). **ΦΙΣΤΙΚΙΑ:** Σεπτόρια, Βοτρυοσφαίρια, Αλτερνάρια. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-65). **ΚΑΡΥΔΙΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ:** Ανθράκωση. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-65). **ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ:** Αλτερνάρια, Ανθράκωση. Δόση: **150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-65).

**Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):** Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Αχλαδομηλιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά-Κερασιά-Ακρόδρυα (χρήσεις ήσσονος σημασίας): Αμυγδαλιά-Φιστικιά-Καρυδιά-Καστανιά-Φουντουκιά (80-150), Ροδακινιά-Νεκταρινιά (80-150\*\*).

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο-Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Αχλαδομηλιά (10 / 7-10 ημέρες), Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά-Ακρόδρυα (χρήσεις ήσσονος σημασίας): Αμυγδαλιά-Φιστικιά-Καρυδιά-Καστανιά-Φουντουκιά (4 / 7-10 ημέρες), Κερασιά (2 / 7-10 ημέρες).



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ WG – Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

**Εγγυημένη Σύνθεση**  
● Captan . . . . . 80% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 14,9% β/β

**Πεδίο Εφαρμογής**  
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φουντουκιά.

**Σημαντικές Πληροφορίες**  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  
Α.Α.Δ.Α.: 60558/27.10.2016  
Κάτοχος της Άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559  
Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:  
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

**Σάρωση για χρήση**



1 ΚΙΛΟ

**Παρατηρήσεις:** 1) Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. 2) Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας (αμυγδαλιά, φιστικιά, καρυδιά, καστανιά και φουντουκιά), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή στη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. \* Οι δόσεις να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα. \*\* Στα πυρηνόκαρπα στις εφαρμογές από την πτώση των φύλλων έως την διόγκωση των οφθαλμών χρησιμοποιείτε όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Λόγω του τρόπου δράσης του captan (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το Merpan® 80WG πρέπει να χρησιμοποιείται στα προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης. Να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** 48 ώρες. Για την είσοδο στην ψεκασμένη περιοχή φοράτε προστατευτικά γάντια. Μην επιτρέπετε την είσοδο κατοικίδιων ζώων στις ψεκασμένες περιοχές πριν παρέλθει ο χρόνος αναμονής.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά: **21 ημέρες.** Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά, Φουντουκιά): **Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.**

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (π.χ. Red Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canada) και αχλαδιάς (π.χ. D'Anjou, Bosc), μπορεί να πάθουν ζημιά. Σε περιπτώσεις όπου προηγείται ή έπεται εφαρμογή με σκευάσματα ορυκτελαίων ή θειαφιού, να τηρείται διάστημα 3 εβδομάδων στα μηλοειδή και 1 εβδομάδας στα πυρηνόκαρπα μεταξύ της εφαρμογής του Merpan® 80WG και του ψεκασμού με ορυκτελαία και 1 εβδομάδας μεταξύ της εφαρμογής του Merpan® 80WG και του ψεκασμού με θειάφι.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:** Φυλάξτε το στην αρχική απαράβιαστη συσκευασία του, σε μέρος καλά αεριζόμενο, δροσερό, ξηρό, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.