



PENDIGAN 40 SC



ADAMA



ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

SC - Συμπυκνωμένο
εναιώρημα

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων κατά το φύτευμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλιζιακό καπνού



Εγγυημένη Σύνθεση

- Pendimethalin 40% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες:** 62,07% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.A.: 70208/03.04.2017

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559,

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



1
ΛΙΤΡΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει Pendimethalin και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή. Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση.

Πλένετε όλα τα προστατευτικά ενδύματα μετά τη χρήση.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων συμπεριλαμβανόμενης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού, μια απέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων συμπεριλαμβανόμενης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών μια απέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων για τις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων και των μηλοειδών και μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για όλες τις άλλες



ΟΜΑΔΑ K1 ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

LB00241PFR_01



ADAMA



ZIZANIOKTONO

SC - Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων κατά το φύτεμα τους, σε διάδορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλιζιακό καπνού



Εγγυημένη Σύνθεση

- Pendimethalin 40% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες:** 62,07% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.Α.: 70208/03.04.2017

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559, Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



NO VARNISH AREA

1 ΛΙΤΡΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει Pendimethalin και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή.

Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την ανάμιξη/ φόρτωση.

Πλένετε όλα τα προστατευτικά ενδύματα μετά τη χρήση.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων συμπεριλαμβανόμενης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού, μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων συμπεριλαμβανόμενης μίας φυτικής ζώνης ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων για τις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων και των μηλοειδών και μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για όλες τις άλλες καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.

ΟΜΑΔΑ K1 ZIZANIOKTONO

Οδηγίες για τηνασφαλήαπόσυρσητουφυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Ανοιξτε εδώ

L60024IPFR_01

PENDIGAN 40 SC

PENTIGKAN 40: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Κατά το φύτευμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλοξικό καπνού. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

Δρα δι' επαφής και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μασχαλιαίων οφθαλμών-φυλλίτζια, που ακολουθεί το κορυφολόγημα των αμερικανικών καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσπαρτικά με ενσωμάτωση, προφυτρωτικά, επιφανειακά ή χωρίς μεταφυτρωτικά. Στην επιφανειακή εφαρμογή αν δεν βρέξει μέσα σε 5-6 ημέρες χρειάζεται πότισμα.

Επίσης εφαρμόζεται ως αντιφυλλοξικό καπνού ψεκάζοντας τα κορυφολογημένα καπνόφυτα.

Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση ψεκαστικού μικρότερη από 3 -4 ατμόσφαιρες (45-60 PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ-ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά-Κερασιά)-**ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσουλιά): Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.

Δόση: **300-500 κ.εκ./στρ.** Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων (πριν την άνθηση). **ΑΜΠΕΛΙ** (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα σταφύλια): Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-500 κ.εκ./στρ.** Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης, το χειμώνα (στο τέλος του χειμερινού λήθαργου, πριν την έναρξη της βλάστησης). **ΣΚΟΡΔΟ:** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-500 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή χωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στάδιο μαστιγίου). **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή πριν την μεταφύτευση με ενσωμάτωση ή σε εγκατεστημένη φυτεία κατά την περίοδο του λήθαργου, πριν την νέα ανάπτυξη, σε γυμνό έδαφος πριν την εμφάνιση ζιζανίων.

ΣΕΛΙΝΟ-ΛΑΧΑΝΟ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή πριν την μεταφύτευση. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ (από σπόρο):** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή χωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο του μαστιγίου). **ΚΡΕΜΜΥΔΙ (μεταφυτευμένο):** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή πριν την μεταφύτευση. **ΦΡΑΟΥΛΑ:** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-500 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας ή σε εγκατεστημένη φυτεία κατά το λήθαργο. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-500 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας.

ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ-ΗΛΙΑΝΘΟΣ-ΣΟΓΙΑ-ΑΡΑΧΙΔΑ*-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΜΠΙΖΕΛΙ-ΦΑΣΟΛΙ-ΠΑΤΑΤΑ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-500 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά). **ΦΑΚΗ*-ΦΑΒΑ*-ΡΕΒΙΘΙ*-ΚΟΥΚΙΑ*:** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά). **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΠΑΜΙΑ*:** Ετήσια αγρωστώδη και

πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή πριν την μεταφύτευση. **ΠΙΠΕΡΙΑ:** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-500 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή πριν την μεταφύτευση. **ΡΑΔΙΚΙ*-ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ*-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ*** (φύλλα: Σέλινο-Μάραθο-Κόλιανδρο-Φινόκιο-Άνηθος): Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-400 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά). **ΣΠΑΡΑΓΓΙ*:** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-500 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προφυτρωτικά: α) είτε στην επιφάνεια των σαμαριών μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πλαστικό. β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδομένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σαμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου. **ΚΑΡΟΤΟ*:** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-500 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά). **ΚΑΠΝΟΣ (σαν αντιφυλλοξικό των Αμερικανικών καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια):** Παρεμπόδιση ανάπτυξης μασχαλιαίων οφθαλμών-φυλλίτζιων. Δόση: **300 κ.εκ./στρ.** Στις αρχές της άνθησης σφού κορυφολογηθούν τα καπνά αρκετά χαμηλά, ψεκασμό με 20 κ.εκ. ψ.υ./φυτό, διαλύματος 10 κ.εκ. προϊόντος/λίτρο. **ΚΑΠΝΟΣ (σαν ζιζανιοκτόνο):** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **300-500 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή πριν ή μετά τη μεταφύτευση ανάμεσα στις γραμμές μετά το τελευταίο παράχωμα και χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των φυτών. **ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ*:** Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **250-300 κ.εκ./στρ.** Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά την μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστημένες φυτείες.

***Χρήση ήσσονος σημασίας.**

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-60 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: 1) Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελοφύλλων, που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Pendigan 40SC. 2) Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη - μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών. 3) Η δράση του σκευάσματος στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση - «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. 4) Το σκεύασμα καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. 5) **Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:** Ευαίσθητα Ζιζάνια: Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Ήρα, Πράσινη Σετάρια. 6) **Ετήσια Πλατύφυλλα Ζιζάνια:** Ευαίσθητα Ζιζάνια: Βλήτο, Πλαγιστό Βλήτο, Τραχύ Βλήτο, Αναγallis, Λουβουδιά, Αγριομαργαρίτα, Άγρια Ρόκα, Αγριομάρουλο, Χαμομήλι, Παπαρούνα κοινή, Φάλαρις, Πικρίς, Πολυκόμπι, Γλυστρίδα, Άγριο σινάπι, Ήμερο σινάπι, Στύφνος, Ζωχός, Σισίμπριο, Βερόνια, Μετριάς ευαίσθητα: Καπνόχορτο, Αγριοπιπεριά, Αλμυρίδι. 7) **Προτεινόμενα είδη καλλωπιστικών φυτών:** Τούγια, είδη Prunus sp., Κουπρεσοκύταρις, Βιβούρνο, Κράταιγος, Ήμερο πορνάρι, Πασχαλιά, Μανόλια, Δρυς, Φοίνικας, Πεύκο, Λεύκα, Πλάτανος, Ιτιά κλαίουσα, Καρυδιά, Ροδόδεντρο, Πυξός, Καμέλια, Γαρδένια, Κυδωνίαστρα, Κυπαρίσσι, Ευάνυμο, Πυράκανθα, Φορσύθια, Ιβίσκος, Άρκευθος, Λεβάντα, Αγγελική, Μυρτιά, Πικροδάφνη, Χαμαίροπας, Φωτίνια, Λιγούστρο, Δάφνη Απόλλωνος, Γιούκα, Κισσός, Πελαργόνιο, Γασεμί, Μυόπορο, Σπαράγγι, Φρέζια, Λίλιουμ, Παιώνια, Γλυτσίνα, Ammophila sp. 8) Το Pendigan 40SC είναι ασφαλές κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη καλλωπιστικών (φυτά, θάμνοι, δέντρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητα

του σε όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, μπορεί να προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επομένως, συστήνεται, πριν τη γενικευμένη χρήση του, η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών και η εξέτασή τους 1-2 μήνες μετά για πιθανή φυτοτοξικότητα. Μην κάνετε καθολικούς ψεκασμούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς μεταφύτευση. Μην εφαρμόζετε το **Pendigan 40SC** σε καλλωπιστικά φυτά που έχουν εμβολιαστεί ή είναι σε έντονη βλαστική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία. **9)** Μην εφαρμόζετε το **Pendigan 40SC** σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη βλαστική ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω στο φύλλωμα, τους οφθαλμούς ή τα άνθη. Φροντίστε ώστε το έδαφος να μην έχει σκασίματα ή ρωγμές που ενδεχόμενα θα επιτρέψουν την επαφή του **Pendigan 40SC** με το ριζικό σύστημα των καλλωπιστικών φυτών. Όταν το ριζικό σύστημα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε την εφαρμογή του **Pendigan 40SC** πριν τον εμβολιασμό ή την άνθηση των φυτών. **10)** Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλωπιστικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, μην τα φυτέψετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί **Pendigan 40SC** κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Για φυτά που μεταφυτεύονται γυμνόριζα, μην εφαρμόζετε το **Pendigan 40SC** πριν περάσουν 2-4 εβδομάδες από τη μεταφύτευση στην οριστική τους θέση. **11)** *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας (αραχίδα, καρότο, φακή, φάβα, ρεβύθι, κουκιά, μπάμια, σπαράγγι, ραδίκι, μαϊντανός, αρωματικά φυτά/φύλλα και καλλωπιστικά) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για*

πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: α) εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. β) εφαρμογή σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από τις συνιστώμενες στον ίδιο αγρό την ίδια καλλιεργητική περίοδο, πριν περάσουν έξι μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Καπνός (κλάδεμα παραφυάδων): 21 ημέρες.

Λοιπές καλλιέργειες: Δεν ορίζεται

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.