

Feranto® 50 WG

Kresoxim-methyl (Κρεζοξίμ-μεθύλ)

Εναιωρηματοποιησιμοί Κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Kresoxim-methyl 50% β/β

(χημική ομάδα στρομπιλουρίνης)

Βοηθητικές ουσίες 47,4% β/β

Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική ή/και θεραπευτική δράση, καθώς και αξιόλογη διάρκεια δράσης (περίπου 15 ημέρες).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Υποπτο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60362/14-4-2013

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210-6860130, www.basf-agro.gr

© Σήμα Κατατεθέν BASF



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Feranto® 50 WG δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σποριών, την ανάπτυξη του μυκηλίου καθώς και την παραγωγή σπορίων. Εμφανίζει διελασματική και τοπικά διεισδυτική δράση και η αποτελεσματικότητά του δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Διαλύουμε το σκεύασμα σε λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μίγμα στο μισογεμισμένο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και απογεμίζουμε το βυτίο με νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: • **Αμπέλι – Ωίδιο (*Uncinula necator*).** Δόση 20 γρ. σκευάσματος/στρέμμα, με 30 -150 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, 3. Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί, ξεκινώντας πριν από την άνθηση, με μεσοδιάστημα 12 – 14 ημερών. • **Μηλιά – Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*), Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*).** Δόση 20 γρ. σκευάσματος/στρέμμα, με 100 – 250 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 3, ή 4 εφόσον ο συνολικός αριθμός εφαρμογών για το φουζικλάδιο στην περιοχή ξεπερνά τις 11 ανά καλλιεργητική περίοδο. Ο πρώτος ψεκασμός πρέπει να γίνεται στο χρονικό διάστημα που τα δέντρα βρίσκονται μεταξύ του σταδίου της πράσινης κορυφής έως την πρώτη ανάπτυξη των καρπών και οι επόμενοι να ακολουθούν με μεσοδιαστήματα 12 – 14 ημερών. • **Ελιά (Βρώσιμη, Ελαιοποιήσιμη) – Κυκλοκόνιο (*Spilocaea oleagina*).** Δόση 10-20 γρ. σκευάσματος/στρέμμα, με 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2 για τις βρώσιμες και 3 για τις ελαιοποιήσιμες ελιές. Έναρξη ψεκασμών μετά τη συλλογή του ελαιοκάρπου όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, χωρίς να υπερβεί η δόση τα 20 γρ./στρέμμα σκευάσματος ανά εφαρμογή. • Στις βρώσιμες ελιές οι εφαρμογές ξεκινούν μετά τη συγκομιδή και σταματούν πριν την επόμενη άνθηση (κρόκισμα). Στις ελαιοποιήσιμες ελιές γίνονται κατά μέγιστο 2 εφαρμογές μετά τη συλλογή των καρπών και πριν την άνθηση (Χειμώνας - Άνοιξη) και 1 εφαρμογή όταν ο ελαιοκάρπος είναι παρών (Φθινόπωρο - Χειμώνας).

Παρατηρήσεις: 1. Η μικρή δόση στην ελιά συνιστάται για μείγματα με εγκεκριμένα σκευάσματα οργανικού χαλκού και η μεγάλη όταν το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο του. 2. Εφόσον υπάρχει σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις. 3. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ανθεκτικότητας στα παθογόνα στόχους συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις **συνεχόμενες** (μέχρι 3) ή **απλές** (σε εναλλαγή ή σε μίγμα με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρίνων (π.χ. azoxystrobin) ή οξαζολιδινιδιόνων (π.χ. famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτές). Στην περίπτωση που οι αγροτικές προειδοποιήσεις συστήνουν θεραπευτικές επεμβάσεις για το φουζικλάδιο στη μηλιά, τότε μόνο (κατ' εξαίρεση), μπορεί το σκεύασμα να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά. 4. **Να μην διενεργούνται θεραπευτικές επεμβάσεις, εκτός αν συστήνονται από τις αγροτικές προειδοποιήσεις.** 5. Να μην χρησιμοποιείται σε αμώδεις περιοχές με ψυχρά κλίματα και υψηλή βροχόπτωση. 6. Να μην εφαρμόζεται σε αμπελώνες ή μηλεώνες που χρησιμοποιούνται για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μπορεί να συνδυαστεί με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρίνων (π.χ. azoxystrobin) ή οξαζολιδινιδιόνων (π.χ. famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτές.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες): Αμπέλι: 35. Μηλιά: 28. Ελιά, Ελαιοποιήσιμη: 30. Ελιά, Βρώσιμη: -

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπασε ψεκαστικό υγρό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα, κρατώντας τα βλεφάρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε αρκετό νερό. Ζητήστε ιατρική προνοία. Μην προκαλείτε εμετό εκτός αν σας δοθεί τέτοια εντολή από κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό και μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή αν έχει σπασμούς.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντιδοτο.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: Η επανείσοδος σε ψεκασμένες καλλιεργίες είναι δυνατή αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική απараβιασθή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Για το προϊόν, γίνεται καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Συστήνεται η καύση τους σε κατάλληλους κλιβάνους, όπως και για το φυτοπροστατευτικό προϊόν. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης 1100°C.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

