



INVERT 1,8 EW



ADAMA



ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

EW - Γαλάκτωμα,
λάδι σε νερό

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου κατά κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων.



Εγγυημένη Σύνθεση

● Abamectin 1,8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,9% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.A.: 14663/07.06.2018

Κάτοχος της άδειας: ADAMA Celcius Property BV, Amsterdam (NL), Ολλανδία,

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559, ,

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



NO VARNISH
AREA

1
ΛΙΤΡΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολίν-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή.

Κατά την εφαρμογή με τρακτέρ πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια μόνο για τον χειρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού ή την επαφή με τις μολυσμένες επιφάνειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.



ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 5 μέτρων για τα κηπευτικά, 10 μέτρων για το αμπέλι, 15 μέτρων για πορτοκαλιά, 20 μ για ροδακινιά, νεκταρινιά, μηλιά και αχλαδιά.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Αποσύρτε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν τα ζιζάνια είναι ανθισμένα.

Για εφαρμογές στο θερμοκήπιο, να μην εισάγονται έντομα επικονιαστές πριν περάσουν 4 ημέρες από την εφαρμογή.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στομάχι. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμεινεί καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
2107793777

Ανοιξτε εδώ

L60048IPFR_01

INVERT 1,8 EW

INBERT: Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου κατά κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων. Δρα ως αναστολέας των νευροδιαβιβαστών, αυξάνοντας την έκλυση του γ-αμινοβουτυρικού οξέος. Τα ακάρεα και τα έντομα ακινητοποιούνται αμέσως μετά την έκθεση, ενώ απαιτούνται 3 έως 5 ημέρες για την επίτευξη της μέγιστης θνησιμότητας. Κατά την περίοδο αυτή, περιορίζουν πολύ τη διατροφή τους, προκαλώντας συνεπώς ελάχιστες ζημιές στα φυτά.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό δοχείο την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Δόση: **30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού.** Φυλλοκνίστης. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών, στη νέα βλάστηση. Κίτρινος τετράνυχος, Πανόνυχος, Παραμορφωτικό Άκαρι. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών, από την καρπόδεση έως την ανάπτυξη των καρπών 40% του τελικού μεγέθους. **ΑΧΛΑΔΙΑ:** Ψύλλα, Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος. Δόση: **50-100 κ. εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού.** Ψεκασμός από την πτώση των πετάλων έως 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή. **ΜΗΛΙΑ:** Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος. Δόση: **80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού.** Ψεκασμός από την πτώση των πετάλων έως 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ:** Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος. Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού.** Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών, από την πτώση των πετάλων μέχρι 14 ημέρες πριν τη συγκομιδή. **ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμο & Επιτραπέζιο)-ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ)-ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Θ)-ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Θ)-ΠΕΠΟΝΙ (Υ+Θ)-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ+Θ)-ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υ+Θ)-ΦΡΑΟΥΛΑ (Θ)-ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ):** Κίτρινος τετράνυχος. Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού.** Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ):** Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού.** Τετράνυχος, Κίτρινος τετράνυχος. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. **ΛΥΡΙΟΜΥΖΑ:** Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ):** Τετράνυχος, Κίτρινος τετράνυχος. Δόση: **50-80 κ. εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού.** Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ)-ΛΟΙΠΑ ΣΑΛΑΤΙΚΑ (Υ) [Λυκοτριβόλο-Σκαρόλα (πικρίδα)-Πλατύφυλλα αντίδια-Καλλιέργειες νεαρών φύλλων/baby leaf (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)]:** Δόση: **50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού.** Τετράνυχος. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. **ΛΥΡΙΟΜΥΖΑ:** Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):

Πορτοκαλιά (100-200), Αχλαδιά-Μηλιά (75-120), Ροδακινιά-Νεκταρινιά (100-120), Αμπέλι οινοποιήσιμο (50-100), Αμπέλι επιτραπέζιο (50-120), Αγγούρι (Θ)-Αγγουράκι (Θ)-Κολοκυθάκι

(Θ)-Πεπόνι (Υ+Θ)-Καρπούζι (Υ+Θ)-Κολοκύθα (Υ+Θ)-Φράουλα (Θ)-Τομάτα (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Πιπεριά (Υ)-Μαρούλι (Υ)-Λοιπά σαλατικά (Υ) (30- 100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος – Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Πορτοκαλιά (3 / 7 ημέρες), Αχλαδιά-Μηλιά (2 / 15 ημέρες), Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Αμπέλι (οινοποιήσιμο & επιτραπέζιο) (1), Αγγούρι (Θ)-Αγγουράκι (Θ)-Κολοκυθάκι (Θ)-Πεπόνι (Υ+Θ)-Καρπούζι (Υ+Θ)-Κολοκύθα (Υ+Θ)-Φράουλα (Θ) (2 / 7 ημέρες), Τομάτα (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Πιπεριά (Υ)-Μαρούλι (Υ)-Λοιπά σαλατικά (Υ) (3 / 7 ημέρες).

Παρατηρήσεις:

1) Η δόση είναι ανάλογη του επιπέδου προσβολής.

2) Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας σε καλλιέργειες αγρού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με ακαρεοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Συνιστάται επίσης να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερες από δύο φορές συνεχόμενα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεσθε στην ψεκασμένη περιοχή πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα. Για την περίπτωση του αμπελιού, είναι απαραίτητη μια περίοδος αναμονής πριν την επανείσοδο στο χωράφι δυο ημερών, για εργασίες που ξεπερνούν τις δυο ώρες σε διάρκεια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Ροδακινιά, Νεκταρινιά: **14 ημέρες.**

Πορτοκαλιά, Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα Σταφύλια: **10 ημέρες.**

Μαρούλια και Λοιπά Σαλατικά (Υ): **7 ημέρες.**

Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ): **5 ημέρες.**

Μελιτζάνα (Υ+Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Φράουλα (Θ), Πιπεριά (Υ), Μηλιά, Αχλαδιά, Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Κολοκύθα (Θ): **3 ημέρες.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.



ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

EW - Γαλάκτωμα,
λάδι σε νερό

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου κατά κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων.



Εγγυημένη Σύνθεση

- Abamectin 1,8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,9% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.A.: 14663/07.06.2018

Κάτοχος της άδειας: ADAMA Celcius Property BV, Amsterdam (NL), Ολλανδία,

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ**

A.E. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής

Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559, ,

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



1
ΛΙΤΡΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολιν-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμειξη/φόρτωση και εφαρμογή.

Κατά την εφαρμογή με τρακτέρ πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια μόνο για τον χειρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού ή την επαφή με τις μολυσμένες επιφάνειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα

κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.



Να μην
πλέ-

ΒΕΤΕ

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

τον εξοπλισμό

εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ασφάλιστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 5 μέτρων για τα κηπευτικά, 10 μέτρων για το αμπέλι, 15 μέτρων για πορτοκαλιά, 20 μ για ροδακινιά, νεκταρινιά, μηλιά και αχλαδιά. Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Αποσύρτε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν τα ζιζάνια είναι ανθισμένα.

Για εφαρμογές στο θερμοκήπιο, να μην εισάγονται έντομα επικονιαστές πριν περάσουν 4 ημέρες από την εφαρμογή.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Σε περίπτωση κατάποσης,** ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

LB00461PFR_01