



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

EC -
Γαλακτωματοποιήσιμο
υγρό

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση κατά του ωϊδίου στο αμπέλι



Εγγυημένη Σύνθεση

- Bupirimate 11,6% β/ο
 - Tebuconazole 4,7% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 83,3% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια)



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Α.Α.Δ.Α.: 60444/16.02.2015
Κάτοχος της άδειας: ADAMA IRVITA N.V.,
Pos Cabai Office Park, Unit 13, P.O. Box 403,
Curacao,
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως
73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211205555, Φαξ:
211205559,
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



NO VARNISH
AREA

1
ΛΙΤΡΟ

VINETO EC

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από
τη χρήση.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμο-
ποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστα-
τευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασί-
ας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση
και γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά
την εφαρμογή.

Περιέχει bupirimate & 2-ethylhexyl-lactate.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυ-
τοπροστατευτικού προϊόντος και της συ-
σκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία)
ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανι-
σμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξε-
πλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο)
και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προη-
γουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ση-



ΟΜΑΔΑ 8 | 3 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

μεία συλ-
λογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη
συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κο-
ντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για την προστασία των φυτών μη στόχων, να
αφήσετε μίαν ασέκαστη ζώνη 5 μέτρων από
μη γεωργική γη.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την αν-
θρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθή-
στε τις οδηγίες χρήσης.**

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης,
συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Καλέ-
στε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα
γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξε-
πλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκε-
τά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συ-
νεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέ-
σως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το
δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε
εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,
αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκα-
στικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε
καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος
με νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακο-
λουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
2107793777**

Ανοίξτε εδώ

L60047IPFR_01

VINETO EC

ΒΙΝΕΤΟ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση κατά του Ωιδίου στο αμπέλι. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το bupirimate της ομάδας των αμινοπυριμιδινών, απορροφάται από τα φύλλα, μετακινείται διελασματικά, διασυστηματικά και μέσω ατμών, έχει προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση και αναστέλλει και την παραγωγή σπορίων. Το tebuconazole της ομάδας των τριαζολών, διασυστηματικό μυκητοκτόνο, με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε δύο (2) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα σταφύλια): Ωίδιο. Δόση: **150-200 κ.εκ./στρέμμα**. Εφαρμογές από το στάδιο του 4ου φύλλου, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και ιδιαίτερα στο κρίσιμο στάδιο από το δέσιμο μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Τρεις (3) εφαρμογές ανά 8-10 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής. **2)** Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας. **3)** Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. **4)** Κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, να μη γίνονται πάνω από 2 εφαρμογές (μεσοδιάστημα 8 ημέρες).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Για τη διαχείριση των φαινομένων ανθεκτικότητας, οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις τριαζόλες. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**

Οι εργάτες να εισέρχονται στην καλλιέργεια αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. Σε περίπτωση που εισέλθουν αμέσως μετά τον ψεκασμό, να φορούν γάντια, μακρύ παντελόνι και μπλούζα με μανίκια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα σταφύλια): **14 ημέρες**.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Folpet 80WG, Katanga Express 80WG, Vincare WG, Pyrinex 25CS.

Προσοχή: Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από θερμότητα και άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες <50°C και >0°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

EC -
Γαλακτωματοποιήσιμο
υγρό



Εγγυημένη Σύνθεση

- Bupirimate 11,6% β/ο
 - Tebuconazole 4,7% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 83,3% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια)



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Α.Α.Δ.Α.: 60444/16.02.2015
Κάτοχος της άδειας: ADAMA IRVITA N.V.,
Pos Cabai Office Park, Unit 13, P.O. Box 403,
Curacao,
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως
73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211205555, Φαξ:
211205559,
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



1
ΛΙΤΡΟ

VINETO EC

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την εφαρμογή.

Περιέχει bupirimate & 2-ethylhexyl-lactate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη δι-



ασφά-
λιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για την προστασία των φυτών μη στόχων, να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκάστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

L60047IPFR_01