



ADAMA

AGIL[®] 10 EC

Ένα για όλα!



Ισχυρή δράση
Υψηλή απόδοση
Ευελιξία

Το ταχύτερο
αγρωστωδοκτόνο



ZIZANIOKTONO



ADAMA.COM

Τρόπος δράσης

Το Proρακίζαφορ απορροφάται ταχύτατα από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται διασυστηματικά στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα.

Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1-2 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Τα νεότερα φύλλα κιτρινίζουν και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Οι επιπτώσεις είναι ορατές μετά 3 ημέρες. Τα ζιζάνια τελικά καταστρέφονται μέσα σε 10-20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.



Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Αλεπονουρά, Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή, Βρώμοι, Αιματόχορτο, Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα, Ελευσίνη, αγριοκρίθαρο, Ήρες, Φαλαρίδες, Πάνικο, Σετάριας, Βέλιουρας από σπόρο, Σιτάρια

Πολυετή ζιζάνια:

Αγρόπυρο/Ελυμος, Άγρωστης, κύπερη πορφυρή, Αγριάδα, Πάσπαλο, Τραχεία λειβαδοπόα, λεία λειβαδοπόα, Βέλιουρας από ριζώματα.



Πεδίο Εφαρμογής	Δόσεις σκευάσματος		Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο
	κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ.υγρού λίτρα / στρ	
Εσπεριδοειδή Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά/Κλημεντίνες, Tangerine, Γκρέιτ φρουτ, Φράπες, Περγαμόντο, Νεραντζιά, ΚιτριάΚουμκουάτ	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150		1 (πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καστανιά, ΦιστικιάΚαρυδιά, Φουντουκιά, Κουκουναριά)			1 (πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
Μηλιά, Αχλαδιά			1
Ροδακινιά,Νεκταρινιά			1
Βερικοκιά, Δαμασκηνιά,Κερασιά			1 (πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
Αμπέλι			
Καρότο, Ρίζα μαϊντανού	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150	20-60	1
ΠΑΝΤΖΑΡΙ (Χρήση ήσσοносσημασίας)	75-100		
Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλώνια	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150		
Τομάτα, Μελιτζάνα			
Πεπόνι (υπαίθρου)			
Μπρόκολο			
Λάχανο Κουνουπίδι	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150		
Σπανάκι	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150		
Μάραθος	α) 75-120 β) 125 γ) 100-125		
Σπαράγγι	α) 75-120 β) 120 γ) 100-120		
Φασολάκια, Αρακάς(φρέσκα)	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150		
Όσπρια: Αρακάς Ρεβίθια Φακές Φασόλια Λούπινα Κουκιά	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150		1
Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Λινάρι	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150		
Ηλιάνθος, Σόγια	75-120		
Πατάτα	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150		
Ζαχαρότευτλα	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150		
Μηδική Τριφύλλι Βίκος	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150		
Καπνός	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150		
Καλλωπιστικά φυτάΦυτόρια Δασικά δένδρα	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150		
Ρύζι	75-120		

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. α) Για ετήσια ζιζάνια: από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων β) Για πολυετή ζιζάνια: όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) Για το βέλιουρα (Sorghum halepense): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ

Για το ρύζι: Η εφαρμογή γίνεται πριν τη σπορά της καλλιέργειας και μεταφυτρωτικά των ζιζανίων (ως ανωτέρω) σε αποστραγγισμένο έδαφος

Για την χρήση ήσσοносσημασίας παντζαριού δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για την χρήση αυτή, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν

- ✓ Ταχύτατη δράση-πρώτο και με διαφορά χρόνου
- ✓ Άριστος έλεγχος μεγάλου αριθμού αγρωστωδών ζιζανίων
 - ✓ Εγκεκριμένο σε πολλές καλλιέργειες
- ✓ Αποτελεσματικό ακόμα και σε δύσκολα είδη ζιζανίων
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στην έκπλυση, ακόμα κι αν βρέξει 1 ώρα μετά την εφαρμογή του
- ✓ Ευελιξία στην εφαρμογή και τους συνδυασμούς του



ADAMA

Listen ▸ Learn ▸ Deliver

0522097

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα



ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα | Τηλ.: 211 120 5555, Fax: 211 120 5559
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 343, ΤΚ 57008 Ιωνία | Τηλ.: 2310 784931-6, Fax: 2310 780453