



ADAMA

Listen • Learn • Deliver



Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

#### ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Monumental Plaza 7ος όροφος Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι-Αθήνα | Τηλ.: 211 120 5555, Fax: 211 120 5559  
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 343, TK 57008 Ιωνία | Τηλ.: 2310 784931-6, Fax: 2310 780453

Το παρόν τυπώθηκε Μάιο 2023



ANCAVINT® 150 ZC  
Το αξιόπιστο εντομοκτόνο



Υψηλή  
αποτελεσματικότητα

Διπλός τρόπος δράσης  
Υψηλό knock down  
Μεγάλη διάρκεια δράσης



ADAMA.COM

# ANCAVINT® 150 ZC

## Αξιόπιστο - Γρήγορο - Δυνατό

Μίγμα 2 δραστικών chlorantraniliprole 10% + lambda-cyhalothrin 5%, με τεχνολογία Ζεον, που δρά σε πολλά στάδια ανάπτυξης των εντομών και προσφέρει:

- ⌚ Διπλή προστασία
- ⌚ Υψηλό knock down
- ⌚ Μεγάλη διάρκεια δράσης


Εντομοκτόνο που συνδυάζει υψηλή αποτελεσματικότητα σε δύο πολύπλευρους τρόπους δράσης και αντιμετωπίζει ευρύ φάσμα στόχων όπως λεπιδόπτερα, κολεόπτερα, αφίδες σε πολλές σημαντικές καλλιέργειες.



### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ



### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ



chlorantraniliprole 10% + lambda-cyhalothrin 5%

Αριθμός Αδειας Διάθεσης στην Αγορά 14820 /13.02.2023

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
		Κ.ΕΚ./ΣΤΡΕΜΜΑ	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ ΛΙΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ		
Τομάτα (Υ)	Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα Φυλλορύκτης της Τομάτας ( <i>Tuta absoluta</i> ) Αφίδες	20	20-100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση της 1ης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση	
Μπρόκολο (Υ)	Πλουτέλλα Πιερίδα Σποντόπτερα Αφίδες	20	20-100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή	
Αγκινάρα	Σποντόπτερα Άλτης Αφίδες	20	20-100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2ου φύλλου έως ότου τα φύλλα φτάσουν το 90% του τελικού μεγέθους	
Πατάτα	Φθοριμαία Δορυφόρος της πατάτας	25 20	30-80	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Στην έναρξη της κάλυψης της καλλιέργειας (10%) έως την άνθιση των πρώτων ανθέων.	
Βαμβάκι	Πράσινο σκουλήκι	30	40-80	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από το στάδιο όπου το 40% των φυτών ενώνονται ανάμεσα στις γραμμές έως ότου το 70% των καρυδιών έχει αποκτήσει το τελικό του μέγεθος	1
Αραβόσιτος	Πυραλίδα Σεζάμια Πράσινο σκουλήκι Διαβρώτικα	30	30-60	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4ου κόμβου έως ότου τουλάχιστον τα μισά σπυριά αλλάξουν χρώμα (από λευκό σε κίτρινο) και η ξηρά ουσία ξεπεράσει το 40%	
Γλυκό Καλαμπόκι	Πυραλίδα Σεζάμια Πράσινο σκουλήκι Διαβρώτικα	30	30-60	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως τη φυσιολογική ωρίμανση (ορατή η στοιβάδα αποχωρισμού στη βάση του σπυριού)	

### ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (PHI)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	PHI (ΗΜΕΡΕΣ)
Βαμβάκι	21
Γλυκό καλαμπόκι, Πατάτα	14
Τομάτα (Υ), Μπρόκολο (Υ), Αγκινάρα	3
Αραβόσιτος	Δεν ορίζεται. Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής.