



# FOLIMAR ROOT



ADAMA



## ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Υγρό οργανο-ανόργανο  
λίπασμα NK 9.5-0-9

Υγρο οργανο-ανόργανο λίπασμα με Άζωτο, Κάλιο, εκχύλισμα *Ascophyllum nodosum* και σπόρους *Brassica nigra*



### Εγγυημένη Σύνθεση

- Ολικό Υδατοδιαλυτό K2O ..... 9 %
  - Ολικό Άζωτο ..... 9.5 %
  - Οργανικός άνθρακας (Corg) ..... 10 %
- Ξηρή ουσία: 35,4 %



### Συστατικά

Οξικό Κάλιο CAS no. 127-08-2 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών Ουρία CAS no. 57-13-6 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών) Σπόροι *Brassica Nigra* (ΚΣΥ 2: Φυτά, μέρη φυτών ή εκχυλίσματα φυτών) Εκχύλισμα *Ascophyllum nodosum* CAS no. 84775-78-0 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών)



### Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  
Πιστοποιημένο από τη CerTrust Ltd. (Κοιν. οργανισμός αρ. 2806), Αρ.  
πιστοποιητικού: FB 006454 001

Παρασκευαστής: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Λ.  
Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559  
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



### Σάρωση για χρήση



L60078IPFR\_01

5 ΛΙΤΡΑ

## FOLIMAR ROOT

Μακριά από παιδιά.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

**ΦΟΛΙΜΑΡ ΡΟΥΤ:** Το Folimar Root είναι ένα υγρο οργανο-ανόργανο λίπασμα με Άζωτο, Κάλιο, εκχύλισμα *Ascophyllum nodosum* και σπόρους *Brassica nigra*, που προωθεί την ανάπτυξη των ριζών. Υποστηρίζει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος σε δύσκολες συνθήκες όπως είναι τα εδάφη με βαρέα μέταλλα, κακό αερισμό ή με παρουσία εδαφογενών μολυσμάτων. Το Folimar Root αποκαθιστά το ριζικό σύστημα μέσω της δημιουργίας νέου επιφανειακού και της βελτίωσης του υπάρχοντος. Σκληραίνει τα κυτταρικά τοιχώματα, ενδυναμώνει το εξωτερικό στρώμα των ριζών και βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρακάτω δόσεις προτείνονται από τον παρασκευαστή. Μην τις υπερβείτε. Το προϊόν περιέχει ουρία και μπορεί να απελευθερώσει

αμμωνία στην ατμόσφαιρα με αντίστοιχη επίδραση στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, λάβετε αντίστοιχα μέτρα εξαερισμού. Συμβουλευθείτε τον γεωπονικό σύμβουλό σας για πιο ακριβείς προτάσεις, βασισμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας, προς αποφυγή υπερλίπανσης. Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΑΔΑΜΑΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Λύσεις για τη Γεωργία.

### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

#### ΛΑΧΑΝΙΚΑ και ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

**Δόση εφαρμογής:** 500 κ.εκ. / στρ ανά 7 ημέρες σε περίπτωση χαμηλού στρες της καλλιέργειας. 2 λίτρα / στρ. ανά 20 ημέρες σε περίπτωση υψηλού στρες της καλλιέργειας. Εφαρμογή μέσω άρδευσης.

#### ΜΑΡΟΥΛΙ και ΚΑΡΟΤΟ: Δόση εφαρμογής:

500 κ.εκ. / στρ ανά 7 ημέρες σε περίπτωση χαμηλού στρες της καλλιέργειας. 2 λίτρα / στρ. ανά 20 ημέρες σε περίπτωση υψηλού στρες της καλλιέργειας. Εφαρμογή ψεκασμού φυλλώματος. Μετά την εφαρμογή, χρησιμοποιήστε ικανό όγκο νερού για την πλήρη διαβροχή του ριζικού συστήματος.

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ

**ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:** Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρήστε το σε θερμοκρασία  $> 0^{\circ} \text{C}$  και  $< 35^{\circ} \text{C}$ .