



Listen ▶ Learn ▶ Deliver



Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει lambda-cyhalothrin και 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Monumental Plaza 7ος όροφος Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι-Αθήνα | Τηλ.: 211 120 5555, Fax: 211 120 5559
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 343, ΤΚ 57008 Ιωνία | Τηλ.: 2310 784931-6, Fax: 2310 780453

Το παρόν τυπώθηκε Μάιο 2023



ANCAVINT® 150 ZC

Το αξιόπιστο εντομοκτόνο

Υψηλή
αποτελεσματικότητα

Διπλός τρόπος δράσης
Υψηλό knock down
Μεγάλη διάρκεια δράσης



ADAMA.COM

ANCAVINT® 150 ZC

Αξιόπιστο – Γρήγορο – Δυνατό

Μίγμα 2 δραστικών chlorantraniliprole 10% + lambda-cyhalothrin 5%, με τεχνολογία Zeon, που δρα σε πολλά στάδια ανάπτυξης των εντομών και προσφέρει:

- ✔ Διπλή προστασία
- ✔ Υψηλό knock down
- ✔ Μεγάλη διάρκεια δράσης

Εντομοκτόνο που συνδυάζει υψηλή αποτελεσματικότητα σε δυο πολύπλευρους τρόπους δράσης και αντιμετωπίζει ευρύ φάσμα στόχων όπως λεπιδόπτερα, κολεόπτερα, αφίδες σε πολλές σημαντικές καλλιέργειες.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ



chlorantraniliprole 10% + lambda-cyhalothrin 5%

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά 14820 /13.02.2023

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
		Κ.Ε.Κ. / ΣΤΡΕΜΜΑ	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ ΛΙΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ		
Τομάτα (Υ)	Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα Φυλλορύκτης της Τομάτας (<i>Tuta absoluta</i>) Αφίδες	20	20-100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση της 1ης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση	
Μπρόκολο (Υ)	Πλουτέλλα Πιερίδα Σποντόπτερα Αφίδες	20	20-100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή	
Αγκινάρα	Σποντόπτερα Άλτης Αφίδες	20	20-100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2ου φύλλου έως ότου τα φύλλα φτάσουν το 90% του τελικού μεγέθους	
Πατάτα	Φθοριμαία Δορυφόρος της πατάτας	25 20	30-80	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Στην έναρξη της κάλυψης της καλλιέργειας (10%) έως την άνθιση των πρώτων ανθέων.	1
Βαμβάκι	Πράσινο σκουλήκι	30	40-80	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από το στάδιο όπου το 40% των φυτών ενώνονται ανάμεσα στις γραμμές έως ότου το 70% των καρυδιών έχει αποκτήσει το τελικό του μέγεθος	
Αραβόσιτος	Πυραλίδα Σεζάμια Πράσινο σκουλήκι Διαβρώτικα	30	30-60	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4ου κόμβου έως ότου τουλάχιστον τα μισά σπυριά αλλάξουν χρώμα (από λευκό σε κίτρινο) και η ξηρά ουσία ξεπεράσει το 40%	
Γλυκό Καλαμπόκι	Πυραλίδα Σεζάμια Πράσινο σκουλήκι Διαβρώτικα	30	30-60	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως τη φυσιολογική ωρίμανση (ορατή η στοιβάδα αποχωρισμού στη βάση του σπυριού)	

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΡΗΙ)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΡΗΙ (ΗΜΕΡΕΣ)
Βαμβάκι	21
Γλυκό καλαμπόκι, Πατάτα	14
Τομάτα (Υ), Μπρόκολο (Υ), Αγκινάρα	3
Αραβόσιτος	Δεν ορίζεται. Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής.