



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.



Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.



Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο και αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμειξη/φόρτωση και γάντια και φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/συσκευασιών.



Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα

νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποστειθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: ●30 μέτρων, για τις

Grafiti® 2,5EC

Deltamethrin (Ντελταμεθρίν) 2,5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Deltamethrin2,5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες97,35% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.A.: 14659/14.05.2018

Αριθμός Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



ADAMA

Κάτοχος της Άδειας:

Proplan Plant Protection Company SL

C/ Valle Del Roncal 12,

28232 Las Rozas, Madrid, Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

δενδρώδεις καλλιέργειες. ●20 μέτρων, για αμπέλι και ελιά. ●30 μέτρων, με φυτική κάλυψη (φυτική ζώνη ανάσχεσης), σε τομάτα, μελιτζάνα, κολοκυνθοειδή, φράουλα και αγκινάρα. ●20 μέτρων, που να συμπεριλαμβάνει 10 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75%, σε Κουνουπίδι και Μπρόκολο. ●10 μέτρων για τις υπόλοιπες υπαίθριες καλλιέργειες.

Για να προστατέψετε τα αρθρώποδα μη στόχους να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80%, σε δενδρώδεις καλλιέργειες ή κατά 60%, σε ελιά.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.

Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για εφαρμογές σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, για την προστασία των μελισσών να μην εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της άνησης, όταν τα θερμοκήπια παραμένουν ανοικτά.

Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα ωφέλιμα έντομα και τους επικονιαστές όπως οι βομβίνες κ.α.

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



ΑΝΟΙΕΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

01/1/2023-5

ΓΚΡΑΦΙΤΙ: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεντρωμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά-Λεμονιά-Μανταρινιά-Γκρέιπ φρουτ-Νεραντζιά): Αφίδες, Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Λεκάνιο, Μύγα της Μεσογείου. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **ΑΚΡΟΔΥΣΑ (Αμυγδαλιά-Φιστικιά-Φουντούκια-Καρδιά-Καστανιά):** Αφίδες, Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Καρπόκαφα Καρυδιάς, Καρπόκαφα Καστανιάς. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. Ευρύτομο. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή με την έναρξη των πτήσεων των ακμίων. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουμουλιά):** Καρπόκαφα, Αφίδες, Ψύλλα μηλιάς. Δόση: 30-50* κ. εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Φυλλοδέτεες. Δόση: 35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψύλλα αχλαδιάς. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερκοκιά-Δαμασκηλιά-Κερασιά-Βυσινιά):** Φυλλοδέτεες, Ανάοισα. Δόση: 35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ραγολέτιδα. Δόση: 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μύγα της Μεσογείου. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Αφίδες, Καρπόκαφα της Δαμασκηνιάς. Δόση: 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **ΑΜΠΕΛΙ**:** Ευδεμίδα. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (1η γενιά) & 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (2η και 3η γενιά). Κογγυλίδα. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Τζιτζικιά. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΕΛΙΑ (Επιτραπέζια & ελιές για παραγωγή λαδιού):** Πυρρηγότρη (ανθόβια και καρποβία γενιάς). Δόση: 30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Δάκος. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμίων στις παγίδες. Λεκάνιο. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Βαμβάκαδα. Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. **ΦΡΑΟΥΛΙΑ (Υ):** Αφίδες, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΦΡΑΟΥΛΙΑ (Θ):** Αφίδες, Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ-ΠΡΑΣΟ-ΣΚΟΡΔΟ:** Κοφτοσκούληκα, Θρίπες. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ)-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ):** Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Άλτρη, Μαμέστορα, Κοφτοσκούληκα, Σποντόπτερα. Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Δουρφόρος. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Βρωμίσσα. Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ):** Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δουρφόρος, Αφίδες. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Βρωμίσσα. Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Αλευρώδης (Θ). Δόση: 70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Κοφτοσκούληκα (Υ). Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Υ+Θ):** Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Μαμέστορα, Σποντόπτερα. Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΑΓΓΟΥΡΙ-ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Υ+Θ):** Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα. Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ+Θ):** Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Μαμέστορα. Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΚΟΛΟΥΝΟΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ:** Αφίδες, Πιερίδα, Κοφτοσκούληκα, Πράσινο σκουλήκι, Μαμέστορα, Πλουτέλλα. Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΛΑΧΑΝΟ (εκτός από κινέζικο):** Πιερίδα, Μαμέστορα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Πλουτέλλα. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ):** Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Άλτρη, Αφίδες. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ-ΦΥΛΛΑ ΣΕΛΙΝΟΥ-ΡΟΚΑ:** Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστορα, Άλτρη. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΜΠΙΖΕΛΙΑ (αρακάς) ΦΡΕΣΚΑ:** Αφίδα των μπιζελιών, Στόνα. Δόση: 25 κ.εκ./στρ. Αφίδα των κουκίων, Κάμπια των μπιζελιών, Θρίπας, Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Κασσιίδα. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Προντένια, Αφίδες. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΨΥΧΑΝΘΗ (Όσπρια: Φασόλια-Κουκιά-Φακή-Ρεβίθια):** Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΠΑΤΑΤΑ:** Δουρφόρος. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Σποντόπτερα. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Ρόδινο σκουλήκι, Πράσινο σκουλήκι. Δόση: 50-70 κ.εκ./στρ. Αλευρώδης, Τζιτζικιά. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Σποντόπτερα, Αφίδα, Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των προσβολών. **ΚΑΠΝΟΣ:** Κοφτοσκούληκα, Θρίπας. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΑ-ΠΑΝΤΖΑΡΙ:** Αφίδες, Μύγα των τεύλων, Άλτρη, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Κασσιίδα. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΑΡΑΒΟΣΠΙΤΟΣ**:** Πυραλίδα, Σέξζαμα, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Διαβρωτικά. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι-Κριθάρι-Βρώμη-Σίκαλη):** Αφίδες, Κοφτοσκούληκα. Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **ΜΗΔΙΚΗ:** Αφί-

δα των μπιζελιών, Σκαθάρι των μπιζελιών, Φυτονόμος. Δόση: 25 κ.εκ./στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υ+Θ):** Αφίδες, Θρίπες. Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Φυλλοδέτεες. Δόση: 35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Αλευρώδης. Δόση: 70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):

Εσπεριδοειδή-Ακρόδρυα (καρπόκαφα καρυδιάς/καρπόκαφα καστανιάς/ευρύτομο)-Μηλοειδή (ψύλλα αχλαδιάς)-Αμπέλι-Μπιζελιά (αρακάς) φρέσκα-Αγκινάρα (100), Ακρόδρυα (αφίδες) (140), Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα-Ελιά (δάκος/Λεκάνιο/Βαμβάκαδα) (100-140), Ελιά (πυρρηγότρητης) (80-100), Φράουλα (Υ)-Τομάτα (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ) (αφίδες/πράσινο σκουλήκι/άλτρη/μαμέστορα/κοφτοσκούληκα/σποντόπτερα)-Κολοκυθάκι (Υ+Θ)-Αγγούρι (Υ+Θ)-Αγγουράκι (Υ+Θ)-Πεπόνι (Υ+Θ)-Καρπούζι (Υ+Θ)-Κουνουπίδι-Μπρόκολο (30-100), Φράουλα (Θ)-Μαρούλι (Υ)-Ψυχανθή-Καπνός-Καλλιπαστικά (Υ+Θ) (αφίδες/φυλλοδέτεες) (50-100), Καλλιπαστικά (Υ+Θ) (αλευρώδης)-Μαϊντανός-Φύλλα σέλινου-Ρόκα (70), Κρεμμύδι-Πράσο-Σκόρδο (40-50), Τομάτα (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ) (δουρφόρος/βρωμίσσα/κοφτοσκούληκα)-Πιπεριά (Υ)-Πιπεριά (Θ / αλευρώδης) (60-100), Πιπεριά (Θ) (60-140), Λάχανο (εκτός από κινέζικο)-Ζαχαρότευτα-Παντζάρι (50), Πατάτα-Αραβόσιτος (60), Βαμβάκι (30-50), Σιτηρά (40-60), Μηδική (40).

Μείγματος αριθμός εφαρμογών/καλλιερηγτική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Εσπεριδοειδή-Πυρηνόκαρπα-Ελιά-Ζαχαρότευτα-Παντζάρι-Σιτηρά (Ι), Ακρόδρυα-Μηλοειδή-Φράουλα (Υ)-Τομάτα (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ) (αφίδες/πράσινο σκουλήκι/άλτρη/μαμέστορα/κοφτοσκούληκα/σποντόπτερα)-Κολοκυθάκι (Υ+Θ)-Αγγούρι (Υ+Θ)-Αγγουράκι (Υ+Θ)-Πεπόνι (Υ+Θ)-Καρπούζι (Υ+Θ)-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Λάχανο (εκτός από κινέζικο)-Μαϊντανός-Φύλλα σέλινου-Ρόκα-Μπιζελιά (αρακάς) φρέσκα-Ψυχανθή-Βαμβάκι-Μηδική (2 / 14 ημέρες), Αμπέλι-Φράουλα (Θ)-Κρεμμύδι-Πράσο-Σκόρδο-Τομάτα (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ) (δουρφόρος/βρωμίσσα/κοφτοσκούληκα)-Πιπεριά (Υ)-Πατάτα (3 / 14 ημέρες), Μαρούλι (Υ)-Αγκινάρα-Καπνός- Καλλιπαστικά (Υ+Θ) (3 / 7 ημέρες), Αραβόσιτος (3 / 14-21 ημέρες), Πιπεριά (Θ) (4 / 7 ημέρες), Αραβόσιτος (διαβρωτικά) (3 / 7-14 ημέρες).

Παρατηρήσεις:

*** ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100λίτρο πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 λίτρα/ στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

****** Δεν επιτρέπεται η συκομμίση αμπελοφυλλών στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

******* Η εφαρμογή στο καλαμικό οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ●Χρήση καλλιερηγτικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των εντόμων και να μειωθούν οι αριθμοί των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. ●Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. ●Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. ●Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. ●Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. ●Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

- Μην εισέρχεστε στην γεωμεγμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.
- Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νεραντζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντούκια, Καρυδιά, Καστανιά, Βαμβάκι, Ζαχαρότευτα, Παντζάρι, Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: **30 ημέρες**.
Μηδική: **14 ημέρες**.
Αμπέλι, Ελιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερκοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσινιά, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φύλλα σέλινου, Μαϊντανός, Φασόλια, Κουκιά, Φακές, Ρεβίθια, Μπιζελιά-Αρακάς, Πατάτα, Καπνός: **7 ημέρες**.
Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μαρούλι, Ρόκα, Αγκινάρα: **3 ημέρες**.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Διατηρήστε το στην αρχική, απαραιτήτως συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.