

Kugar[®] one

30/30/7.5 EC

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων αγρωστωδών και πηλατύφυλλων ζιζανίων στο σιτάρι.

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Pinoxaden	3% β/ο
Clodinafop-propargyl	3% β/ο
Florasulam	0,75% β/ο
Cloquintocet-mexyl (αντιφυτοτοξικός παράγοντας)	0,75% β/ο
Βοηθητικές ουσίες	93,12% β/β
<small>(συμπεριλαμβανομένου του αντιφυτοτοξικού παράγοντα Cloquintocet-mexyl)</small>	

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.A.: 70007/03.10.2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

Αρ. Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

syngenta[®]



ADAMA

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Syngenta Hellas AEBE

Λεωφ. Ανθούσας, 15349 Ανθούσα Αττικής, Τηλ.: 2106666612-13

Διανομέας:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαϊθάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559





ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Παύλ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Υψηλό για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

59,5% του μείγματος αποτελείται από στατικά άγνωστη οξεία τοξικότητα από αναπνοή.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Αποφύγετε να αναπνεύσει ατμόν / αναθυμώσεις / αέρια / αεριοκρυσταλλίσις σταγονιδίων / σπυτίλις / εκνεφρώματα.

Μην φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για το μάτιν/πρόσωπο.

Διάθεση του περιεχομένου / περίληψη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλη μάσκα κατά την αμείλιξη/φύτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισοδού στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.



Οξίνως για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίψιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναπαθίζονται σε σημεία συλλήψεως, ή ανακυκλώνω η απόκτηση ενέργειας.



ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Μην αποφεύγετε ή ρυθίνατε μέσω των συστημάτων αποχέυσης τις επίθετες επιφανείες και τους δρόμους.

Για να προστατεύσετε μη στοχευόμενα φυτά να σφίχεται μίαν σφικαστή ζώνη προστασίας από τη μη γεωργική γη: **•3 μέτρα**, **•1** μέτρον σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς 50%.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικές οδηγίες: Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή το 24ωρο τηλεφωνικό επίσημοσ ανάγκης της Syngenta ή εάν απευθυνθείτε για θεραπεία. **Σε περίπτωση εισπνοής,** μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Βγάλτε τα ρούχωντα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **Εάν παρατηρήσει ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα,** συμβουλευθείτε/επισκεφτείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύνετε καλά το μάτι με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. **Σε περίπτωση κατάποσης,** καλέστε αμέσως γιατρό (βλέπετε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). ΜΗΝ προκαλέσει εμετό. Περιέχει αρρωστωτικό διαλυτές ή/και παράγωγα πετρελίων. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΚΟΥΚΑΡ ΟΥΑΝ: Μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων αγρωστωδών και ηλιεθών ζιζανίων στο στάρι. Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μετακινείται στον μερισματοικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και των αμινοξέων με διακοπή/μείωση αλληθία στάτων άνθρακα. Το ρινοκάλει και το clodinafopropargil δρουν παρεμποδίζοντάς τη δράση του ενζύμου Acetyl-CoA-Carboxylase (ACCCase), απαραίτητο ένζυμο για τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων. Το florasulam αναστέλλει τη δράση του ενζύμου οξείαοργαπλαστική συνθέτωση (acetolactate synthase-ALS), απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση των αμινοξέων με διακοπή/μείωση αλληθία στάτων άνθρακα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μεταφωτρωτικός καθοδικός ψεκασμός φυλλώματος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με ψεκαστές όθων των τύπων και ακροφυσία τύπου ακού-πυ. Ψεκάστε υπό συνεχή ανάδευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ/ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Γεμίζουμε με νερό το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/2, προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα ακού-πυ και μετά συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό, με συνεχή ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό. **Να γίνεται πάντα ανάδευση πριν τον ψεκασμό.**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλη τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξοραριστούν πλήρως ο σφρός και όλη τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΣΤΑΡΙ (Μαλακό και σκληρό): Επίσης ηλιεθώφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: 67-100 κ.ε./στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη του οδεινώματος του σταριού ως το σχηματικό του 2ου κόμβου (IBSC 21-32).

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-40 (λίτρα/στρέμμα).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

1) Καταπορευόμενα ζιζάνια: Αλεπουρά, Αγριοβρώμη, Φάληρα, Ήρα, Μεγαλόκαρπη κοιλίσια, Χαμομήλι, Παπαρούνα, Άγριο ανάθι, Καινόχορτο, Πολύκωμο, Βερώνικα. **2)** Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων. **3)** Εφαρμόστε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες που είναι προοβερβήσες ή είναι τάλαυαριμένες από το κρύο ή την Ξηρασία, γιατί η αποτελεσματικότητα μπορεί να μην είναι η βέλτιστη. **4)** Για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, να εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται σε φάση έντονης/ενεργής ανάπτυξης. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν είναι το ζιζάνιο σε κατάσταση στρες. **5)** Να εφαρμόζεται την Άνοιξη μόνο για χειμερικά σιτηρά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Για την ασφαλή ανάπτυξη ανεκτικότητας να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί στη διαδοχή των καλιεργειών στην αμειψοσπορά κάτω από κανονικές συνθήκες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Στάρι: Μη Εφαρμόσιμο λόγω χρόνου εφαρμογής.

ΑΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ...

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΗ-ΕΗΣ: Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία, σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 30°C, σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

