

ΤΖΙΜΠΑΛΑ:

Το γιββερελλικό οξύ είναι μια φυσική ορμόνη των φυτών, που δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης, διεγείροντας τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων με αποτέλεσμα να οδηγεί σε αυξημένη καρπώδεση και καλλιεργητικές αποδόσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι του σημείου απορροής ή στοχευμένοι ψεκασμοί.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαραίτητη ποσότητα αυτού του προϊόντος σε λίγο νερό, σε ξεχωριστό δοχείο και προσθέστε το διάλυμα στη δεξαμενή. Ξεπλύνετε το δοχείο στη δεξαμενή. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον εξοπλισμό ψεκασμού λεπτομερώς. Στραγγίστε το σύστημα στο σύνολό του και ξεπλύνετε τη δεξαμενή ψεκασμού, τη βέργα και τα ακροφύσια δύο έως τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού)-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΧΙΛΛΙΑΔΑ: Για αύξηση της καρπώδεσης και διέγερση της φυσιολογικής ανάπτυξης του καρπού. Δόση: **12 (1,2 δισκία)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Έναρξη στο 20-30% της άνθησης έως τέλους άνθησης (BBCH 62-69). **ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια σταφύλια):** α) Για αύξηση του μήκους των τρυπιδιών. Δόση: **30-100 (3-10 δισκία)** με 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν την άνθηση σε βλαστάσι μήκους 4-8 εκ. (BBCH 53-57). β) Αράωλια. Δόση: **30-50 (3-5 δισκία)** με 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στο 30-40% της άνθησης (BBCH 62-64). γ) Για αύξηση του μεγέθους της ράγας και μεγαλύτερη ομοιογένεια της παραγωγής. Δόση: **30-50 (3-5 δισκία)** με 60-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Από την καρπώδεση μέχρι διάμετρο ράγας 3-4 χιλ. (BBCH 71-79). δ) Για αύξηση της καρπώδεσης και πρόωξη της συγκομιδής. Δόση: **30 (3 δισκία)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην πλήρη άνθηση (70% πτώση των πετάλων, BBCH 65) και 5-12 ημέρες αργότερα. **ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμα σταφύλια):** Για αύξηση του μήκους των τρυπιδιών. Δόση: **5 (0,5 δισκία)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν την άνθηση σε βλαστάσι μήκους 10-15 εκ. (BBCH 53-57). **ΑΜΠΕΛΙ (για παραγωγή σταφίδας):** α) Για αύξηση του μεγέθους της ράγας. Δόση: **10 (1 δισκίο)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Μέγεθος ράγας 3 χιλ. (BBCH 79). β) Για μείωση της πτώσης ανθέων και καρπών. Δόση: **5 (0,5 δισκία)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην πλήρη άνθηση (70% πτώση των πετάλων, BBCH 65). **ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ:** Για βελτίωση της ποιότητας του φρούτου. Δόση: **20 (2 δισκία)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν τον χρωματισμό των καρπών (BBCH 79-81). **ΜΑΝΤΙΝΑΡΙΑ:** Για διέγερση της καρπώδεσης. Δόση: **10 (1 δισκίο)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Από την πλήρη άνθηση έως στο 2/3 της πτώσης των πετάλων (BBCH 65-73). **ΛΕΜΟΝΙΑ:** Για καλύτερη αποχή της συγκομιδής, μείωση του αριθμού των μικρών καρπών και αύξηση του μεγέθους των καρπών. Δόση: **20 (2 δισκία)** με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν τον χρωματισμό των καρπών (BBCH 76-79). **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Για πρόωξη της παραγωγής και καλύτερη ποιότητα. Δόση: **20-50 (2-5 δισκία)** με 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Ο πρώτος ψεκασμός κατά τον σχηματισμό του κεντρικού άνθους (BBCH 11-19).

Μείγματος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο-Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Αχλαδιά-Πορτοκαλιά-Λεμόνια-Αμπέλι/οινοποιήσιμα σταφύλια (1), Αμπέλι/επιτραπέζια σταφύλια: Για αύξηση του μήκους των τρυπιδιών & για αράωλια (1), Αμπέλι/επιτρα-

πέζια σταφύλια: Για αύξηση του μεγέθους της ράγας και μεγαλύτερη ομοιογένεια της παραγωγής (2 / 8 ημέρες¹), Αμπέλι/επιτραπέζια σταφύλια: Για αύξηση της καρπώδεσης και πρόωξη της συγκομιδής (2 / 5 ημέρες²), Αμπέλι/για παραγωγή σταφίδας: Για αύξηση του μεγέθους της ράγας (1³), Αμπέλι/για παραγωγή σταφίδας: Για μείωση της πτώσης ανθέων και καρπών (1⁴), Μανταρινιά (2 / 7 ημέρες), Αγκινάρα (3 / 15 ημέρες⁵).

Παρατηρήσεις:

¹Ασπέρμες ποικιλίες (Ζουλιανόνα, Thompson,...). ²Ζουλιανόνα. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή για καλή κάλυψη των σταφυλιών. ³Ψεκασμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. ⁴Ενα προσκολλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασμού. ⁵Ζουλιανόνα. Ψεκασμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. ⁶Ενα προσκολλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασμού. ⁷Μάυρα Κορινθιακή. Ψεκασμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. ⁸Ενα προσκολλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασμού. ⁹Α ζωτοκύκλος λίθων και η άρδευση θα πρέπει να αυξηθεί. Ψεκασμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΔΗ:

Όλες οι καλλιεργείες: Δεν απολείται.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φυλλίων.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Επါσης, παραμένει σταθερό μετά από οκτώ (8) εβδομάδες αποθήκευσης στους 40°C.

Gibbal[®] ST

Gibberellic acid (Γιββερελλικό Οξύ) 10%
Υδατοδιαλυτή Δισκία (ST)

Φυσική ορμόνη των φυτών που δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης για αυξημένη καρπώδεση και καλλιεργητικές αποδόσεις.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Gibberellic acid10% β/β
Βοηθητικές ουσίες89,25% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.D.A.: 8277/24.01.2018

Αριθμός Παράβατος:
Υπογραφή παραγωγής: ΒΑΛΕΤΕ ΕΙΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

UFI: 8A50-A092-Y00V-P7H5

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

100 ΓΡΑΜΜ. (10 x 10 ΓΡ.)



Κάτοχος της "Άδειας:
L. Gobbi srl.

Legal Office: Via B. Bosco 57,
16121 Genova, Italy

Υπευθύνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΦΥΤΟΓΚΑΡ ΑΒΕΕ
Περίβολος 6 και Χρυσόπου, 145 64, Κηφισιά
Αττικής Τηλ: 2106252600

Διανομέας:

ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λεωφόρος Κηφισιάς 44, Κηφισία Γ,
15125 Μαρούσι

Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

ADAMA

ΠΡΟΣΟΧΗ



Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Περιέχει: Άνυδρο κτηικό οξύ.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙΕΛΘΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Αποφύγετε να αναπνεύσετε αναθυμιάσεις / εκνεφώματα.

Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρύ παντόφλι και μακρυμάνικο ποκάκι.

Διάθεση περιεχομένου/περιεχτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστράφηκαν, προηγούμενες για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά.

Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νεράν από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχει παρών φάκοι επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Εάν δεν υποκειρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός,** συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής των αναθυμιάσεων,** μετακινήστε το άτομο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το φάρμακο και ξεπλύνετε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός παραμένει. **Σε περίπτωση κατάποσης,** ξεπλύνετε το στόμα, πιείτε νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777