

ΚΟΛΤΡΕΪΝ:

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Περιέχει τα δραστικά συστατικά mesotrione το οποίο ανήκει στη ομάδα των τριкетονών που παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD και το dicamba το οποίο ανήκει στην ομάδα των Βενζοϊκών παραγώγων. Το σκεύασμα απορροφάται από το στέλεχος, τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό αναστéléωντας την ανάπτυξη του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος με ψεκαστήρες δλών των τύπων και μπεκ τύπου σκούπας και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:**

Ανακινήστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Στη συνέχεια προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και πλύνετε το καλά μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση/εφαρμογή του σκευάσματος.

Να φοράτε μακριμάτινο ποκάμισο, μακρού παντελόνι και γάντια κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας, ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρυπήμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά νερά.

Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αγροκτήματα και δρόμους.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε από τη γεωργική γη μίαν αμέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυνθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως γιατρό (δείτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

UFI: E9V0-905R-8006-ET54

L60084 IPBR_01

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: **Ευαίσθητα ζιζάνια:** Αγριοβαμβακιά, Βλήθο, Λουβουδιά, Αγριοπιπεριά, Αγριοτοματιά, Μεγάλη περικοκλάδα, Τάτουλας, Αγριομελιτζάνα, Κίρσιο. **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** Πολύγονο, Λαπάτσα, Περικοκλάδα, Ραπανίδα, Μαρτιάκος. **Δόση: 200 κ.εκ./στρέμμα με 10-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα.** Ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτόρικά από τα 2 μέχρι τα 9 φύλλα της καλλιέργειας (BBCH 12-19).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: Μπορεί να πραγματοποιηθεί και σπαστή εφαρμογή του σκευάσματος με 2 εφαρμογές: Η πρώτη στο στάδιο ανάπτυξης 2 μέχρι 6 φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 12-16) με 130 κ.εκ./στρ. και η δεύτερη στο στάδιο ανάπτυξης των 8 με 9 φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 18-19) με 70 κ.εκ./στρ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

●Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι. ●Αποφύγετε την τυχόν επαφή του σκευάσματος Coltrane® SC ή τη μετακίνηση του ψεκαστικού νέφους προς γνωστές ως ευαίσθητες παρακείμενες καλλιέργειες: μηδική, τεύτλα, μουστάρδα, ηλιανθος, ελαιοκράμβη, αρακάς, καλλιέργειες ψυχανθών, τριφύλλι, πατάτα, σόγια, καπνός, καλλιέργειες λουλουδιών και καλλωπιστικών φυτών, αμπέλι και οπωροφόρα δέντρα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το σκεύασμα περιέχει mesotrione, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα F2 (27) κατά HRAC και dicamba, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα O (4) κατά HRAC. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές: ●Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα, κ.λπ.). ●Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

●Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και την επόμενη άνοιξη ηλιανθος, αφού προηγηθεί βαθεία άροση. ●Να μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και ζαχαρότευτλα, παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. Απαιτείται άροση πριν από τη σπορά/φύτευση των καλλιεργειών που θα ακολουθήσουν.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Μην εισέρχεστε σε αγρούς που έχει γίνει εφαρμογή έως του στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκασμένη φυλλική επιφάνεια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αραβόσιτος: **Δεν ορίζεται (τελευταία εφαρμογή του προϊόντος στα 9 φύλλα της καλλιέργειας).**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα Coltrane® SC δεν είναι φυτοτοξικό στον αραβόσιτο όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.