



MAXENTIS SC



ADAMA



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

SC – Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική δράση και αντισποριογόνο δράση σε παθογόνα σιτηρών.



Εγγυημένη Σύνθεση

- Prothioconazole 15% β/ο
- Azoxystrobin 20% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 68,2% β/β



Πεδίο Εφαρμογής

Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη.



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Α.Α.Δ.Α.: 61158/12.04.2024

Κάτοχος της Άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 151 25 Μαρούσι,, Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



UFI: F2YG-RDMY-CV0Q-F7HN



01/Α/2024-10

5 ΛΙΤΡΑ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΩ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.

Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή κατά την ανάμειξη και φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμό, φοράτε γάντια, μακρυμανικό πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Να αφήνετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% για την προστασία των κατοίκων ή/και των παρευρισκομένων.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.



01/Β1/2024-10

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για όλες τις καλλιέργειες.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ανοίξτε εδώ



ΜΑΞΕΝΤΙΣ:

Το **Maxentis** είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική δράση και αντιπορογόνο δράση σε παθογόνα σιτηρών. Περιέχει τα δραστικά συστατικά prothioconazole και azoxystrobin. Το prothioconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζόλες) με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση και το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο της ομάδας των QoIs (υποομάδα στρομπιλουρίνες) με προστατευτική, θεραπευτική και αντιπορογόνο δράση. Απορροφάται γρήγορα από τους ιστούς του φυτού και μετακινείται διασυστηματικά προς τα νεαρά αναπτυσσόμενα όργανα μέσω των αγγείων του ξυλώματος (ακροπηταλική κίνηση), παρέχοντας προστασία πριν και μετά την μόλυνση του φυτού από το παθογόνο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε την φιάλη πριν τη χρήση. Από συνεχή ανάδευση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αμέσως μετά την χρήση, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (σκληρό+μαλακό)-ΣΙΤΑΡΙ ΕΑΡΙΝΟ (σκληρό+μαλακό): Σεπτοριάσεις, Ελμυνοσπορίωση, Ωίδιο, Κίτρινη σκωρίαση, Καστανή σκωρίαση. Δόση: **80-100 κ.εκ./στρέμμα**. Εφαρμογή από το στάδιο έναρξης επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος πριν την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-59). **ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (σκληρό+μαλακό)-ΣΙΤΑΡΙ ΕΑΡΙΝΟ (σκληρό+μαλακό):** Φουζαριώσεις. Δόση: **80-100 κ.εκ./στρέμμα**. Εφαρμογή από την έναρξη μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 61-69). **ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ-ΚΡΙΘΑΡΙ ΕΑΡΙΝΟ:** Ρυγχόσπορωση, Ελμυνοσπορίωση, Καστανή σκωρίαση, Ραμουλάρια, Ωίδιο. Δόση: **80-100 κ.εκ./στρέμμα**. Εφαρμογή από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος πριν την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-59). **ΣΙΚΑΛΗ:** Ρυγχόσπορωση, Καστανή σκωρίαση, Σεπτοριάσεις. Δόση: **80-100 κ.εκ./στρέμμα**. Εφαρμογή από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος πριν την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-59). **ΒΡΩΜΗ:** Ωίδιο, Σκωριάσεις. Δόση: **80-100 κ.εκ./στρέμμα**. Εφαρμογή από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος πριν την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-59).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 10-40.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει τις χρήσεις στις καλλιέργειες Τριτικάλε και Σπέλτα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Σιτάρι, Τριτικάλε, Σπέλτα, Κριθάρι, Σικάλη, Βρώμη: **Δεν ορίζεται.**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος όταν η καλλιέργεια είναι σε κατάσταση στρες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες Prothioconazole και azoxystrobin οι οποίες ανήκουν στις ομάδες 3 και 11 αντίστοιχα, κατά FRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα του με άλλα σκευάσματα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό (<40°C), καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.