



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΕΣ - Γαλακτωματοποίηση υγρό

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και μεγάλης διάρκειας δράση σε παθογόνα σιτηρών



Εγγυημένη Σύνθεση

- Prothioconazole 15% β/ο
 - Fluxapyroxad 7,5% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 78,71 % β/β



Πεδίο εφαρμογής

Σιτηρά. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



Σάρωση για Χρήση



TRACEABILITY PRINTING
51/58 x 27 mm

1
ΛΙΤΡΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Μην αναπνέετε αέρια/σταγονίδια/εκνεφώματα.

Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας.

Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με φυτική κάλυψη από τα επιφανειακά ύδατα.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκάστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης, Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

7270516050101

ΟΜΑΔΑ 7 | 3 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής, απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

UFI: NW2P-3DJD-0V07-7SK0

Σημαντικές Πληροφορίες

Α.Α.Δ.Α: 61180/24.10.2024.

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 2111205570

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

UFI: NW2P-3DJD-0V07-7SK0

Product name	Avastel	
Country	GR	
Package size		
Label code		
Label dimensions (w x h)	515mm x 125mm	
Label date	11-57-56 30.06.25	Name
Smallest font on page	6 pt	Status
		Template Rect_ILT_1Lang_NA_NA.indt



AVASTEL



ADAMA



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

EC - Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

ΟΜΑΔΑ 7 | 3 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Εγγραμμένη Σύνθεση

- Prothioconazole 15% β/ο
 - Fluxapyroxad 7,5% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 78,71 % β/β



Πεδίο εφαρμογής

Σιτηρά. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Α.Α.Δ.Α: 61180/24.10.2024

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά: **ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ**
Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Λ. Κηφισίας 44, Κτήριο Γ,
151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 2111205570
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για Χρήση



UFI: NW2P-3DJD-0V07-7SK0

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με
μητρικό γάλα.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μα-
κροχρόνιες επιπτώσεις
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη
χρήση.
Μην αναπνέετε αέρια/σταγονίδια/ εκνεφώματα.
Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης/γαλουχίας.
Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτι-
κά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα
μάτια / πρόσωπο.
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο κατά
την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασί-
ας και γάντια κατά την εφαρμογή.
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας όταν εισέρχο-
νται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συ-
σκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανι-
σμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10
μέτρων με φυτική κάλυψη από τα επιφανειακά
ύδατα.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με

την εθνική νομοθεσία
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώ-
πινη υγεία και για το περιβάλλον, ακολουθήστε τις
οδηγίες χρήσης.
Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση κατάποσης, Ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα
λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλη-
μένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση εισπνοής, απομακρύνετε τον παθό-
ντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρ-
χουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμ-
βουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε αμέ-
σως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε
συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777
UFI: NW2P-3DJD-0V07-7SK0



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

12 x
1 ΛΙΤΡΟ

L230950CFR_01

Product name	Avastel	
Country	GR	
Package size		
Label code		
Label dimensions (w x h)	300mm x 150mm	
Label date	11:57:56 30.06.25	Name
Smallest font on page	8.54 pt	Status
		Template Rect_1LT_1Lang_NA_NA.indt

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Μην αναπνέετε αέρια/σταγονίδια/εκνεφώματα.

Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας.

Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** με φυτική κάλυψη από τα επιφανειακά ύδατα.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης, Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

10_090156027

Product name	Avastel	 ADAMA	
Country	GR		
Packaging size			
Label code			
Label dimensions (w x h)	151mm x 125mm		Name
Label date	11:57:56 30.06.25	Status	
Smallest font on page	8.54 pt	Template	Rect_1LT_1Long_NA_NA.indt

AVASTEL EC

ΑΒΑΣΤΕΛ:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και μεγάλη διάρκεια δράση σε παθογόνα σιτηρών. Περιέχει τα δραστικά συστατικά prothioconazole και flucarboxad που δρουν με διαφορετικό τρόπο στα παθογόνα. Το prothioconazole ανήκει στην ομάδα των DMIs (υποομάδα τριαζόλης) και παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης, ενώ το flucarboxad ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών/SDHIs και παρεμποδίζει τη μεταφορά ηλεκτρονίων στο σύμπλοκο II της αναπνευστικής αλυσίδας. Απορροφάται γρήγορα από τους ιστούς του φυτού και μετακινείται διασυστηματικά προς τα νεαρά αναπτυσσόμενα όργανα παρέχοντας προστασία πριν και μετά την μόλυνση του φυτού από το παθογόνο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε την φιάλη πριν τη χρήση. Υπό συνεχή ανάδευση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αμέσως μετά την χρήση, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (σκληρό+μαλακό)-ΣΙΤΑΡΙ ΕΑΡΙΝΟ: Σεπτοριάσεις, Ελμινθοσπορίωση, Ωίδιο, Κίτρινη σκωρίαση, Καστανή σκωρίαση, Φουζαριώσεις. Δόση: **100-125 κ.εκ./στρέμμα**. Εφαρμογή από το στάδιο έναρξης επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 30-69). ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ-ΚΡΙΘΑΡΙ ΕΑΡΙΝΟ: Ρυγχόσποριωση, Ελμινθοσπορίωση,

Ρομουλάρια. Δόση: **100-125 κ.εκ./στρέμμα**. Εφαρμογή από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι το τέλος του ξεσταχύσματος πριν την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-59).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 12,5-40. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: 1.Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει και το Τριτκάλε. 2. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου. 3. Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής από τα παθογόνα. 4. Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Σιτάρι, Κριθάρι, Τριτκάλε: **Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από το στάδιο εφαρμογής.**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική Prothioconazole, η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC και τη δραστική Flucarboxad η οποία ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC. Να εφαρμόζετε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε άλλες ομάδες με διαφορετικούς τρόπους δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιεργείες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά

Product name	Avastel	
Country	GR	
Package size		
Label code		
Label dimensions (w x h)	151mm x 125mm	
Label date	11:57:56 30.06.25	Name
Smallest font on page	7 pt	Status
		Template Rect_ILT_ILang_NA_NA.indt

αεριζόμενο, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.