



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

EC - Γαλακτωματοποιήσιμο
υγρό

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου.



Εγγυημένη Σύνθεση

- Penconazole 10% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 89,36% β/β



Πεδίο Εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες.



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Α.Α.Δ.Α.: 61195/19.02.2025 **syngenta**
Κάτοχος της Άδειας: **Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ**
Λ. Ανθούσας, 15349 Ανθούσα Αττική, Τηλ.: 210666612-13
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφ. Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



UFI: XQQT-VDPA-1V05-6KN2

01/Λ/2025-Β

400
Κ.ΕΚ.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Υποπο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, να φοράτε βαμβακερό μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα και τα κουτιά με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήνεται απέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων σε καλλιέργειες πυρηνόκαρπων.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν ξαναφορεθούν.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ανοίξτε εδώ



ΜΠΑΣΤΡΑΝΤΙΝΟ:

Διασποτισματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, λαχανικά, καπνό, ανθοκομικά και άλλες καλλιέργειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ: Ωίδιο. Δόση: 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός φυλλώματος. Από το στάδιο μεγέθους καρπού έως 10 mm έως όπου ο καρπός να έχει 80% του τελικού του μεγέθους (BBCH 71-78). ** δόση σκευάσματος 0,25 λίτ/HA LWA. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ:** Ωίδιο. Δόση: 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός φυλλώματος. Από το στάδιο ανάπτυξης των ωοθηκών έως το στάδιο ωρίμανσης των καρπών (BBCH 71-89). **ΑΜΠΕΛΙ:** Ωίδιο. Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την εμφάνιση ταξιανθίας έως το κλείσιμο του τοαμπιού (BBCH 53-79). **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Ωίδιο. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του ανθικού στελέχους έως τη συγκομιδή (BBCH 51-81). **ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ+Θ):** Ωίδιο. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της ανάπτυξης στολώνων (ορατοί, περίπου 2 cm) έως τη συγκομιδή (BBCH 41-89). **ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ)-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ+Θ)-ΠΕΠΟΝΙ (Υ+Θ)-ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υ+Θ):** Ωίδιο. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της άνθησης έως την συγκομιδή (BBCH 51-89). **ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Υ+Θ):** Ωίδιο. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της άνθησης έως την συγκομιδή (BBCH 51-89). **ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ):** Ωίδιο. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την εμφάνιση του 5ου άνθους έως την συγκομιδή (BBCH 55-89). **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ):** Ωίδιο. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της άνθησης έως την συγκομιδή (BBCH 51-89). **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ):** Ωίδιο. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη συγκομιδή (BBCH 21-89). **ΚΑΠΝΟΣ:** Ωίδιο. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Από την ανάπτυξη των πλάγιων βλαστών έως την συγκομιδή (BBCH 20-99). **ΣΜΕΟΥΡΑ-ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ:** Ωίδιο. Δόση: 40 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή έως την συγκομιδή (έως BBCH 89). **ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ (Υ+Θ):** Τριανταφυλλιά: *Sphaerotheca pannosa*, *Phragmidium* sp., *Μπιγκόνια:* *Erysiphe* sp., *Ντάλια:* *Sphaerotheca* sp., *Καλεντούλα:* *Oidium* sp., *Puccinia* sp., *Χρυσάνθεμο:* *Puccinia horiana*, *Πελαργόνιο:* *Puccinia pelargonii-zonalis*, *Γαρυφαλλία-Ποτεντίλλα-Αλθέα:* *Puccinia* sp., *Αγ-γελέχιο:* *Oidium* *enonymi japon*, *Japanese spindle tree:* *Oidium* sp. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του 3ου πραγματικού φύλλου/σπείρας/ζεύγους φύλλων έως την ωρίμανση των σπόρων/καρπών (BBCH 13-89). **ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ* (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Ωίδιο. Δόση: 75 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός, την άνοιξη έως το φθινόπωρο. **ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ* (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Ωίδιο. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός, την άνοιξη έως το φθινόπωρο. **ΜΠΑΜΙΑ (Υ)* (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Ωίδιο. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του πρώτου άνθους έως τη συγκομιδή.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Μήλα-Αχλάδια-Κυδώνια (50-140), Ροδακινιά-Βερικοκιά-Καλωπιστικά δένδρα (80-150), Αμπέλι-Αγκινάρα-Φράουλα (Υ+Θ)-Πιπεριά (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Τομάτα (Υ+Θ)-Σμέουρα-Βατόμουρα-Ανθοκομικά (Υ+Θ)-Καλωπιστικοί θάμνοι- Μπάμια (Υ) (50-100), Αγγούρι (Υ+Θ)-Καρπούζι (Υ+Θ)-Πεπόνι (Υ+Θ)-Κολοκύθα (Υ+Θ)-Κολοκυθάκι (Υ+Θ) (50-120), Καπνός (20-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο-Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: Μήλα-Αχλάδια-Κυδώνια (3 / 12-14 ημέρες), Ροδακινιά-Βερικοκιά (2 / 12-14 ημέρες), Αμπέλι (3 / 10-14), Αγκινάρα-Πιπεριά (Υ+

Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Τομάτα (Υ+Θ) (2 / 10-12), Φράουλα (Υ+Θ)-Αγγούρι (Υ+Θ)-Καρπούζι (Υ+Θ)-Πεπόνι (Υ+Θ)-Κολοκύθα (Υ+Θ)-Κολοκυθάκι (Υ+Θ)-Καπνός (2 / 10-14), Σμέουρα-Βατόμουρα (1 εφαρμογή (Υ+Θ) (2 / 7-12), Καλωπιστικά δένδρα (3 εφαρμογές), Καλωπιστικοί θάμνοι (2 εφαρμογές), Μπάμια (Υ) (2 / 10).

Παρατηρήσεις:

1) Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά. ** ΗΑ LWA: 10.000 m² έκταση επιφάνειας κόμης. -Να μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση (τομάτα, φράουλα). -Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλωπιστικά φυτά να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα. *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μπάμιας και των καλωπιστικών δέντρων και θάμνων από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία penconazole η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC. ●Στο αμπέλι και στα μηλοειδή και τα καλωπιστικά δέντρα η εφαρμογή του πρέπει να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις τρεις (3) ανά καλλιεργητική περίοδο. ●Στις υπόλοιπες καλλιέργειες (πυρηνόκαρπα, φράουλα, αγκινάρα, πιπεριά, μπάμια, τομάτα, μελιτζάνα, ανθοκομικά και καλωπιστικοί θάμνοι) οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο. ●Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να μην ξεπερνούν οι ψεκασμοί με μυκητοκτόνα DMIs το 50% των συνολικών επεμβάσεων. ●Στις περιπτώσεις πολύ υψηλών προσβολών ή σε πολύ καθυστερημένες θεραπευτικές εφαρμογές, να εφαρμόζονται εναλλαγές μυκητοκτόνων διαφορετικών ομάδων ή μειγμάτων μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΞΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Η είσοδος επιτρέπεται όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό διάλυμα στις φυλλικές επιφάνειες των καλλιεργειών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι οιονοποίησης: 21 ημέρες.

Μηλιά, Αχλάδια, Κυδώνια, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αγκινάρα, Αμπέλι επιτραπέζιο, Καπνός: 14 ημέρες. Μπάμια (Υ): 7 ημέρες. Φράουλες, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σμέουρα, Βατόμουρα: 3 ημέρες. Ανθοκομικά, Καλωπιστικά δέντρα, Καλωπιστικοί θάμνοι: Δεν ορίζεται.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Για τις χρήσεις στα ανθοκομικά φυτά σε περίπτωση ποικιλιών ελάχιστα διαδεδομένων ή πρόσφατα εισηγμένων στη χώρα, να κάνετε δοκιμές μικρής έκτασης πριν επεκτείνετε την εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.