



CLETO®

Γαλακτωματοποίησιμο υγρό (EC)
Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: CLETHODIM 12% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 86,51% β/β

BAMBAKI
30-40 λίτρα/στρέμμα

**TOMATA
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ**
30-40 λίτρα/στρέμμα

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
30-40 λίτρα/στρέμμα

• ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΕ
ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

1L

www.qemetica-agro.com

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

QEMETICA®

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70524 / 20.02.2024

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Περιέχει Clethodim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. - Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. - Περιέχει διαλύτη Νάφθα (CAS 64742-94-5).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: - Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / σπυρίδες / εκνεφώματα. - Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. - Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. - Διάθεση περιεχομένου/περίεκτ σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στον χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών. - Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). - Για να προστατέψετε τα θηλαστικά και πουλιά μη εφαρμόζεται το σκεύασμα σε εδάφη με pH < 5.5. - Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια ασφάλκη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό. Μη προκαλείτε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να τα ξεπλύνετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπουνί τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει γνωστό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται triplo ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ημερ. Παραγωγής (Man. Date): FDF: 07/2025 / **Αρ. Παρτίδας (Batch No.):** 25RFA4082

* Εμπορικό σήμα καταχωρημένο από QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, Μαρούσι 151 25, Αθήνα. Τηλ.: 211 120 5570. Fax: 211 120 5572



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

UFI: WC00-X02D
2005-FN3K

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, με διασυστηματική δράση, για την καταπολέμηση αγρωστών ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετύλου-συνενζύμου Α).

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

TOMATA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ: Για Ετήσια και Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια, δόση: 80 - 160 κ.εκ.σκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 30 - 40 λίτρα/ στρέμμα. Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του σχηματισμού του 3ου φύλλου στον κεντρικό βλαστό έως την εμφάνιση εννέα ή περισσότερων πλευρικών βλαστών (BBCH 13-29).

BAMBAKI: Για Ετήσια και Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια, δόση: 80 - 160 κ.εκ.σκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 30 - 40 λίτρα/στρέμμα. Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας, μέχρι την αρχή του αδελφώματος. (BBCH 13-19).

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Για Ετήσια και Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια, δόση: 80 - 160 κ.εκ.σκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 30 - 40 λίτρα/στρέμμα. Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας, μέχρι τα φύλλα της καλλιέργειας να καλύπτουν το 30% του εδάφους (BBCH 13-33).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης. 2. Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωή ανάπτυξης, από τα 3-4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος. Μην το εφαρμόζετε όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε συνθήκες στρες από ξηρασία ή χαμηλές θερμοκρασίες. 3. Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει για να μην προκαλούνται ζημιές σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες. 4. Μην το εφαρμόζετε εάν αναμένεται βροχή μία ώρα μετά την εφαρμογή.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Αγριοβρώμη (*Avena fatua*), Αιμάτοχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Λεπτή ήρα (*Lolium rigidum*), Σετάρια (*Setaria viridis*), Αγριοκρίθαρο (*Hordeum vulgare*), Αγριοσιτάρι (*Triticum aestivum*), Μουχρίσα (*Echinochloa crus-galli*), Αλεπουρα (*Alopecurus* sp)

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια στην μέγιστη δόση των 160 κ.εκ./στρ.: Ελύμος (*Elymus elongatus*).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: TOMATA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ: 30 ημέρες. **BAMBAKI:** 100 ημέρες. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** 56 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με επνώπιον ψεκαστήρα, ψεκαστικά μέσα χειρός ή ψεκαστικό μηχανήμα σε γεωργικό ελκυστήρα με μπκε τύπου σκούπας, πίεση 2 - 3 atm, με 30-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα και υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την αντιστοιχούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδέυση.

Χαρακτηρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιέργειες που συνιστάται και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Συνδυαστικότητα: --

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: i. σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --. ii. σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --. iii. της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική clethodim, η οποία ανήκει στην ομάδα 1 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιερητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Κάτοχος της άδειας: QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.

C/ Valle del Roncal 12, 1ª planta, oficina 7. 28232 Las Rozas, Madrid, Ισπανία. Τηλ. +34 91 626 60 97.