

Εντομοκτόνο κατά προνυμφών διαφόρων ειδών Λεπιδόπτερων, καθώς και ορισμένων ειδών Κολεοπτέρων.

Εγγυημένη Σύνθεση

- Chlorantraniliprole 20% β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 80,89% β/β

Πεδίο Εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες

Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Α.Α.Δ.Α.: 14933/17.09.2025

Κάτοχος της Άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σάρωση για χρήση



UFI VM7N-7DAW-BVOT-TA8B



01/Α/ΕΣΟ2/Α/Τ

500
Κ.ΕΚ.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Συνιστάται η χρήση γαντιών. Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό θα πρέπει να φοράτε μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια. Συνιστάται η χρήση γαντιών. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρώτες επιφάνειες και τους δρόμους.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζετε σε αποστραγγισμένα εδάφη για όλες τις καλλιέργειες, εκτός από τις καλλιέργειες Βαμβாகιού και Αμπέλου.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- Φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για τα Φυλλώδη Λαχανικά, τον Αραβόστοι και το Γλυκό Καλαμπόκι.
- Αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 50% στο Αμπέλι.
- Φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 50 % στα Πυρηνόκαρπα και στα Μηλοειδή (δόση 12 κ.εκ./στρ).
- Αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75% στα Μηλοειδή (δόση 15.5 κ.εκ./στρ).
- Φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων ή Αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75% στα Πυρηνόκαρπα (δόση 15.5 κ.εκ./στρ).
- Φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε Τομάτα και Μελιτζάνα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής, απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ανοίξτε εδώ

ΚΟΣΥΑΡ: Εντομοκτόνο το οποίο δρα ενεργοποιώντας τους υποδοχείς ρυανολίνης στο νευρομυϊκό σύστημα των εντόμων. Προκαλεί απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου από ενδοκυτταρικά αποθέματα, μυϊκή παράλυση και τελικά θάνατο του εντόμου. Δρα κυρίως μέσω κατάποσης και δευτερευόντως μέσω επαφής, προκαλώντας παράλυση και τελικά θάνατο του εντόμου. Ελέγχει προνύμφες διαφόρων ειδών Λεπιδοπτερων, καθώς και ορισμένα είδη Κολεοπτέρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε την φιάλη πριν τη χρήση. Υπό συνεχή ανάδευση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αμέσως μετά την χρήση, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΛΑΧΑΝΟ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ: Μαμέστρα, Πλουτέλλα, Πιερίδα, Σποντόπτερα. Δόση: 10,5-14 κ.εκ./στρ. Από την έκπτυξη του 5ου φύλλου έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της κεφαλής (BBCH 15-49). **ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (σπόρος & ζωτροφή)-ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ:** Πυραλίδα, Σεζάμια, Πράσινο σκουλήκι. Δόση: 9,5-14 κ.εκ./στρ. Από το στάδιο της ολοκλήρωσης της ανάπτυξης των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 20-87). **ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμα & επιτραπέζια):** Ευδεμίδα, Κογγυλίδα. Δόση: 15,5-21 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Από την ολοκλήρωση της εμφάνισης της ταξιανθίας έως πριν την άνθηση (BBCH 57-59) και από τον σχηματισμό των καρπών έως το χρωματισμό τους (BBCH 70-83). **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσμουλιά):** Καρπόκαψα, Φυλλοδέτες. Δόση: 12,5-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών ως την ωρίμανση του καρπού (BBCH 70-87). **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά):** Καρπόκαψα, Ανάρσια, Φυλλοδέτες. Δόση: 12,5-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Από το στάδιο δεύτερης πτώσης καρπών έως το στάδιο πριν την ωρίμανση (BBCH 73-85). **ΤΟΜΑΤΑ (Υ)-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ):** Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα. Δόση: 15,5-20 κ.εκ./στρ. Από την έναρξη της ανάπτυξης των καρπών ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 71-89). **ΤΟΜΑΤΑ (Θ)-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θ):** Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα. Δόση: 15,5-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Από την έναρξη της ανάπτυξης των καρπών ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 71-89). **ΠΑΤΑΤΑ:** Δορυφόρος, Φθορμαία. Δόση: 5-6 κ.εκ./στρ. Από την έναρξη επιμήκυνσης του κύριου βλαστού έως πριν από την εμφάνιση των πρώτων ανοικτών ανθέων (BBCH 31-60). **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Πράσινο σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι. Δόση: 15,5-20 κ.εκ./στρ. Από το στάδιο επιμήκυνσης του βλαστού με 40% επικάλυψη φυτών έως την εμφάνιση ταξιανθίας με ορατά πέταλα και κλειστά άνθη (BBCH 34-59), και από το στάδιο όπου το 10% των καρυδίων έχει φτάσει το τελικό μέγεθος έως το στάδιο όπου το 70% των καρυδίων έχει φτάσει το τελικό μέγεθος (BBCH 70-77).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Λάχανο-Μπρόκολο-Κουνουπίδι (50-80), Καλαμπόκι (σπόρος & ζωτροφή)-Γλυκό καλαμπόκι (8-40), Αμπέλι (οινοποιήσιμα & επιτραπέζια) (50-120), Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσμουλιά-Ροδακινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά (60-120), Τομάτα (Υ)-Μελιτζάνα (Υ) (50-100), Τομάτα (Θ)-Μελιτζάνα (Θ) (50-130), Πατάτα-Βαμβάκι (40-60).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργη-τική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Τομάτα (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ): Δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

Πατάτα: Δύο (2) εφαρμογές ανά 7 ημέρες (ανοιξιάτικη καλλιέργεια) ή μία (1) εφαρμογή (φθινοπωρινή καλλιέργεια).

Λάχανο-Μπρόκολο-Κουνουπίδι-Καλαμπόκι (σπόρος & ζωτροφή)-Γλυκό καλαμπόκι-Αμπέλι (οινοποιήσιμα & επιτραπέζια)-Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσμουλιά-Ροδακινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά-Βαμβάκι: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

1) Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.

2) Να ρυθμίζετε τη δόση στο εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνεται τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

3) Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι οινοποιήσιμο: 30 ημέρες.

Βαμβάκι: 21 ημέρες.

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Πατάτα, Καλαμπόκι (σπόρος & ζωτροφή): 14 ημέρες.

Γλυκό καλαμπόκι: 7 ημέρες.

Αμπέλι επιτραπέζιο, Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι: 3 ημέρες.

Τομάτα (Υ + Θ), Μελιτζάνα (Υ + Θ): 1 ημέρα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία chloran- traniliprole, η οποία ανήκει στην ομάδα 28 κατά IRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Μη φυτεύετε φυλλώδη λαχανικά πριν την πάροδο 120 ημερών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Φυλάσσεται στην αρχική απараβίαση συσκευασίας του, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.