



SORATEL 25EC



ADAMA



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΕC – Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική δράση και εξοντωτική δράση.



Εγγυημένη Σύνθεση

- Prothioconazole 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 76,4% β/β



Πεδίο Εφαρμογής

Σιτάρι χειμερινό, Κριθάρι χειμερινό, Σίκαλη.



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Α.Α.Δ.Α.: 61146/08.02.2024

Κάτοχος της Άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 151 25 Μαρούσι,, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



UFI: PGCM-9D7F-GVDE-SF3V



031/A/2024-10



4

ΛΙΤΡΑ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 Αποφεύγετε να αναπνέετε αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς.

Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρί-

χνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής, απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



01/Β1/2024-10



ανοίξτε εδώ



ΣΟΡΑΤΕΛ:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική δράση και εξοντωτική δράση. Το prothioconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα triazolinthiones), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Παρέχει προστασία πριν και μετά την μόλυνση του φυτού από το παθογόνο και σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors- DMIs). Απορροφάται γρήγορα από τους ιστούς του φυτού και μετακινείται διασυστηματικά στο φυτό προς τα νεαρά αναπτυσσόμενα όργανα μέσω των αγγείων του ξύλου (ακροπεταλική κίνηση).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος. Το ψεκαστικό διάλυμα θα πρέπει να παραμένει υπό συνεχή ανάδευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε την φιάλη πριν τη χρήση. Υπό συνεχή ανάδευση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αμέσως μετά τη χρήση, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (σκληρό+μαλακό): Σεπτορίωση, Ελμυνοσπορίωση, Ωίδιο, Κίτρινη σκωρίαση, Καστανή σκωρίαση. Δόση: **60-80 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι το τέλος του ξεσταχιάσματος πριν την έναρξη της άνθησης (BBCH 31-59). Φουζαρίωση. Δόση: **60-80 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή από την έναρξη μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 61-69). **ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ:** Ρυγχόσποριση, Ελμυνοσπορίωση, Ραμουλάρια, Καστανή σκωρίαση. Δόση: **60-80 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι το τέλος του ξεσταχιάσματος πριν την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-59)). Φουζαρίωση. Δόση: **60-80 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή από την έναρξη μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 61-69). **ΣΙΚΑΛΗ:** Ρυγχόσποριση, Καστανή σκωρίαση. Δόση: **60-80 κ.εκ./στρ.** Εφαρμογή από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι την πλήρη άνθηση (BBCH 30-65).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 10-40.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

1) Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει και το τριτικάλε. **2)** Η χρήση στο μαλακό σιτάρι περιλαμβάνει τις χρήσεις στις καλλιέργειες Σπέλτα, Μονόκοκκο Σιτάρι, Δίκοκκο Σιτάρι και Tritordeum. **3)** Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου. **4)** Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής από τα παθογόνα. **5)** Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Σιτάρι, Σπέλτα, Μονόκοκκο Σιτάρι, Δίκοκκο Σιτάρι, Tritordeum, Τριτικάλε, Κριθάρι, Σίκαλη: **Δεν ορίζεται.**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική Prothioconazole, η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC. Να εφαρμόζετε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από εκείνα των DMIs.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και δόσεις που συνιστάται και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Αποθηκεύεται στην αρχική απαβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του