



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.10.2025
Αριθ. πρωτ: 295203

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 44 Κτήριο Γ
Μαρούσι 151 25
e-mail: technical@adama.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14604 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MAVRIK AQUAFLOW (tau-fluvalinate 24% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 1470/14496/22.03.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14604 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MAVRIK AQUAFLOW (tau-fluvalinate 24% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 288835/21.10.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε την αριθμ. 14604 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MAVRIK AQUAFLOW (tau-fluvalinate 24% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

1470/14496/22.03.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
<u>Μηλοειδή</u> Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUSS Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά ΕΙΟJA	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> APHIPO <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL Δίπτερα Κηκιδόμυγες <i>Contarinia pyrivora</i> CONTPY <i>Dasineura pyri</i> ASYPY Λεπιδόπτερα Καρποκάψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO Φυλλορύκτες Νάρκες <i>Phyllonorycter blancardella</i> LITHBL <i>Phyllonorycter corylifoliella</i> PRYCCO <i>Leucoptera scitella</i> LEUCSC Φυλλοδέτες <i>Archips rosana</i> CACORO <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE Υπονομευτής <i>Yponomeuta malinella</i> HYPNMA Υφάντρια <i>Hyphantria cunea</i> HYPHCU	60 max.	40-120 ²	50-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

	Pentatomidae Καφέ Βρωμούσα <i>Halyomorpha halys</i> HALYHA Νεαρές κινητές μορφές κοκκοειδών Ψύλλα <i>Cacopsylla pyri</i> PSYLPY <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
<u>Εσπεριδοειδή</u> Πορτοκαλιά CIDSY Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA	Αφίδες <i>Aphis spiraecola</i> APHISI <i>Toxoptera aurantii</i> TOXOAU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Κοκκοειδή Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL κ.α. Ακάρεα <i>Aceria sheldoni</i> ACEISH <i>Eutetranychus orientalis</i> EUTEOR <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	20-30	--	150-250	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

	Ανθοτρήτης <i>Prays citri</i> PRAYCI	40				
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> ARHIPO <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP Λεπιδόπτερα Καρπόκαψα <i>Cydia molesta</i> CARPPO Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI Φυλλοδέτες <i>Archips rosana</i> CACORO <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE Δίπτερα Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Pentatomidae Βρωμούσα* <i>Halyomorpha halys</i> HALYHA Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	60 max.	40-120 ²	50-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

Κερασιά PRNAV	Αφίδες <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE Ραγολέτις <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	20-25	20-25	100	Ψεκάσμος με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
	Ρυγχίτης <i>Rhynchites bacchus</i> RNCHBA	25				
	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Δροσόφιλα* <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	25				
Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο) VITSS	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Drepanothrips reuteri</i> DRETRE Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> EMPOFL <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Δροσόφιλα* <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i>	30	30-60 ²	50-100	Ψεκάσμος με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

	DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Φράουλα (υπαίθρου) FRAAN	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Δροσόφιλα* <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	30	--	20-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU	30	--	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
Καρότο (υπαίθρου) DAUCS Παντζάρι (υπαίθρου) BEAVD	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Cavariella aegopodii</i> CAVAA <i>Semiaphis dauci</i> SEMIDA	30	--	15-40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

Μελιτζάνα (υπαίθρου) SOLME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	20	--	15-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
Αγγούρι, Αγγουράκι (υπαίθρου) CUMSS Κολοκυθάκι (υπαίθρου) CUUPG	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u>	20	--	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

	Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Πεπόνι (υπαίθρου) CUMME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων* <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	30	--	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
Κουνουπίδι (υπαίθρου) BR SOB Λάχανο, Λαχανάκια Βρυξελλών (υπαίθρου) BR SOL	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Λεπιδόπτερα Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> BARABR Πιερίδα <i>Pieris</i> sp. PIERSP	30	--	10-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1

Μαρούλι (υπαίθρου) LACSA Λυκοτρίβολο (υπαίθρου) VLLLO Σκαρόλα (πικρίδα) (υπαίθρου) CICEL Κάρδαμο (υπαίθρου) (LEPSA Γαιοκάρδαμο (υπαίθρου) BARVE Ρόκα (υπαίθρου) ERUVE Κόκκινο Σινάπι (υπαίθρου) BRSJU Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβαν ομένων ειδών κράμβης) (baby leaf) (υπαίθρου)	Αφίδες <i>Nasonovia ribisnigri</i> NASORN <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Uroleucon cichorii</i> DACTCI Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Λεπιδόπτερα Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> BARABR Πιερίδα <i>Pieris</i> sp. PIersp Λιριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. LIRISP	40	--	30-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
Μπιζέλι (υπαίθρου) PIBSX Φασόλια (Νωπά χωρίς λοβό) (υπαίθρου) PHSVX	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Λεπιδόπτερα Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU Κάμπια μπιζελιών <i>Cydia nigricana</i> LASPNI Δίπτερα Κηκιδόμυγα <i>Contarinia pisi</i> CONTPI	30	--	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

<u>Όσπρια</u> (υπαίθρου) Μπιζέλια PIBSX Φασόλια PHSVX Φακή LENCU Κουκιά VICFX Φάβα (λαθούρι) LTHCL Ρεβίθια CIEAR	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON Δίπτερα Κηκιδόμυγα <i>Contarinia pisi</i> CONTPI Λεπιδόπτερα Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Κάμπια μπιζελιών <i>Cydia nigricana</i> LASPNI Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	30	--	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
Αγκινάρα (υπαίθρου) CYUSC Αγριαγκινάρα (υπαίθρου) CYUCA	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Capitorphorus horni</i> CARIHO <i>Brachycaudus cardui</i> BRDSCA Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP	30	--	10-40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
Βαμβάκι GOSSS	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	20	--	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora gossypiella</i> PECTGO	30-40				

	Λύγκος <i>Lygus</i> sp. LYGUSP	40				
	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Pentatomidae Βρωμούσα <i>Halysomorpha halys</i> HALYHA	40				
Ηλίανθος HELAN	Αφίδες <i>Brachycaudus helichrysi</i> ANURHE	20	--	15-40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
Ελαιοκράμβη BRSNN	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR Σκαθάρια / Κολεόπτερα Σκαθάρι γύρης <i>Meligethes aeneus</i> MELIAE Σκαθάρι στελέχους <i>Ceutorhynchus napi</i> CEUTNA Σκαθάρι λαχάνου <i>Psylliodes chrysocephala</i> PSYICH	20	--	10-40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
Ζαχαρότευτλα BEAVA	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Μαμέστρα <i>Mamestra</i> sp. MAMESP Κλεονός <i>Bothynoderes punctiventris</i> CLEOPU Κασσίδα <i>Cassida vittata</i> CASSVT	20	--	20-40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

	Άλτης <i>Chaetocnema tibialis</i> CHAETI					
Σιτηρά Σιτάρι TRZAX Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESA Σίκαλη SECSS	Αφίδες <i>Sitobion avenae</i> MACSAV <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPPA Κηκιδόμυγες <i>Contarinia tritici</i> CONTTR <i>Sitodiplosis mosellana</i> SITDMO Pentadomidae <i>Aelia rostrata</i> AELIRO <i>Eurygaster maura</i> EURYMA Τζιτζικάκια <i>Psammotettix alienus</i> PSAMST	20	--	10-40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	3 με μεσοδιάστημα 10 ημερών εφόσον απαιτείται.
Μηδική MEDSA	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON <i>Aphis fabae</i> APHIFA Σκαθάρια / Κολεόπτερα Άπιον <i>Apion trifolii</i> APIOAE Σιτόνα <i>Sitona lineatus</i> SITNLI Φυτονόμος <i>Hypera postica</i> HYPRPO Λεπιδόπτερα Κάμπια μπιζελιών <i>Cydia nigricana</i> LASPNI Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU	30	--	20-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

Ανθοκομικά NNNGB Καλλωπιστικά NNNZZ Φυτώρια NNNBA Δασικά 3FORC	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP Προνύμφες κοκκοειδών <i>Planococcus</i> sp. PLANSP <i>Pseudococcus citri</i> PSECCI <i>Aonidiella aurantii</i> AONDAU <i>Ceroplastes</i> sp. CERPSP <i>Icerya purchase</i> ICERPU <i>Parlatoria</i> sp. PARLSP Θρίπες <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP Λεπιδόπτερα <i>Phyllocnistis citrella</i> PHYNCI <i>Thaumetopoea</i> <i>pityocampa</i> THAUPI <i>Paysandisia archon</i> PAYSAR Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP Κολεόπτερα <i>Otiorhynchus sulcatus</i> OTIOSU Ακάρεα <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Panonychus citri</i> METTCI <i>Eutetranychus</i> <i>orientalis</i> EUTEOR	40	40-80	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
---	--	----	-------	--------	---	--

<u>Ακρόδρυα</u> Αμυγδαλιά** PRNDU Φιστικιά** ΡΙΑΒΕ Φουντουκιά** CYLAV Καρυδιά** IUGRE Καστανιά** CSNSA Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Hyalopterus amygdali</i> HYALAM <i>Brachycaudus</i> <i>amydalinus</i> BRDSAM Ανατολική μύγα των καρπών <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO Ευρύτομο <i>Eurytoma amygdali</i> EURTAM Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP <i>Jacobiasca formosana</i> JACSFO <i>Jacobiasca lybica</i> EMPOLY <i>Monosteira unicastate</i> MONSUN Σκουλήκι των φουντουκιών <i>Curculio nucum</i> CURCNU Κοριός των φουντουκιών <i>Gonocerus</i> <i>acuteangulatus</i> GONRAC	40	20-40	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής Από την έκπτυξη των οφθαλμών έως οι καρποί να φτάσουν το 90% του τελικού μεγέθους BBCH 51-79	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.
Τομάτα (Υ) LYPES	<u>Χρήσεις ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> Λύγκος* <i>Lygus</i> sp. LYGUSP Ανατολική μύγα των καρπών* <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των	20	--	15-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών εφόσον απαιτείται.

	ροδάκινων* Bactrocera zonata DACUZO					
Παρατηρήσεις: - Έχει δευτερεύουσα δράση στις κινητές μορφές τετρανύχων. - Στα μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, στα ακρόδρυα και αμπέλι, η δόση κ.εκ/100λιτ.ψεκ. υγρού να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο του ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά: - της καφέ βρωμούσας, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες της ροδακινιάς και της βερικοκιάς - της καφέ βρωμούσας στην καλλιέργεια του βαμβακιού - της δροσόφιλας, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες της κερασιάς, του αμπελιού και της φράουλας - του λύγκου, της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στην καλλιέργεια της τομάτας - της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες μηλοειδών, εσπεριδοειδών αγγουριού, κολοκυθιού, πεπονιού και της μελιτζάνας Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. **Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά και καστανιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.						

II. Διάθεση αποθεμάτων

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1470/14496/22.03.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ