



CURACOP[®] PENTA 57SC



ADAMA



Σύμμεικτο προϊόν
λίπανσης

Απλό Υγρό Ανόργανο Μακροθρεπτικό Λίπασμα με μικροθρεπτικά στοιχεία
[ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(β)(ι)] με Μη μικροβιακό βιοδιεγέρτη φυτών [ΚΛΠ 6(Β)]
Ca (6,2) με μικροθρεπτικά στοιχεία



Εγγυημένη Σύνθεση

- Ολικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 10% β/ο (6,2% β/β)
- Ολικός χαλκός (Cu) 36% β/ο (22,2% β/β)
- ως υδροξείδιο 18% β/ο (11,1% β/β)
- ως οξυχλωριούχο άλας 18% β/ο (11,1% β/β)

Περιεκτικότητα σε Μη μικροβιακό βιοδιεγέρτη φυτών: 100 g/l



Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Παραγωγός: AGROLOGY ABEE - ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Θ.1089, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα, Τηλ.: +30 2311 998 600

Διανομέας: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 211205570

Αρ. Παρτίδας και ημ/νία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



2606



UFI: CU20-Y01H-000U-NWA9

3 LT

CURACOP® PENTA 57SC

Φυσική μορφή: Πυκνό ελαιώρημα (SC)

Συστατικά: Οξυχλωριούχος χαλκός¹ (αριθμός CAS 1332-65-6), Υδροξείδιο του χαλκού¹ (αριθμός CAS 20427-59-2), Ανθρακικό ασβέστιο¹ (αριθμός CAS 471-34-1).
¹ ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών, 11 ΚΣΥ 11: Υποπορίοντα κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Το **Curacop® Penta 57C** είναι Σύμμιετο προϊόν λίπανσης που αξιοποιεί τη συνεργιστική δράση βιοδιέγερσης και των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων: Ασβέστιο και Χαλκό. Ο περιεχόμενος Μη Μικροβιακός Βιοδιεγέρτης περιέχει πυρίτιο και έχει ως λειτουργία να διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά στοιχεία, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων (N,P,K) και ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.

Παρέχει υψηλές ποσότητες βιοδιαθέσιμου Πυριτίου και συνεχή θρέψη. Ενισχύει τη συνεκτικότητα της σάρκας των καρπών, αυξάνει το μέγεθος και το βάρος των καρπών, βελτιώνει τη φυτογυγία των καλλιεργειών και μειώνει τις μετασυλλεκτικές απώλειες.

Επιπλέον εμπλουτισμένο με Χιτοζάνη που επάγει την φυτική άμυνα και προάγει την ανθεκτικότητα έναντι αβιοτικών καταπονήσεων. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές μέχρι και την συγκομιδή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P273: Να αποφευχθεί η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Οξυχλωριούχος χαλκός, Υδροξείδιο του χαλκού. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το ήμισυ με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Σε περίπτωση χρήσης υψηλών δόσεων, συνιστάται προδιάλυση του προϊόντος σε ξεχωριστό δοχείο με ικανή ποσότητα νερού και καλή ανάδευση.

Συνδυαστικότητα

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα, όξινα σκευάσματα και με σκευάσματα που περιέχουν, θειάφι, captan, dodine. Σε περίπτωση συνδυασμού του με προσκολλητικά, λάδια, εντομοκτόνα και άλλα μυκητοκτόνα διαλύεται σε ένα δοχείο, μπαίνει πρώτο στο θυτίο και μετά προστίθενται τα υπόλοιπα σκευάσματα. Σε περίπτωση μείγματος, είναι ευθύνη του χρήστη να δοκιμάσει το μείγμα πριν την εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους για πληροφορίες.

Συνθήκες αποθήκευσης

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Να διατηρείται ερμητικά σφραγισμένο όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν περιέχει:

10,0% (β/ο) 6,2% (β/β) Διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂)
1,0% (β/ο) 0,6% (β/β) Χιτοζάνη

CURACOP® PENTA 57SC

Γιατί το Curacop® Penta 57C

- Φόρμουλα που ενσωματώνει 3 Τεχνολογίες για βέλτιστη απόδοση, E'DA®, SmartFlow® και E-PerForm®
- Παρέχει θρέψη Χαλκού (Cu), η οποία ενισχύει
 - τους ενδογενείς μηχανισμούς άμυνας (παραγωγή φαινολικών και μεταβολισμό φαιυλοπροπανοειδών) των φυτών έναντι αβιοτικών καταπονήσεων
 - τον σχηματισμό της λινίνης, άρα τη δομική σταθερότητα των βλαστών, ποδιόσκων και περικαρπίου
 - Προάγει τη φωτοσύνθεση, εξασφαλίζοντας τη ροή ηλεκτρονίων και προστατεύοντας το φωτοσυνθετικό σύστημα από οξειδωτική βλάβη
- Βελτιώνει την πρόσληψη και αφομοίωση του ασβεστίου προλαμβάνοντας την εμφάνιση φυσιολογικών ασθενειών (πχ ξηρή σήψη κορυφής)
- Αυξάνει την παραγωγή και βελτιώνει την ποιότητά της
- Αυξάνει τη διάρκεια μετασυλλεκτικής ζωής μικρών καρπών, φρούτων και λαχανικών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Curacop® Penta 57C εφαρμόζεται διαφυλλικά ή μέσω υδρολίπανσης σε όλες τις καλλιέργειες (δενδρώδεις, κηπευτικές κ.ά.), με γενική δοσολογία 75-300 cc/100 L νερού (0,75-3,0 L/kl) ή 75-300 cc/στρέμμα (0,75-3,0 L/ha). Οι δόσεις και ο τρόπος εφαρμογής πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και τις θρεπτικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας. Συνιστάται οι εφαρμογές να πραγματοποιούνται τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, ώστε να αξιοποιείται η μέγιστη απορρόφηση του προϊόντος από το φυτό.

Ενδεικτικές εφαρμογές ανά καλλιέργεια

Ακτινίδια: 1-2 εφαρμογές πριν την άνθηση και από την έναρξη της καρπώδους έως λίγο πριν τη συγκομιδή, με δόση 150-300 cc/100 L.

Εσπεριδοειδή: 2-3 εφαρμογές, στο 2/3 της ανοιξιάτικης βλάστησης και από την καρπώδη έως τη συγκομιδή, με δόση 150-300 cc/100 L.

Πυρηνόκαρπα και Μηλοειδή: 2-3 εφαρμογές από την έναρξη της καρπώδους έως λίγο πριν τη συγκομιδή, με δόση 75-150 cc/100 L.

Ελιές: 3-4 εφαρμογές από την έναρξη της βλαστικής

ανάπτυξης, πριν την άνθηση, στην καρπώδη και έως την ωρίμανση του καρπού, με δόση 150-300 cc/100 L.

Ακρόδρυα: 3-4 εφαρμογές πριν την άνθηση, στην έναρξη της καρπώδους και κατά την ανάπτυξη του καρπού, με δόση 150-250 cc/100 L.

Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): 2-4 εφαρμογές συνολικά, ξεκινώντας πριν την άνθηση έως την έναρξη της καρπώδους και κατά την ανάπτυξη των ραγών έως δύο εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, με δόση 150-300 cc/στρέμμα.

Φράουλα, Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου), Πιπεριά (έγχρωμες ποικιλίες): εφαρμογές από τη μεταφύτευση με επανάληψη κάθε 15-20 ημέρες, με δόση 75-150 cc/στρέμμα.

Πιπεριά, Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκυθάκι: 4-5 εφαρμογές από τη μεταφύτευση και επανάληψη κάθε 15-20 ημέρες, με δόση 150-250 cc/στρέμμα.

Ανθοκεφαλές: εφαρμογές από τη μεταφύτευση έως την ανάπτυξη της κεφαλής, με δόση 150 cc/στρέμμα.

Φυλλώδη λαχανικά: εφαρμογές από τη μεταφύτευση έως την ανάπτυξη της κεφαλής, με δόση 75 cc/στρέμμα.

Βολβώδη και Πατάτα: 2-4 εφαρμογές όταν τα φυτά αποκτήσουν επαρκή φυλλική επιφάνεια, με επανάληψη κάθε 15-20 ημέρες, με δόση 150-300 cc/στρέμμα.

Σημαντικές παρατηρήσεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή συνιστάται η διενέργεια δοκιμής μικρής κλίμακας, ώστε να ελεγχθεί η πιθανότητα δημιουργίας επιχρίσματος στους καρπούς υπό τις τοπικές καλλιεργητικές συνθήκες και πρακτικές.

Το προϊόν περιέχει 22,2% κατά μάζα χαλκό (Cu). Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η χρήση του δεν οδηγεί σε υπέρβαση των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων καταλοίπων χαλκού στην καλλιέργεια.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης και να μην γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων εφαρμογής.

Για εξειδικευμένες οδηγίες και συστάσεις, απευθυνθείτε στο Τεχνικό Τμήμα της AGROLOGY.