

# VERTIMEC

# ורטימק

**תרכיז מתחלב**  
**קוטל אקריות וחרקים**

מכיל: Abamectin 18 g/L

**כללי:**

החומר הפעיל אבמקטין הוא מוצר תסיסה של מיקרואורגניזמים של הקרקע. התכשיר חודר לתוך רקמת הצמח (טרנסלמינרי) ופעולתו על החרק הינה בעיקר דרך מערכת העיכול. אבמקטין פועל על מערכת העצבים של החרק. אבמקטין ממריץ את שחרורו של החומר GABA וקשירתו לתאי העצב. פעולה זו עוצרת את הדחף העצבי ומביאה לשיתוק מהיר של החרק או האקרית. חרקים ואקריות מאבדים את כושר התנועה שלהם זמן קצר אחרי חשיפה לורטימק. התמותה חלה 4-7 ימים לאחר הריסוס. מומלץ לרסס ורטימק בשעות הבוקר או הערב והלילה.

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד' או %)	מועד טיפול אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
חרצית, גפסנית, גרברה, אסטר, סולידסטר, פלוקס, ורוניקה	אקרית אדומה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל"ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	-	יש להוסיף משטח BB5 בריכוז לפי 0.2%-0.1% טיב המים, עד לקבלת צבע ורוד. נפח תרסיס כחודש לכיסוי נוף הצמחים אך לא פחות מ- 50 ל"ד'.
	תריפס קליפורני מנהרן החממות	100 סמ"ק/ד' או 0.075% בנפח מעל 100 ל"ד' (75 סמ"ק לכל 100 ל')		
	מנהרן העורקים	100 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 100 ל"ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')		

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד' או %)	מועד טיפול אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
ורד, צפורן, ליזיאנטוס	אקרית אדומה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל/ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	-	בורדים - לא פחות מ-100 ל/ד' יש להוסיף משטח BB5 בריכוז 0.1%-0.2% לפי טיב המים, עד לקבלת צבע ורוד
	תריפס קליפורני	75 סמ"ק/ד' או 0.075% בנפח מעל 100 ל/ד' (75 סמ"ק לכל 100 ל')		
מלון, מלפפון, כרפס, אבטיח	אקרית אדומה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל/ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	7	
	מנהרן העורקים מנהרן החממות	60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 60 ל/ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')		
פלפל	אקרית אדומה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל/ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	7	בחממה - אין לרסס בימים חמים, שבהם צפויה טמפרטורה של מעל 29°C
	מנהרן העורקים מנהרן החממות	50 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 50 ל/ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')		
	אקרית העיוותים	50-30 סמ"ק/ד'		
צמחי תבלין	אקרית אדומה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל/ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	7	
	מנהרן העורקים מנהרן החממות	50 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 50 ל/ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')		



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1507/צ/1998/הגה

- סיווג IRAC: 6
- דרגת רעילות IV - מסוכן
- אריזות: 1 ל', 5 ל'
- מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
- משווק ע"י אדמה אגן

# ורטימק (המשך) VERTIMEC

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	מועד טיפול אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
אפרסק, נקטרינה	אקרית אדומה, אקרית צהובה	0.05% (50 סמ"ק לכל 100 ל')	7	
הדרים	אקרית החלודה של ההדר	130 סמ"ק/ד' בנפח 300 ל' ד': 0.03% בנפח תרסיס 'ד/ל 350-500 (30 סמ"ק לכל 100 ל')	7	יש לשלב שמן לבנולה בריכוז 0.5% או BB5 בריכוז 0.1%-0.2% (עד לקבלת צבע רווד של מי התרסיס) אין לתת יותר מריסוס אחד בעונה כנגד אקרית החלודה של ההדר.
	עש המנהרות של ההדר	0.03% (30 סמ"ק לכל 100 ל')		יש לשלב שמן לבנולה או אולטרא-פיין בריכוז 0.5%
הדרים (משתלות)	אקרית אדומה מצויה	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ל')	-	
גפן	אקרית הפקע, עש האשכול	0.075% (75 סמ"ק לכל 100 ל')	7	יש לשלב אולטרא-פיין בריכוז 0.5% אין להוסיף אולטרא-פיין לאחר שלב הפריחה.
עגבנייה, חציל	אקרית אדומה אקרית החלודה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל' ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	3	
	מנהרן החממות מנהרן העורקים	60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 60 ל' ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')		
תפוח-אדמה	מנהרן החממות מנהרן העורקים	60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 60 ל' ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')	7	
תות-שדה	אקרית אדומה תריפס קליפורני	50 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 50 ל' ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')	3	
אגוזי אדמה, כותנה	אקרית אדומה	50 סמ"ק/ד'	7	

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק/ד" או הריכוז (%))	מועד טיפול אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
תפוח	אקרית אדומה אקרית אירופית	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ל")	7	הריסוס-בתחילת העונה כאשר רוב העלוה עדיין צעירה.
אבוקדו	אקרית האבוקדו	0.05% (50 סמ"ק לכל 100 ל")	7	בתוספת שמן קיצי (לבנולה) בריכוז 1.75%
תמר	אקרית הקורים של התמר	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ל")	7	בתוספת שמן אולטרפיין בריכוז 1%-0.5%
אגס	אקרית אדומה, אקרית צהובה, פסילת האגס	0.075% (75 סמ"ק לכל 100 ל")	7	בתוספת שמן אולטרפיין בריכוז 0.25%

### שילובים:

במלפפון - ניתן לשלב ורטימק עם אופיה, רידומיל גולד, MZ נימגארד ואקרובט. בתות שדה - עם אופיר וסטרובי. בעגבנייה - עם אופיה, סקור ונימגארד. בפלפל - עם סקור ונימגארד. בהדרים - שמן לבנולה עד 2% בהדרים שאינם נושאי פרי - אוריאה דלת ביורט. 1.5% בחציל, באבטיח ובמלון - עם פלינט ונימגארד.

**מניעת עמידות:** אין לתת יותר מ-2 ריסוסי ורטימק בשנה בהדרים, בכותנה ואגסים. 3 ריסוסים בעגבנייה, פלפל, חציל, מלפפון, מילון, אבטיח, תות- שדה, סלרי, בפרחים וצמחי נוי, **ובשום אופן לא יותר מ-2 ריסוסים רצופים.**



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1507/צ/הגה"צ/1998

- סיווג IRAC: 6
- אריזות: 1 ל"5
- דרגת רעילות IV - מסוכן
- מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
- משווק ע"י אדמה אגן