

טייגר TIGER

תרכיז מתחלב

קוטל חרקים מקבוצת מווסתי גדילת חרקים, הפועל כדמוי הורמון נעורים על דרגות שונות של כנימות. עש, כנימות רכות וכנימות מגן.

מכיל: Pyriproxyfen 100 g/L

למניעת התפתחות תנגודת לתכשיר יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. דאג לכיסוי מלא של עלוות הגידול.

המועד האחרון לטיפול (ימים)	נפח התרסיס ליטר/דונם	המינון		המועד המיטבי להדברה	המזיק	הגידול
		(סמ"ק/ד")	(%)			
30	20-3 ריסוס מהקרקע או מהאוויר	75	-	בהגיע הנגיעות בזחלים לסף הטיפול המומלץ*	כנימת עש הטבק	כותנה
14	100-8	75	-	בהגיע הנגיעות בזחלים לסף הטיפול המומלץ*	כנימת עש הטבק	ירקות: חציל, מלון, כרוב
30	400-250	-	0.1	עם התחלת ההשרצה עם התחלת ההטלה עם התחלת ההטלה עם הופעת הזחלים עם הופעת הזחלים	כנימת אדומה כנימת האיצריה כנימת עש לבנה דונגית פלורידית כנימת מוץ	הדרים**
אמצע יוני	150		0.07	עם התחלת ההטלה	כנימת עש לבנה	אפרסמון

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

המועד האחרון לטיפול (ימים)	נפח התרסיס ליטר/דונם	המינון		המועד המיטבי להדברה	המזיק	הגידול
		(סמ"ק/ד')	(%)			
עד לחנטה או לאחר הקטיפ	200-150		0.15	טיפול אחד בשנה עם תחילת בקיעת הביצים באביב או לאחר גמר הקטיפ***	פרלטוריה	נשירים: אגס, אפרסק, שזיף אירופי ושזיף יפני, תפוח
עד לחנטה או לאחר הקטיפ	250-200	-	0.1	עם התחלת ההשרצה עם הופעת הזחלנים	כנימת אדומה פרלטוריה	זית
-	100-20 (בנפח תרסיס מעל 100 לי"ד מרססים בריכוז 0.1%)	75	15	עם תחילת נגיעות בביצים ובזחלים*	כנימת עש הטבק	פרחים (1)
				עם תחילת נגיעות בביצים ובזחלים*	כנימת עש הטבק	משתלות וצמחי עציץ (2)

טייגר TIGER המשך

הערות לטבלה:

(1) רשימת הפרחים: חרצית, ורד, גרברה, חלבלוב הדור, רוניקה, ליציאנטוס, אסתר, פלוקס, אסקלפיאס, סולידסטר.
(2) התכשיר נבדק ונמצא בטוח לצמחי עציץ כדלקמן: אבוטילון, גרברה, טרכליום, לימוניום, פלפל נוי, ליציאנטוס, חלבלוב הדור, גרניום.
לפני השימוש בצמחי עציץ אחרים מומלץ לבדוק תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

*** כותנה, פרחים, משתלות וצמחי עציץ** - טייגר מדביר את ביצי כנימות עש. זחלים נקטלים בהגיעם לדרגת גולם. השפעתו על הבוגרים מתבטאת בהטלת ביצים עקרות. כתוצאה מהנ"ל הפחתה באוכלוסיית הזחלים תתבטא רק לאחר כ-3 שבועות. בכותנה: לא מומלץ לרסס יותר מטיפול אחד בשנה.

בפרחים, במשתלות ובצמחי עציץ לא יינתנו יותר משני ריסוסים במשך עונת הגידול, מרווח הזמן בין הטיפולים לא יהיה פחות מ-60 יום.

**** הדריים** - טייגר מדביר את הדרגות הצעירות של כנימות המגן. ריסוס באביב ימנע התפתחות הדור הבא. למניעת נזקי פייחת המתפתחת ע"י הפרשות זחלי כנימת עש הלבנה והאיצירה טפל מוקדם באביב, עם תחילת ההטלה.

***** נשירים** - טייגר מדביר את הזחלים הצעירים של כנימת הפרלטוריה. למניעת נגיעות הפרי בפרלטוריה רסס עם תחילת בקיעת ביצי הכנימה באביב. טיפול לאחר הקטיף יינתן במידה שנמצאה נגיעות רבה בפרלטוריה בפרי שנקטף.

שילובים: לא מומלץ לשלב יותר משני תכשירים מחשש לפיעה בגידול.

1. **בכותנה** - ניתן לשלב עם, אטברון, מוליט.

2. **בפרחים, משתלות וצמחי עציץ** - רצוי לשלב טייגר למניעת התפתחות תנגודת. תאפשר לשלב עם התכשיר קרטה - על פי הגידולים המורשים בתווית. בגרברה ניתן לשלב טייגר עם ורטימק. לפני ריסוס בשילובים אחרים יש לבדוק בטיחות השילוב תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.



ADAMA
אגן

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 91/ הגה"צ/ 1155
• סיווג IRAC: 7C
• דרגת רעילות IV - מסוכן
• אריזות: 71, 75
• מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן