

ניקון NIKON

תרכיז נוזלי.

קוטל מחלות סיסטמי למניעת ריקבון חום וחלפת בהדרים, כשותית בגפן ובמלפפון.

מכיל: Potassium phosphite 780 g/L

אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה, או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום, או סובל מנזקי קרה, מחוסר אורור קרקע, או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. יש לרסס רק עצים/חלקות אשר העצים בהם בריאים וחזקים. אין לשלב עם תכשיר אחר. אין לחרוג מהריכוז המומלץ מחשש לצריבות בעלוה. דאג לכיסוי מלא של העלוה.

ימי המתנה עד לקטיף	הערות	המינון סמ"ק/ דונם או ריכוז %	המחלה	הגידול
3	בתחילת עונת הגשמים יש לרסס החלק התחתון של העץ עד גובה של 150 ס"מ מפני הקרקע בנפח תרסיס של 150-200 ל"ד'.	0.25% (250 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	ריקבון חום	הדרים*
	בזנים גישים יש לרסס בחודשי האביב לפני פתיחת הפרחים בתחילת חנטה וכל 3 שבועות עד יוני. מרססים גם בסתיו ע"פ הצורך.		(250 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	
3	יש לרסס ריסוסי מניעה כל 10 ימים. עם תחילת נגיעות יש לרסס כל 7 עד 10 ימים, 3 ריסוסים לפחות.	0.3% (300 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כשותית	גפן
3	יש להתחיל בטיפולים לפני הופעת המחלה במרווחים של שבוע. ריסוס ראשון יתבצע חודש משתילה.	0.3% (300 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כשותית	מלפפון

***בהדרים** אין לרסס ניקון לפני ריסוס שמן וגם חודש לאחר ריסוס שמן. הטיפול בניקון מפחית במידה ניכרת את הנגיעות במחלת החלפת בפרי הדר אך אינו מונע את המחלה לחלוטין. יש לרסס את נוף העץ כולו בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4478/הגה"צ/2017

- דרגת רעילות IV - מסוכן
- מיוצר ע"י LAINCO
- משווק ע"י אדמה אגן
- C2: FRAC
- אריזות: 20 ליטר