

# מגלן MAGLAN

## תרכיז רחיף

קוטל עשבים בררני בגידולים: בקיה, חמצה, אספסת, חסה עלים, מטעים ויער.

מכיל: Propyzamide 400 g/L

מגלן מדביר ולאחר הפעלתו מונע הצצה של נבטים של עשבים דגניים חד-שנתיים. במינונים גבוהים ימנע גם הצצה של: עשן, חלמית, כף אווז, סרפד ומצליבים. התכשיר מדביר עשבים רגישים לאחר קליטתו דרך מערכת השורשים, לכן רטיבות נאותה בבית השורשים הכרחית. היישום בחורף בלבד. פעילות החומר נפגמת בטמפרטורות מעל 28° C. עיבוד שטחי לא מבטל את פעילות החומר.

## הערות לטיפול:

אין לרסס ברוח. מנע רחף לגידולים שכנים. אין לרסס בתנאי לחות ובתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום, נדקי קרה, חוסר אוורור קרקע, נדק מקוטלי עשבים ועוד. אין לרעות ואין לקצור על השטח המרוסס ממועד הריסוס ועד חלוף 60 יום ממועד הפעלת התכשיר ע"י גשם או המטרה.

**הפעלה:** למניעת הצצה יש להפעיל את התכשיר בגשם או המטרה של 20 מ"מ לפחות. הריסוס יעיל אם יופעל תוך 30 יום מריסוסו. הטיפול ידביר עשבים קיימים רגישים רק בתנאים של רטיבות נאותה בבית השורשים.

## מטעים ועצי יער

הגידול	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הריסוס	נפח התרסיס (לי/ד')	הערות
אבוקדו, אפרסמון, גפן, הדרים, אפרסק, זית, עצי יער (ברוש, אורן), תפוח משנה לאחר הנטיעה	200 בכל הקרקעות	קדם הצצה, סתיו-חורף	20	יש לשלב עם גליגן בהתאם לאזהרות בתווית הגליגן

## גידולי שלחין

הגידול	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הריסוס	נפח התרסיס (לי/ד')	הערות
חסה עלים משתילה	300	לאחר שהשתילים נקלטו ולפני הצצת העשבים הראשונים	20	יש להמטיר מיד לאחר הריסוס.
אספסת לירק ולזרעים - להדברת עשבים דגניים ח"ש בלבד	125-250*	לאחר הצצה, לאחר הופעה תלת עלה ועד גובה 10 ס"מ ובין הקצירים לא יאוחר מ-5 ימים לאחר הקציר	20	יש להמטיר סמוך לאחר הריסוס.

\* בהתאם לשיבוש או גובה העשבים.



מס' הרישוי של השירותים להגנת הצמח ולביקורת: 4138/הגה"צ/2013  
 • סיווג HRAC: K  
 • דרגת רעילות IV - מסוכן  
 • אריזות: 5 ל'  
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

# מגלן (המשך) MAGLAN

## גידולי פלחה

אין להשתמש בתכשיר בשדות בהם לא מובטחת כמות משקעים (גשם או המטרה) של 250 מ"מ לאחר הריסוס. למוניעת הצצת עשבים יש להפעיל את התכשיר עם גשם או המטרה לאחר הריסוס.

נפח התרסיס (ל"/ד')	המינון (סמ"ק/ד')*	מועד הטיפול	הגידול
20	200-100	מיד לאחר הזריעה, לפני הצצה, לא יאוחר מראשית ינואר	חמצה. בקרקות כבדות ובינוניות בלבד
		מיד לאחר הזריעה, לפני הצצה הגידול	בקיה בזנים: שדות, פופני. בקרקות כבדות בלבד
		מיד לאחר הזריעה, לפני הצצה הגידול	תלתן בזנים: תבור, פאלי. בקרקות כבדות בלבד

\* בהתאם לשיבוש או גובה העשבים.

## גידולים עוקבים

תקופת המתנה בין הריסוס לגידול הבא כדלקמן:

תקופת המתנה	הגידול
אין צורך בתקופת המתנה	קינרס, חסה
5 חודשים	גזר, כרפס, כרוביים, תות שדה, תירס, כותנה, תפוחי אדמה, סורגום
8 חודשים	פלפל, עגבנייה, חציל, סלק, דלועיים, בצל, שום, תרד
12 חודשים	דגנים לתחמיץ, דשא



ADAMA  
אגן

מס' הרישוי של השירותים להגנת הצמח ולביקורת: 4138/2013/הגה"צ

• דרגת רעילות IV - מסוכן  
• מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

• סיווג HRAC: K  
• אריזות: 5 ל'